



ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ГЕОМЕТРИИ,

СОСТАВИЛИ

Г. Веберъ, Г. Вельштейнъ и В. Якобсталь.

7397

БИБЛИОТЕКА
МАТЕМАТИЧЕСКОГО
КОЛЛЕДЖА НМУ

Книга I.

ОСНОВАНИЯ ГЕОМЕТРИИ.

СОСТАВИЛЪ

Г. Вельштейнъ.

THE HISTORY OF THE
CITY OF BOSTON

FROM THE FIRST SETTLEMENT TO THE PRESENT TIME

BY NATHANIEL BENTLEY

VOLUME I

Предисловіе къ русскому изданію.

Въ предисловіи автора къ первому изданію съ достаточной полнотой изложены планъ и содержаніе второго тома настоящаго сочиненія. Мы ограничимся, съ своей стороны, только слѣдующимъ замѣчаніемъ. Вопросы, относящіеся къ основаніямъ геометріи, въ настоящее время еще усиленно разрабатываются; но не только относительно тѣхъ проблемъ, которыя лежатъ на рубежѣ между математикой и философійю, еще не достигнуто соглашенія, не выработано болѣе или менѣе общей точки зрѣнія, но и возникающія здѣсь задачи чисто математическаго характера вызываютъ еще не мало споровъ. Съ этой, именно, точки зрѣнія мы можемъ рекомендовать читателю отнестись къ излагаемымъ въ настоящей книгѣ разсужденіямъ. Во многихъ своихъ частяхъ это — не установившіяся прочно истины, это — взгляды, которые можно раздѣлять въ большей или меньшей степени. Съ нѣкоторыми взглядами автора мы, напримѣръ, рѣшительно не можемъ согласиться; такъ мы не можемъ усвоить точки зрѣнія автора на „натуральную геометрію“. Но авторъ тонко изучилъ обширную литературу, относящуюся къ основаніямъ геометріи. Въ тѣхъ случаяхъ, когда по тому или иному вопросу мнѣнія особенно расходятся, онъ съ достаточной объективностію излагаетъ различныя точки зрѣнія. Во всякомъ случаѣ это наиболѣе полное изложеніе предмета въ элементарной литературѣ. Если, однако, читатель не всегда выноситъ полное удовлетвореніе, то это должно быть отнесено, главнымъ образомъ, къ трудности самого предмета.

Какъ и въ первомъ томѣ, мы старались облегчить читателю чтеніе болѣе трудныхъ мѣстъ сочиненія, выясняя таковыя въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ. Два вопроса, именно, теорія безконечно удаленныхъ элементовъ и теорія площадей, требовали, на нашъ взглядъ, болѣе подробныхъ объясненій, вслѣдствіе чего мы и посвятили имъ особыя дополненія въ концѣ книги. Въ первомъ изданіи съ недостаточной полнотой изложено также ученіе объ инверсіи, которое при своеобразномъ изложеніи неевклидовой геометріи, нашедшемъ себѣ мѣсто въ этомъ сочиненіи, имѣетъ весьма важное значеніе. Поэтому мы и этому вопросу имѣли въ виду посвятить особое дополненіе, о чемъ и упомянули въ подстрочномъ при-

мѣчаніи 12 на стр. 46. Однако, когда 3-ій листъ настоящей книги былъ отпечатанъ, мы получили второе изданіе оригинала, въ которомъ авторъ и самъ внесъ въ ученіе объ инверсіи необходимыя дополненія. Такъ какъ мы имѣли возможность помѣстить ихъ на своемъ мѣстѣ (въ 4-мъ листѣ), то предполагавшееся дополненіе оказалось излишнимъ.

Наибольшее затрудненіе представилъ для насъ переводъ философскихъ частей книги, такъ какъ здѣсь серьезныя сомнѣнія возникали таюке относительно терминологіи. Сомнѣнія эти усиливались еще тѣмъ обстоятельствомъ, что авторъ, на нашъ взглядъ, не всегда твердо выдерживаетъ значеніе употребляемыхъ имъ философскихъ терминовъ. Такъ, на примѣръ, терминъ „Anschauung“ авторъ употребляетъ, на нашъ взглядъ, частью, въ томъ особомъ значеніи этого слова, которое передается на русскомъ языкѣ обыкновенно словомъ „воззрѣніе“, частью, въ смыслѣ „интуиція“. Сохраняя въ текстѣ вездѣ первый изъ этихъ терминовъ, мы не вполнѣ увѣрены, что поступали правильно. Во всякомъ случаѣ термины выбирались съ большою осторожностью, и мы надѣемся, что философы простятъ математику допущенныя имъ промахи.

Въ виду того, что второй томъ значительно больше перваго, мы нашли целесообразнымъ выпустить отдѣльно первую книгу II-го тома.

В. Каганъ.

Предисловіе автора къ первому изданію.

Второй томъ „Энциклопедіи элементарной математики“, появленіе котораго, къ сожалѣнію, нѣкоторыми вышними обстоятельствами было замедлено, посвященъ исключительно геометріи. При большомъ объемѣ элементарной математики съ ея безчисленными тоеремами и теоремками объ окружностяхъ, тетраэдрахъ и сферахъ, которыя представляютъ собой лишь различныя видоизмѣненія и частные случаи немногихъ общихъ идей проективной геометріи, мы вынуждены были ограничиться самымъ необходимымъ матеріаломъ, тѣмъ болѣе, что намъ необходимо было, отчасти въ интересахъ третьяго тома, удѣлить мѣсто также коническимъ сѣченіямъ, сферической тригонометріи и основаціямъ аналитической геометріи.

Собрать весь цѣнный матеріалъ въ этой научной области, и по возможности, снабдить его литературными указаніями, какъ это дѣлается въ выходящей въ настоящее время „Большой энциклопедіи математическихъ наукъ“, не соотвѣтствуетъ плану настоящаго сочиненія. Напротивъ, мы имѣли въ виду устранить весь тотъ матеріалъ, который въ настоящее время остается изолированнымъ, а потому неплодотворнымъ, и сохранить лишь то, что оказывается полезнымъ въ примѣненіи къ механикѣ и къ физикѣ и сохраняетъ свое значеніе также въ высшей математикѣ.

Въ этой болѣе тѣсной области мы старались достигнуть возможнаго углубленія и оживленія матеріала, — углубленія путемъ подробнаго критическаго изслѣдованія основъ этой науки съ точки зрѣнія логики и теоріи познанія, тщательной разработкой всего того, что касается знаковь величины, понятій „направо“ и „налѣво“, направленія и т. п.; оживленія — путемъ приложений, которыя найдутъ себѣ мѣсто въ третьемъ томѣ. Первый томъ раздѣленъ на три части. Не безъ страха публикую я первую книгу, посвященную основаціямъ науки, т. е. той промежуточной области, которая требуетъ не только математическихъ, но и философскихъ разсужденій. При общемъ низкомъ уровнѣ нашего философскаго образованія, въ чемъ мы можемъ спокойно сознаться, и при большомъ отвращеніи широкихъ круговъ ко всѣмъ вопросамъ, падающимъ въ эту область, необходимо было прежде всего показать, что мы здѣсь имѣемъ дѣло съ серьезными вопросами, которые могутъ интересовать

такоже математика. Если и не всё разсужденія автора встрѣтятъ сочувствіе, то онъ во всякомъ случаѣ будетъ удовлетворенъ и будетъ считать свою цѣль достигнутой, если ему удастся вызвать интересъ въ самой постановкѣ вопроса. Авторъ знаетъ по своему собственному опыту, въ какой мѣрѣ чувствуетъ себя не на мѣстѣ молодой преподаватель, только что сошедшій съ университетской скамьи и занимавшійся наиболѣе глубокими и новѣйшими вопросами высшей математики, когда ему приходится излагать начала геометріи въ младшихъ классахъ. Но лишь тотъ, кто старался проникнуть въ гносеологическія основы геометріи, можетъ вполне оцѣнить, до какой степени это дѣйствительно трудная и отвѣтственная задача, требующая не только основательнаго научнаго образованія, но и значительнаго педагогическаго искусства. Ничто не возвышаетъ внутренне учителя въ такой мѣрѣ, ничто не подымаетъ въ немъ въ такой мѣрѣ сознанія величія его призванія, какъ ясное пониманіе, что обоснованіе геометріи представляетъ собою задачу, почти непреодолимую по своей трудности, — задачу, съ разрѣшеніемъ которой ему придется бороться всю свою жизнь, постоянно примиряя требованія строгой логики съ развивающейся только способностью учениковъ къ воспріятію, научную строгость съ наивнымъ воззрѣніемъ, развитіе и укрѣпленіе которой, по мнѣнію преподавателей, имѣющихъ большой научный и педагогическій опытъ, составляетъ первую цѣль обученія геометріи. Мы считаемъ здѣсь же нужнымъ указать, что строго формальную, логическую постановку современной геометріи въ преподаваніи мы совершенно отвергаемъ.

Такъ какъ въ первой книгѣ поставлены вопросы, относящіеся къ теоріи познанія, и она можетъ, такимъ образомъ, найти читателей, быть можетъ, менѣе интересующихся остальнымъ матеріаломъ этого тома, то мы считали необходимымъ дать здѣсь же выводы всѣхъ предложеній, необходимыхъ для пониманія, кромѣ наиболѣе элементарныхъ, въ самомъ узкомъ смыслѣ этого слова. Для выясненія сущности проективнаго взгляда на пространство было необходимо вплести въ этотъ отдѣлъ также и проективную геометрію. Къ этому примыкаетъ планиметрія, въ которой особенно подробно разобрана теорія связи окружностей; какъ мы указываемъ въ текстѣ, слѣдуя Цейтену (Zeuthen, Poncelet), эта теорія представляетъ удобный путь къ теоріи коническихъ сѣченій.

Вторая книга содержитъ плоскую и сферическую тригонометрію при изложеніи которой мы, слѣдуя Студи (Study), съ одной стороны, выдвигаемъ на первый планъ понятіе о группѣ, а, съ другой стороны, принимаемъ во вниманіе требованія практики.

Въ третьей книгѣ, посвященной аналитической геометріи и стереометріи, развивается аналитическая теорія коническихъ сѣченій, при чемъ излагается также ученіе о кривизнѣ, въ особенности въ цѣляхъ теоріи проектированія, которая будетъ изложена въ третьемъ томѣ. Цѣльное из-

ложеіе теоріи коническихъ сѣченій вышло бы за предѣлы нашей книги, но зато мы старались эту изящнѣйшую и высшую часть элементарной геометріи освѣтить съ возможно болѣе разнообразныхъ точекъ зрѣнія: чисто синтетически, съ точки зрѣнія геометріи круговъ, а въ третьемъ томѣ также съ точки зрѣнія начертательной геометріи и теоріи перспективы. Въ небольшомъ параграфѣ кратко рассмотрѣны также коническія сѣченія на сферѣ. Глава, посвященная стереометріи, содержитъ, кромѣ общихъ основъ геометріи пространства, еще ученіе объ объемѣ.

Разработку сферической тригонометріи, а также аналитическую геометрію на сферѣ взялъ на себя В. Якобсталь (W. Jacobsthal). Остальной матеріалъ былъ распределенъ между двумя издателями сочиненія, какъ указано въ сочиненіи.

Страсбургъ, въ августъ 1905 г.

I. Вельштейнь.

Предисловіе автора ко второму изданію.

Отъ обѣщанной въ предыдущемъ предисловіи главы въ третьемъ томѣ, посвященной перспективѣ, мы вынуждены были отказаться за недостаткомъ мѣста. Зато ученіе о кривизнѣ коническихъ сѣченій разработано болѣе подробно.

Настоящее изданіе отличается отъ перваго только рядомъ небольшихъ измѣненій.

Страсбургъ, октябрь 1907 г.

I. Вельштейнь.

Замѣченныя опечатки.

<i>Страница.</i>	<i>Строка.</i>	<i>Напечатано.</i>	<i>Должно быть.</i>
48	18 снизу	Q	0
115	1 снизу	(!)	(I)

На фигурѣ 15 прямая должна быть обозначена через a' , а не через a .

Книга I.
ОСНОВАНІЯ ГЕОМЕТРИИ.



Введеніе.

1. Если математика гордо возвысилась на степень наиболѣ совершеннаго образца чистой науки, то она обязана этимъ не столько господствующему въ ней дедуктивному методу, сколько тому обстоятельству, что она въ состояніи указать предпосылки, на которыхъ она покоится, что она имѣетъ возможность установить „основныя понятія“ и „основныя положенія“, служащія фундаментомъ всего построенія, и ясно освѣтить значеніе каждаго изъ нихъ путемъ построенія системъ, въ которыхъ то или иное положеніе не оправдывается. Основы ариѳметики (см. т. I, кн. I) мы построили, опираясь, главнымъ образомъ, на одно свойство нашего духа, на его способность къ ассоціаціи, или сопряженію. Основы геометріи, которыя мы намѣрены поддержать здѣсь тщательному анализу, насколько это осуществимо элементарными средствами, имѣютъ гораздо болѣе сложный характеръ. Мы встрѣчаемъ здѣсь понятія „точка“, „прямая“, „плоскость“, „параллельно“, „между“ и т. д.; мы знаемъ, скажемъ, такія простыя предложенія: черезъ двѣ точки всегда проходитъ одна и только одна прямая; черезъ три точки, не расположенныя на одной прямой, всегда проходитъ одна и только одна плоскость; изъ трехъ точекъ, расположенныхъ на одной прямой, одна и только одна лежитъ „между“ двумя другими и т. д. Эти предложенія кажутся очень простыми, такъ какъ они очевидны по своей наглядности и не могутъ быть доказаны при помощи болѣе простыхъ предложеній; легко принять, что они понятны сами собой. Но ничто не поддается съ такимъ трудомъ болѣе глубокому познанію, какъ тѣ именно предложенія, которыя на первый взглядъ кажутся понятными сами собой. Въ то время, когда математики всѣхъ временъ стремились, главнымъ образомъ, къ расширенію своей науки путемъ открытія новыхъ истинъ, лишь немногіе изъ нихъ, правда, наиболѣе выдающіеся, были заинтересованы углубленіемъ геометріи, выясненіемъ взаимной связи и значенія отдѣльныхъ посылокъ: большинство считало, очевидно, недостойнымъ тратить трудъ и время на то, чтобы собирать и углубляться въ эти простыя и тривиальныя предложенія, ясныя, какъ день Божій, не обѣщающія славы

ислѣдователю. И все-таки во всей геометріи врядь ли есть что-либо болѣе заманчивое, какъ занятіе этими именно невзрачными предложеніями, которыя въ немногихъ словахъ выражаютъ такое обширное содержаніе, которыя in pace содержатъ всю геометрію. Путемъ ихъ изслѣдованія для геометріи были завоеваны болѣе широкія области, чѣмъ развитіемъ высшихъ ея теорій.

2. Въ дальнѣйшемъ мы не имѣемъ въ виду слѣдовать примѣру Евклида; мы не имѣемъ въ виду развивать шагъ за шагомъ систему геометріи изъ ряда предпосланныхъ и допущенныхъ посылокъ, потому что въ такомъ изложеніи значеніе этихъ посылокъ, каждой въ отдѣльности, недостаточно выясняется. Напротивъ, мы отладимъ предпочтеніе другому изложенію, въ которомъ критика обычной точки зрѣнія на основы геометріи должна подготовить читателя къ строго логическому ея пониманію; эта критика должна выяснить, какъ мало факты чувственнаго воспріятія пригодны для того, чтобы служить краеугольными камнями наукъ, желающей оперировать совершенно опредѣленными понятіями.

ГЛАВА I.

Критика основныхъ понятій.

§ 1. Историческія свѣдѣнія.

1. Какъ свидѣтельствуєтъ исторія, геометрія имѣть эмпирическое происхожденіе. По крайней мѣрѣ, относительно древнѣйшаго культурнаго народа, вліяніе котораго на развитіе геометрії на западѣ вполне доказано, какъ греческіе историки, такъ и современные египтологи, согласно удостоверяють, что тамъ геометрія возникла вслѣдствіе необходимости ежегодно возстановлять границы полей, которыя смывались разлитіемъ Нила. Сообразно этому наиболѣе древнія геометрическія формулы, извѣстныя намъ изъ папируса Эйзендора *), относятся къ измѣренію площадей; задача эта, впрочемъ, разрѣшается здѣсь только приближенно. Такъ, напримѣръ, площадь равнобедреннаго треугольника со сторонами a, a, c признается равной $\frac{1}{2} ac$ вмѣсто $\frac{1}{2} ac \sqrt{1 - (c/2a)^2}$; эта приближенная формула согласуется, однако, съ истинной тѣмъ больше, чѣмъ больше равныя стороны по сравненію съ третьей стороной. Всѣ остальные геометрическіе факты, содержащіеся въ этомъ папирусь, имѣютъ непосредственно практическое значеніе; ни доказательствъ, ни указаній на таковыя мы нигдѣ не находимъ. Вообще съ большимъ довѣріемъ къ свѣдѣніямъ древнихъ египтянъ въ этой области относиться нельзя, ихъ мудрость въ древности значительно переоцѣнивалась.

2. Греки освободили геометрію отъ узкаго кругозора египетскихъ ремесленниковъ и строителей; занимаясь геометріей ради ея самой, они развили ее въ теченіе двухъ столѣтій гораздо больше, нежели египтяне въ теченіе двухъ тысячелѣтій. Вначалѣ и здѣсь наглядность играла рѣшающую роль, но скоро установилась потребность въ логическихъ доказательствахъ. Изъ простыхъ предложеній выводились болѣе трудныя, все болѣе широкіе отдѣлы геометрії приводились во взаимную связь. Это и послужило импульсомъ къ тому, чтобы дойти до послѣднихъ посылокъ, изъ которыхъ вытекаетъ все остальное. Этотъ неизмѣримо огромный умственный трудъ выполнилъ Евклидъ, жившій около 300 г. до Р. Хр. въ

*) A. Eisenlohr. „Ein mathematisches Handbuch der alten Ägypter“. Leipzig. 1877.

Александріи при Птоломее I. Онъ завершилъ то, что было сдѣлано его предшественниками въ дѣлѣ обоснованія геометріи въ теченіе слишкомъ столѣтій; 13 книгъ его „Началь“, содержащія въ геометрической формѣ также основанія арифметики, вытѣснили совершенно сочиненія его предшественниковъ. Во главѣ своей книги („στοιχεῖα“) Евклидъ полагаетъ опредѣленія (ῥῆσι), постулаты (στίγματα) и аксіомы (κοινὰ ἔννοια) на которыхъ, по его мнѣнію, покоится геометрія. Важнѣйшія опредѣленія слѣдующія:

- | | |
|---|--|
| I. Σημεῖόν ἐστιν, οὗ μέρος οὐθέν. | Точка есть то, что не имѣетъ частей. |
| II. Γραμμὴ δὲ μῆκος ἀπλατές. | Линія есть длина безъ ширины. |
| III. Εὐθεῖα γραμμὴ ἐστίν, ἥτις ἐξ ἴσου τοῖς ἐφ' ἑαυτῆς σημεῖοις κεῖται. | Прямая есть линія, которая одинаково расположена относительно всѣхъ своихъ точекъ. |

Выраженіе ἐξ ἴσου κεῖται не получило еще вполнѣ удовлетворительнаго перевода, но смыслъ его совершенно ясенъ.

- | | |
|--|--|
| IV. Ἐπιφάνεια δὲ ἐστίν, ἧ μῆκος καὶ πλάτος μόνον ἔχει. | Поверхность есть то, что имѣетъ только длину и ширину. |
| V. Ἐπίπεδος ἐπιφάνεια ἐστίν, ἥτις ἐξ ἴσου ταῖς ἐφ' ἑαυτῆς εὐθείαις κεῖται. | Плоскость есть поверхность, которая одинаково расположена по отношенію ко всѣмъ прямымъ, на ней лежащимъ. |
| VI. Παράλληλοι εἰσὶν εὐθεῖαι, αἵτινες ἐν τῇ αὐτῇ ἐπιπέδῳ οὔσαι καὶ ἐκβαλλόμεναι εἰς ἄπειρον ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη ἐπὶ μᾶλλον συμπέπτουσι ἀλλήλαις. | Параллельныя прямыя суть такія, которыя расположены въ одной плоскости и при неограниченномъ продолженіи въ обѣ стороны не пересѣкаются. |

Изъ постулатовъ мы приведемъ только пятый, который въ нѣкоторыхъ изданіяхъ Евклида приводится въ качествѣ XIII аксіомы и извѣстенъ подъ названіемъ „аксіомы о параллельныхъ линіяхъ“.

- | | |
|--|--|
| (Ἦτις ἐσθω) καὶ ἐὰν εἰς δύο εὐθείας εὐθεῖα ἐμπίπτουσα τὰς ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη γωνίας δύο ὀρθῶν ἐλάσσονας ποιῇ, ἐκβαλλόμενας τὰς δύο εὐθείας ἐπ' ἄπειρον συμπέπτειν, ἐφ' αἱ μέρη εἰσὶν αἱ τῶν δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες. | (Нужно потребовать), чтобы вскай разъ, какъ прямая при пересѣченіи съ двумя другими прямыми образуетъ съ ними внутренніе односторонніе углы, сумма которыхъ меньше двухъ прямыхъ, эти прямыя пересѣкались съ той стороны, съ которой эта сумма меньше двухъ прямыхъ. |
|--|--|

Аксіомы 1, 2, 3 и 8 содержатъ основанія арифметики, хотя здѣсь онѣ отнесены непосредственно къ пространственнымъ величинамъ. Аксіома 7 содержитъ понятіе о конгруэнтности.

καὶ τὰ ἐφαρμόζοντα ἐπ' ἀλλήλα ἴσα ἀλλήλοις ἐστίν. (образы), которые покрываютъ другъ друга, равны.

3. За Евклидомъ въ древности послѣдовали цѣлый рядъ выдающихся математиковъ, какъ Аполлоній, Архимедъ, Геронъ (I стол. до Р. Хр.), Геминусъ, Никомачъ (I стол. по Р. Хр.), Паппусъ (около 300 г. по Р. Хр.) Θεонъ и Прокль (V стол. по Р. Хр.), изъ которыхъ одни старались разяснить книгу Евклида комментаріями и исправить его въ отдѣльных пунктахъ, другіе старались превзойти его собственными трудами. Ихъ работы относились, главнымъ образомъ, къ аксіомѣ о параллельныхъ линияхъ, къ выбору послѣдовъ, къ построению первой книги, а также къ устраненію нѣкоторыхъ противорѣчій между шестью первыми и тремя послѣдними книгами. Въ цѣломъ же система Евклида оставалась неприкосновенной, только аксіома о параллельныхъ систематически встрѣчала серьезныя осужденія со стороны авторовъ. Причина этого заключалась въ томъ, что при наличности гораздо болѣе простыхъ предложеній, которыя Евклидъ все же счелъ необходимымъ доказывать, содержаніе этой аксіомы казалось недостаточно простымъ, чтобъ ее постулировать.

Когда въ VI вѣкѣ послѣ Р. Х. угасла греческая культура, геометрія вновь опустилась на стѣнень орудія въ рукахъ ремесленниковъ, какимъ она была въ Египтѣ; даже древняя приближенная формула для площади треугольника (см. п. 1) опять заняла почетное мѣсто. Въ средніе вѣка книги Евклида были вновь призваны къ жизни благодаря арабамъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ математики съ новымъ усердіемъ занялись загадочнымъ постулатомъ о параллельныхъ линияхъ. Первое средневѣковое изданіе Евклида на латинскомъ языкѣ представляетъ собой переволъ съ арабскаго (1482). Лишь съ началомъ возрожденія вновь появились на свѣтъ греческіе кодексы Евклида и его комментаторовъ. Въ 1503 году появилось первое изданіе греческаго текста Евклида (Simon Grynaeus). Изъ попытокъ средневѣковыхъ математиковъ доказать пятый постулатъ (аксіому о параллельныхъ) самымъ старымъ является доказательство Насиръ Эддина (Nasir Eddin, XIII ст.); въ XVI столѣтіи Клавій (Clavius) опровергъ доказательство Прокла подобно тому, какъ Прокль обнаружилъ неправильность аналогичныхъ доказательствъ своихъ предшественниковъ. Трудность этой задачи становилась все яснѣе и привлекала многочисленныхъ математиковъ устранить это „пятно“ Евклидовой системы. Однако, доказательства эти либо просто содержатъ неправильные выводы, либо же явно или неявно принимаютъ другое предложеніе, которое на первый взглядъ никакихъ сомнѣній не вызываетъ. „То, что еще остается послѣ этого доказать, говорить по этому поводу Ламбертъ (Lambert), сначала представляется ничтожной мелочью, и въ этой именно мелочи, если хочешь ее со всего строгостью обосновать, по тщательномъ размысленіи, оказывается вся суть дѣла. Обыкновенно она предполагаетъ либо то предложеніе, которое нужно доказать, либо равносильное ему предложеніе“. Та же неудача постигла основателя неевклидовой геометріи — Геронима

Саккери (Hieronymus Saccheri, 1667 - 1733), издававшего сочинение „Euclides ab omni saevo vindicatus“, в котором онъ съ необычайнымъ остроуміемъ строитъ геометрію, отвергающую постулатъ о параллельныхъ линияхъ. Впрочемъ, Саккери былъ далекъ отъ того, чтобы дѣйствительно усумниться въ справедливости этой аксіомы и ея зависимости отъ остальныхъ посылокъ. Напротивъ, онъ рассчитывалъ придти этимъ путемъ къ противорѣчію и такимъ образомъ доказать ненавистную гипотезу. Въ тѣсной связи съ идеями Саккери и, повидимому, также и въ фактической зависимости отъ нихъ стоитъ теорія параллельныхъ линий Ламберта, которую Іоаннъ Бернулли послѣ смерти этого великаго человѣка опубликовалъ въ 1786 году въ журналѣ „Magazin für reine und angewandte Mathematik“.

4. Слишкомъ 2000 лѣтъ наиболѣе выдающіеся умы, твердо убѣжденные въ абсолютной справедливости предложенія, что изъ точки, лежащей внѣ прямой, можно провести одну и только одну параллельную ей прямую, тѣтно напрягали усилія къ тому, чтобы вывести это предложеніе, какъ слѣдствіе остальныхъ посылокъ. Но вотъ почти одновременно не одинъ, а четыре математика независимо другъ отъ друга разрушили эти цѣли, сковывавшіе умы математиковъ. Первымъ нужно назвать Гаусса, который, однако, ничего по этому предмету не опубликовалъ. Однако, изъ оставшихся послѣ него бумагъ съ несомнѣнностью явствуетъ, что онъ уже во всякомъ случаѣ въ 1799 году сомнѣвался въ возможности логически доказать аксіому о параллельности и не позже 1816 года предполагалъ уже основаніями гиперболической геометріи*). Независимо отъ него къ тому же результату около 1818 года пришелъ юристъ Швейкартъ (K. Schweikart) въ Марбургѣ. Но и эта работа не была опубликована. Выступить въ печати съ этимъ новымъ ученіемъ впервые рѣшились русскій профессоръ Н. И. Лобачевскій (Докладъ физико-математическому факультету Казанскаго Университета 12-го февраля 1826 года) и Іоаннъ Больэ (Johann Bolyai) въ 1832 году въ приложеніи къ сочиненію своего отца. Однако, ни тотъ ни другой не встрѣтили ни пониманія, ни сочувствія. Новое ученіе было встрѣчено частью съ полнымъ равнодушіемъ, частью съ издѣвательствомъ и въ качествѣ „Метагеометріи“ **) было поставлено на одну доску съ метафизикой, которая пользовалась дурной славой. Лишь работы Бельтрами, Римана, Гельмольца, Ли и др. до нѣкоторой степени разсѣяли предубѣжденіе, съ которымъ къ неевклидовой геометріи относились даже спеціалисты математики. Однако, новыя возрѣнія на основы геометріи, вѣроятно, еще долго оставались бы непризнанными,

*) Gauss. Werke, Bd. 8. Тамъ приведены также указанія относительно „Звѣздной“ геометріи Швейкарта. См. также Engel und Stäckel. „Die Theorie der Parallelen von Euklid bis auf Gauss“. Leipzig, 1895.

***) Самое слово „метагеометрія“ принадлежитъ Лейбницу.

если бы развитие современной теории функций и учения о комплексах не привело къ необходимости произвести также пересмотръ основныхъ понятій арифметики. Открытіе непрерывныхъ функций, не имѣющихъ производныхъ (Вейерштрассъ, Weierstrass), которымъ въ аналитической геометріи отвѣчаютъ непрерывныя кривыя, не имѣющія касательныхъ, доказательство возможности изобразить кривую на сплошной площадкѣ, становящаяся все болѣе ясной недостаточность стараго взгляда на числа, въ особенности на ирраціональныя числа, развитие понятія о непрерывности и учения о сходимости рядовъ, а также цѣлый рядъ другихъ обстоятельствъ привели къ тому, что подорвали въ корнѣ слѣпую вѣру въ надежность нашихъ чувственныхъ представлений и создали въ математикѣ критическое направленіе, оказавшее услуги и геометріи.

§ 2. Понятія „точка“, „линія“, „поверхность“.

1. Развитие современной теории функций обнаружило, что критика основаній должна была бы начаться не съ пятаго постулата, а еще съ перваго опредѣленія:

σημεῖον ἔστιν, ὃ μέρησιν ὀυδένῃ *).


Это понятіе возникаетъ изъ понятія—дѣйствительнаго или воображаемаго—о матеріальной точкѣ путемъ предѣльнаго процесса, т. е. путемъ дѣятельности нашего духа, ставящей опредѣленную цѣль ряду представлений, который самъ по себѣ неограниченъ. Представимъ себѣ, напримеръ, песчинку или пылинку, которая непрестанно становится все меньше и меньше. При этомъ выдѣленіе отдѣльныхъ частей внутри этой песчинки становится все менѣе и менѣе возможнымъ, и такимъ образомъ возникаетъ, какъ говорить, съ постоянно возрастающей опредѣленностью представленіе о точкѣ, какъ объ опредѣленномъ мѣстѣ въ пространствѣ, единомъ, не имѣющемъ частей. Однако, такая точка зрѣнія несостоятельна: мы, пожалуй, можемъ до нѣкоторой степени представить себѣ, что песчинка становится все меньше и меньше, но лишь до того момента пока она, по своей малости, не ускользаетъ вовсе отъ нашего глаза. Съ этого же момента процессъ становится совершенно темнымъ, и дальнѣйшаго уменьшенія мы не можемъ видѣть, мы не можемъ себѣ его представлять. Что этотъ процессъ закончится, этого мы себѣ не можемъ представить: но, съ другой стороны, что ему соответствуетъ опредѣленная цѣль, за которую онъ не можетъ перейти и которой онъ никогда не можетъ достигъ, этому мы должны вѣрить, или иначе, мы должны это

*) Хотя нижеслѣдующія разсужденія непосредственно и связаны съ основнымъ текстомъ евклидовыхъ опредѣленій, но они имѣютъ въ виду не евклидовы, а обыкновенныя воззрѣнія. Взглядамъ Евклида болѣе соответствуютъ соображенія, изложенныя въ §§ 7 и далѣе.

постулировать. Не слѣдует обманывать самого себя: если мы и можем себѣ представить, что песчинка неограниченно уменьшается, то мы съ такимъ же успѣхомъ можемъ себѣ вообразить, что мы размасгиваемъ ее въ микроскопъ, увеличительная сила котораго нарастаетъ въ такомъ же отношеніи, въ какомъ песчинка уменьшается. Въ такомъ случаѣ мы не замѣтимъ никакого измѣненія въ песчинкѣ, и становится очевиднымъ, какъ это впрочемъ ясно и безъ того, что процессъ уменьшенія въ нашемъ представленіи никогда не можетъ окончиться. Если мы все же хотимъ отнести этому процессу понятіе о точкѣ, „которая имъ однозначно опредѣляется“, то нужно относиться къ этому сознательно и понимать, что это есть лишь проявленіе нашей воли, а не нашего ума,— что такого рода „точка“ нашему представленію недоступна, а есть лишь нѣчто, приуроченное къ ряду представлений. Такимъ образомъ, къ первому опредѣленію во всякомъ случаѣ долженъ быть присоединенъ и первый постулатъ, заключающийся въ томъ, что точки вообще существуютъ. Пространственного существованія онѣ не имѣютъ. Если бы мы въ повседневномъ своемъ опытѣ вращались столь же часто въ царствѣ объектовъ, представляющихся ничтожно малыми, какъ мы вращаемся въ средѣ большихъ, то мы относились бы къ понятію о точкѣ съ гораздо меньшимъ довѣріемъ. Если подумать о богатой и многообразной жизни микрокосмоса, доступнаго нашимъ чувствамъ только благодаря микроскопу, о жизни водорослей и бактерій, о жизни раскитильныхъ и животныхъ клѣтокъ съ ихъ удивительно тонкой структурой; если подумать, что въ человѣческомъ зародышѣ заложено существо съ высокой организаціей, съ тѣми или иными особенностями тѣлосложенія, характера и ума; если все это взвѣсить, то мы не можемъ отдѣлаться отъ представленія, что все, кажушееся намъ малымъ, является таковымъ только относительно нашихъ чувствъ, что разумъ, устроенный нѣсколько иначе, нежели человѣческой, могъ бы легко отрѣшиться отъ чувственного различія между большимъ и малымъ.

2. Подобно тому, какъ точка является предѣльнымъ повятіемъ, которое мы связываемъ съ безпредѣльно убывающей песчинкой, мы соединяемъ понятіе о (кривой) линіи и (кривой) поверхности съ представленіемъ о матеріальной линіи или поверхности, которая становится все тоньше и тоньше безъ конца. Мы можемъ себѣ представить, напримѣръ, линію въ видѣ тонкой нити, поверхность въ видѣ тонкаго листа, которые становятся все тоньше,—или какъ острый край, или гладкая поверхность, которые становятся все острѣе и глаже. При образованіи понятія о поверхности нельзя исходить только отъ границы, отдѣляющей два тѣла; эта точка зрѣнія не охватываетъ всѣхъ случаевъ. Если мы, напримѣръ, возьмемъ такъ называемый листъ Мёбіуса (Möbius) (фиг. 1), который получимъ изъ прямоугольника AA_1BB_1 , если склеимъ края AA_1 и BB_1 , изогнувъ предварительно прямоугольникъ надлежащимъ образомъ,—

и попытаемся покрыть его съ одной стороны слоемъ воска или матеріей, то въ концѣ концовъ вся поверхность окажется обернутой матеріей, потому что она имѣетъ только одну сторону ¹⁾. Процессъ предѣльнаго перехода, который приводитъ къ понятіямъ о линіи и поверхности, вызываетъ тѣ же сомнѣнія, что и относительно точки. Точнаго представленія объ абсолютной гладкой поверхности не существуетъ: мы не можемъ представить себѣ поверхность глаже и тоньше матеріальныхъ поверхностей, которыя мы наблюдаемъ. И, наоборотъ, относительно двухъ матеріальныхъ поверхностей мы не въ состояніи указать, которая изъ нихъ тоньше, если обѣ очень тонки и разница въ толщинѣ незначительна; тоже справедливо и о гладкости. Даже поверхности жидкостей не абсолютно гладки, потому что жидкости непрерывно испускаютъ въ воздухъ безчисленное множество частичекъ; мы называемъ это испареніемъ. Жидкость имѣетъ, такимъ образомъ, столь же мало опредѣленную поверхность, какъ пчелиный рой. И вотъ отъ этихъ расплывчатыхъ представленій процессъ предѣльнаго перехода долженъ привести къ чему-то совершенно точному и опредѣленному. Это нѣчто не можетъ быть доступно нашему представленію; это должно быть чистое понятіе, которое мы относимъ (ассоциируемъ) процессу, какъ нѣчто имъ опредѣ-



Фиг. 1.

¹⁾ Когда мы рассматриваемъ обыкновенную поверхность, какъ границу двухъ тѣлъ, то мы себѣ всегда представляемъ, что поверхность имѣетъ двѣ стороны, изъ которыхъ одна прилегаетъ къ одному тѣлу, вторая къ другому. вмѣстѣ съ тѣмъ пространство можно раздѣлить на двѣ части, общей границей которыхъ служитъ наша поверхность. Этого нельзя сдѣлать, когда мы имѣемъ дѣло съ поверхностью объ одной сторонѣ, съ поверхностью Мёбиуса. Если мы представимъ себѣ нормаль къ обыкновенной поверхности, направленную въ одну сторону, скажемъ, внѣшнюю нормаль, и будемъ непрерывно передвигать ея основаніе по поверхности, такъ что и направленіе нормали будетъ мѣняться непрерывно, то при возвращеніи въ точку исхода нормаль совпадетъ съ первоначальнымъ своимъ направленіемъ. Точки нормали, прилежащія къ основанію, все время будутъ оставаться въ одномъ изъ двухъ тѣлъ, разграничиваемыхъ поверхностью. Одно изъ двухъ тѣлъ, соприкасающихся на поверхности, можетъ быть опредѣлено, какъ геометрическое мѣсто, которое образуютъ точки нормали (скажемъ, внѣшней), прилежащія къ ея основанію, когда нормаль, непрерывно мѣняя направленіе, своимъ основаніемъ обходитъ всю поверхность. Между тѣмъ на поверхности Мёбиуса этого не будетъ. Здѣсь, непрерывно мѣняя направленіе нормали, какъ это видно на чертежѣ, мы можемъ привести ее, при возвращеніи въ точку исхода, къ совпаденію съ противоположнымъ направленіемъ.

ляемое. Пространственного существования „линия“ и „поверхность“ не имѣютъ, какъ его не имѣть „точка“. Неужели же на столь сомнительныхъ основаніяхъ дѣйствительно можно построить геометрію?

§ 3. Понятія „прямая“, „плоскость“, „параллельность“.

1. Трудности и противорѣчія еще нарастаютъ, когда мы отъ (кривой) линіи и поверхности восходимъ къ прямой линіи и плоскости. Чтобы выяснить эти понятія или представленія, на которыхъ они основываются, намъ предлагаютъ обыкновенно представить себѣ сначала матеріальную прямую, напримѣръ, острое ребро кристалла, натянутую нить или лучъ свѣта,—а затѣмъ провести процессъ предѣльнаго перехода, о которомъ была рѣчь въ предыдущемъ параграфѣ. Грубое представленіе о прямой линіи можно составить и такимъ путемъ, что между двумя тѣлами A и B мы располагаемъ рядъ тѣлъ такимъ образомъ, чтобы они при визированіи покрывали другъ друга („взять направленіе“, какъ говорятъ военные). Этому соотвѣтствуетъ Платоново опредѣленіе прямой линіи, какъ такой, „которой середина заслоняетъ края“, т. е. какъ путь свѣтового луча. Нѣтъ нужды повторять, что съ матеріальной линіей мы не связываемъ точнаго представленія, на которомъ было бы возможно построить геометрическое понятіе; и свѣтовой лучъ не представляетъ собой чего-либо недѣлимаго въ своемъ направленіи; да и самыя поперечныя колебанія обуславливаютъ боковое протяженіе. Еще менѣе приемлемо опредѣленіе прямой, какъ того, что остается въ покоѣ при вращеніи тѣла вокругъ двухъ неподвижныхъ точекъ, ибо это опредѣленіе самымъ кореннымъ образомъ вводитъ въ геометрію движеніе съ его загадочными свойствами; къ тому же съ этимъ опять нельзя соединять никакихъ опредѣленныхъ представленій, изъ этого опредѣленія нельзя извлечь никакого вывода, цѣннаго для геометріи. Приписываемое обыкновенно Архимеду опредѣленіе прямой, какъ кратчайшаго разстоянія между двумя точками, предполагаетъ понятіе о длинѣ, по крайней мѣрѣ, о линейномъ элементѣ и, слѣдовательно, содержитъ уже въ себѣ понятіе о прямой линіи.

2. Какъ и ея модель, прямая (въ грубомъ представленіи) сначала представляется конечной, затѣмъ должна быть продолжаема бесконечно; это дѣлается, главнымъ образомъ, въ угоду понятію о параллельности, потому что опредѣленіе параллелизма гласитъ, что двѣ прямая, расположенныя въ одной плоскости, называются параллельными, если онѣ не пересѣкаются, когда мы ихъ продолжаемъ до бесконечности. Между тѣмъ это требованіе для такой прямой, которую мы себѣ можемъ представить, слѣдовательно, для прямой матеріальной, совершенно невыполнимо, потому что оно выходитъ за предѣлы того, что доступно нашему опыту и представленію; основываясь на этихъ опредѣленіяхъ, совершенно невозможно

убѣдиться, дѣйствительно ли данныя двѣ прямыя параллельны или нѣтъ. Понятіе о параллелизмѣ очень охотно связываютъ съ двумя линіями рельсоваго пути, которыя поддерживаются шпалами всегда на одинаковомъ разстояніи одна отъ другой и которыя никогда не могутъ пересѣчься, при неограниченномъ продолженіи этого пути. Но здѣсь прежде всего нужно было бы доказать, что при этихъ условіяхъ, если бы одна линія дѣйствительно была строго прямой, другая также оказалась бы таковою; далѣе здѣсь предполагается понятіе о перпендикулярѣ и о равенствѣ. Относительно грубыхъ линій, къ которымъ исключительно относятся наши представленія и нашъ опытъ, было бы наиболѣе разумно новсе не высказывать ничего такого, что необходимо заставляетъ выйти за предѣлы, въ которые поставлены наши чувства; если же мы съ этимъ не считаемся, то мы должны быть готовы къ тому, чтобы наткнуться на противорѣчіи и неясности.

3. Всѣ высказанныя здѣсь замѣчанія относятся, конечно, и къ плоскости; еще разъ къ этому возвращаться нѣтъ, конечно, надобности,—но на одно обстоятельство необходимо обратить вниманіе. Если мы натянемъ между двумя (грубыми) точками A и B нить, или вставимъ между ними промежуточные точки путемъ визироваія подобно тому, какъ мы направляемъ ружье на центръ цѣли, помѣщая его между мушкой и прицѣломъ ружья,—то мы убѣждаемся экспериментально, что между двумя матеріальными точками проходитъ только одна матеріальная прямая. Если мы опредѣляемъ, далѣе, плоскость, какъ поверхность, которую описываетъ прямая, проходящая черезъ точку P и скользящая по прямой p , то точка P и двѣ точки прямой p , которая, впрочемъ, не должна проходить черезъ точку P , вполне опредѣляютъ плоскость. Опредѣляется ли эта плоскость также и другими тремя своими точками, или, что сводится къ тому-же, содержитъ ли плоскость всякую прямую, проходящую черезъ двѣ ея точки, этотъ вопросъ можетъ быть разрѣшенъ только опытомъ. Такой опытъ мы можемъ произвести, напримѣръ, на поверхности стола, къ которой мы прикладываемъ линейку во всѣхъ направленіяхъ, если мы не претендуемъ на очень большую точность. Но сохраняются ли эти свойства, когда мы отъ матеріальной прямой или плоскости перейдемъ къ точнымъ геометрическимъ образцамъ? Можно ли, какъ это дѣлаетъ Евклидъ, постулировать, что прямая вполне опредѣляется двумя своими точками, или это уже заключается въ самомъ понятіи о прямой? Отвѣтить на эти вопросы нетрудно. Черезъ двѣ точки можно визировать на третью только до тѣхъ поръ, пока эти точки видны. Если въ процессѣ предѣльнаго перехода, который мы должны предпринять, эти точки становятся невидимыми, то мы оказываемся совершенно безпомощными, такъ какъ вставить промежуточные точки становится невозможнымъ; если мы воспользуемся зрительной трубой, то и она, конечно, не долго можетъ быть

намъ полезной. Не меньше затрудненій доставить намъ натянутая нить, если мы захотимъ произвести процессъ предѣльнаго перехода; въ самомъ дѣлѣ, вѣдь натянутая нить должна оставаться матеріальной, а это находится въ неизбѣжномъ противорѣчii съ задачей предѣльнаго процесса. Выводъ изъ всего этого тотъ, что съ матеріальной прямой, какъ бы мы ее ни воспроизводили, точнаго предѣльнаго перехода осуществить невозможно. Если же мы все таки хотимъ придти къ опредѣленному понятію, то нужно ввести въ опредѣленіе этого понятія такой рядъ свойствъ матеріальной прямой, чтобы мы могли при помощи этого опредѣленія (а не представления) получить все то, что дастъ уточненная матеріальная прямая. Такимъ образомъ, мы уже здѣсь видимъ, что евклидовы опредѣленія совершенно непригодны для логическихъ доказательствъ. Къ числу тѣхъ свойствъ матеріальной прямой, которыя нужно ввести въ опредѣленіе точнаго понятія, принадлежитъ именно то, что прямая опредѣляется двумя точками; аналогично этому въ опредѣленіе плоскости, которое также нельзя установить при помощи предѣльнаго перехода, необходимо ввести либо непосредственно то свойство, что она содержитъ всякую прямую, проходящую черезъ двѣ ея точки, либо эквивалентное этому свойство. Итакъ, прямая и плоскость могутъ быть опредѣлены и вообще призваны къ существованію не путемъ предѣльнаго перехода отъ объектовъ нашего созерцанія, а помощью опредѣленныхъ свойствъ.

§ 4. Движеніе и конгруэнтность.


1. На разборѣ понятія „между“, которое непосредственно сюда же примыкаетъ, мы не будемъ останавливаться, чтобы не утомлять читателя; но трудности, съ которыми связано понятіе о движеніи, мы считаемъ необходимымъ выяснитъ, такъ какъ на этомъ понятіи покоится все ученіе о конгруэнтности. „Два отрѣзка считаются равными или конгруэнтными, если ихъ можно наложить одинъ на другой“. Оставаясь на этомъ извѣстномъ опредѣленіи, мы можемъ рѣшить вопросъ о равенствѣ двухъ отрѣзковъ только эмпирическимъ путемъ, непосредственно налагая одинъ отрѣзокъ на другой. Съ этимъ можно было бы еще мириться, если бы позже мы нашли другія средства, которыя давали бы возможность рѣшить тотъ же вопросъ непосредственно при помощи геометрическихъ образовъ, существованіе которыхъ мы признаемъ *). Такія средства дѣйствительно существуютъ, какъ мы это увидимъ ниже; но элементарная геометрія никогда не старалась воспользоваться ими для устраненія эмпирическихъ

*; Прямая, окружности и т. п. образы мы будемъ называть „существующими“, если они есть въ пространствѣ или если мы ихъ таковыми мыслимъ, такъ что нѣтъ надобности предварительно ихъ „проводить“, какъ это обыкновенно дѣлается въ школьной геометріи.

прямовъ. Между тѣмъ это необходимо еще и по другой причинѣ. Установить, что два отрезка могутъ покрыть другъ друга возможно только на материальныхъ прямыхъ. Къ геометрическимъ прямымъ вышеприведенное опредѣленіе, такимъ образомъ, вовсе не относится. Точно такъ же два угла мы называемъ равными или конгруэнтными, если они могутъ быть наложены одинъ на другой такимъ образомъ, что стороны ихъ совпадаютъ. Здѣсь мы можемъ, конечно, вновь сдѣлать то же возраженіе, что объекты чистаго мышленія, которые мы называемъ геометрическими прямыми, не могутъ быть передвигаемы; такимъ образомъ, это опредѣленіе также падаетъ. Или, быть можетъ, мы и движеніе должны себѣ только представлять? Но что же такое движеніе?

2. Понятіе о равенствѣ материальныхъ прямыхъ мы можемъ все же основывать на движеніи; но въ геометрію это опредѣленіе безъ дальнѣйшаго развитія войти не можетъ. Если бы, такимъ образомъ, тѣ, которые утверждаютъ, что геометрія безъ движенія обойтись не можетъ, были правы, то мы стояли бы передъ непреодолимымъ препятствіемъ. Точная геометрія была бы въ такомъ случаѣ невозможна. Дѣло, однако, обстоитъ не такъ.

Разберемся сначала въ томъ, что намъ, собственно, даетъ движеніе въ томъ случаѣ, который мы разобрали выше!



Фиг. 2.

1) Если данъ (материальный) отрезокъ AB , прямая n и точка A' на ней, то движеніе совершенно опредѣленнымъ образомъ относитъ точкамъ AB и A' въ данномъ направленіи на прямой n и некоторую точку B' , и мы говоримъ, что отрезокъ $A'B'$ конгруэнтенъ отрезку AB , символически $A'B' \simeq AB$. Въ частности, въ этомъ смыслѣ $AB \simeq AB$. Далѣе, относительно движенія мы можемъ сказать:

2) Если движеніе относитъ отрезку AB два отрезка $A'B'$ и $A''B''$, какъ конгруэнтные ему, то отрезки $A'B'$ и $A''B''$ также соответствуютъ другъ другу, какъ конгруэнтные.

Далѣе:

3) Если на одной и той же прямой a или на двухъ различныхъ прямыхъ a, a' тремъ точкамъ A, B, C , изъ которыхъ B лежитъ между A и C соответствуютъ три точки A', B', C' , при чемъ B' лежитъ между A' и C' , если при этомъ $AB \simeq A'B'$ и $BC \simeq B'C'$, то $AC \simeq A'C'$.

Можно было бы установить еще цѣлый рядъ предложеній того же рода. Аналогичныя услуги оказываетъ движеніе и по отношенію къ угламъ.

4) Пусть въ плоскости α данъ уголъ со сторонами h, k , а въ плоскости α' (которая можетъ совпадать съ плоскостью α) пусть будутъ даны

лучь h' и определенная сторона плоскости α' относительно h' ; въ такомъ случаѣ движеніе совершенно определенно относить даннымъ образомъ нѣкоторый лучь k' въ плоскости α' , проходящій черезъ вершину луча h' , и мы говоримъ, что уголъ $h'k'$ конгруэнтенъ углу hk . Въ частности, въ этомъ смыслѣ уголъ hk конгруэнтенъ самому себѣ. Предложенію 2) соответствуетъ слѣдующее:

5) Если два угла конгруэнтны третьему, то они конгруэнтны между собой.

Такимъ образомъ можно было бы указать еще много свойствъ отрѣзковъ и угловъ, которыя происходятъ только отъ движенія; къ этому нужно было бы присоединить далѣ свойства конгруэнтныхъ треугольниковъ, но Гильбертъ въ своемъ знаменитомъ сочиненіи „Основанія геометрии“^{*)} показалъ, что къ этимъ пяти свойствамъ движенія нужно присоединить еще только одно, чтобы собрать все то, что движеніе даетъ намъ при доказательствѣ предложеній о конгруэнтности; все остальное вытекаетъ уже строго дедуктивно. Это шестое предложеніе заключается въ слѣдующемъ:

6) Если въ треугольникахъ ABC и $A'B'C'$

$$AB \cong A'B', \quad AC \cong A'C', \quad \sphericalangle BAC \cong \sphericalangle B'A'C',$$

то

$$\sphericalangle ABC \cong \sphericalangle A'B'C' \quad \text{и} \quad \sphericalangle ACB \cong \sphericalangle A'C'B'.$$

Гильбертъ при определеніи конгруэнтности дѣлаетъ даже такое ограниченіе, что онъ сначала не опредѣляетъ этого свойства, какъ взаимное, такъ что, напримѣръ, въ предложеніи 1) онъ принимаетъ только, что отрѣзокъ AB конгруэнтенъ отрѣзку $A'B'$ и не дѣлаетъ предположенія, что отрѣзокъ $A'B'$, въ свою очередь, конгруэнтенъ AB . Взаимность этого соотношенія уже вытекаетъ изъ предложеній 2) и 5). Относящіяся сюда детали, а также прежде всего доказательства предложеній о конгруэнтности можно найти непосредственно у Гильберта^{**)}.

3. То обстоятельство, что всякое предложеніе, касающееся конгруэнтности, можно доказать съ помощью посылокъ 1)—6), не обращаясь болѣе къ движенію, ведетъ къ слѣдующему замѣчательному выводу: если бы мы имѣли такой конструктивный приемъ,—назовемъ его, скажемъ, идеальнымъ движеніемъ,—который не имѣлъ бы съ обыкновеннымъ движеніемъ ничего общаго, кромѣ свойствъ 1)—6), то на этомъ идеальномъ движеніи можно было бы основать понятіе объ идеальной конгруэнтности и строго логически доказать основныя предложенія о конгруэнтности

*) D. Hilbert, „Die Grundlagen der Geometrie“. Leipzig 1903 (2. Auflage) § 5 и 6. Издательство „Mathesis“ готовитъ переводъ этого сочиненія.

**) Нашимъ предложеніямъ 1)—6) у Гильберта соответствуютъ точно положенія III₁—III₄.

треугольников²⁾. Конгруэнтность, как мы ее понимаем, представляла бы собой лишь частный случай идеальной конгруэнтности. Такие идеальные конгруэнтные образы могли бы вовсе не быть конгруэнтными в обычном смысле слова. Такая идеальная конгруэнтность действительно возможна. Чтобы такую установить в некоторой плоскости η , выберем произвольно другую плоскость η' и точку P вне обеих плоскостей; два отрезка A_1B_1 и A_2B_2 в плоскости η мы условимся называть „идеально конгруэнтными“, если их проекции $A_1B'_1$, $A_2B'_2$ из точки P на плоскость η' , определяемые лучами PA_1 , PA_2 , PB_1 , PB_2 , конгруэнтны в обычном смысле этого слова³⁾. Конечно, эта псевдоконгруэнтность зависит от обыкновенной конгруэнтности; но она во всяком случае доказывает, что не всякая идеальная конгруэнтность necessarily тождественна с обыкновенной и что построение этого понятия вообще допустимо. На этой именно точке зрения стоит Гильберт, который определяет идеальную конгруэнтность свойствами 1) — 6), т. е. определять ее постольку, поскольку она именно этими свойствами характеризуется. В пределах определенного геометрического рассуждения нужно всегда предполагать, что мы имеем дело с одной определенной формой осуществления этой идеальной конгруэнтности⁴⁾.

4. Если этот прием и не может никогда вести к противоречию, то он все же вызывает следующие соображения.

2) Автор хочет сказать следующее: если бы имело правило (или ряд правил), которое давало бы нам возможность чисто геометрически, при помощи ряда построений, без помощи движения, отличать конгруэнтные и неконгруэнтные образы в согласии с положениями 1) — 6), то такой прием содержал бы уже в себе точное определение конгруэнтности.

3) Необходимо себя вполне уяснить, что устанавливаемая этим соглашением „псевдоконгруэнтность“ обладает свойствами, выраженными в предложениях 1) — 6), как и обыкновенная конгруэнтность. Если, например, отрезки A_1B_1 и A_2B_2 в этом смысле конгруэнтны отрезку A_3B_3 , то это означает, что проекции $A_1B'_1$ и $A_2B'_2$ этих отрезков на плоскость η' действительно конгруэнтны проекции $A_3B'_3$ отрезка A_3B_3 . Но в таком случае отрезки A_1B_1 и A_2B_2 действительно конгруэнтны между собой, а потому отрезки A_1B_1 и A_2B_2 псевдоконгруэнтны.

Нужно, однако, сказать, что некоторое затруднение здесь возникает вследствие того, что некоторые точки плоскости η могут не иметь проекций на плоскость η' . Это затруднение устраняется, как мы увидим ниже, если мы оперируем в т. н. проективном пространстве (правильнее даже, в эллиптическом пространстве).

4) Иными словами, с точки зрения Гильберта, за конгруэнтность можно принять всякое соотношение между геометрическими образами, обладающее свойствами 1) — 6). В каждом частном случае, однако, это соотношение должно быть фиксировано; и на этой именно точке зрения, что установлено некоторое соотношение между геометрическими образами, удовлетворяющее требованиям 1) — 6), и что это именно соотношение принимается за конгруэнтность, и стоит Гильберт.

57265

5006

Первое. Если существуетъ приемъ сопряженія отръзковъ и угловъ, который выполняетъ условія идеальной конгруэнтности, то можно признать вполне справедливымъ требованіе, чтобы такой приемъ былъ дѣйствительно указанъ, чтобы мы дѣйствительно могли геометрію развивать геометрически, ибо пока такого приема нѣтъ, до тѣхъ поръ мы не можемъ производить построений.

Второе. Такой приемъ, какъ и вообще идеальная конгруэнтность, не можетъ изгнать изъ геометріи обычную несовершенную конгруэнтность, если онъ самъ, какъ въ указанномъ выше случаѣ, зависитъ отъ обыкновенной конгруэнтности. Движеніе было бы тогда въ геометріи однимъ изъ неизбѣжныхъ золь. Необходимо ли, такимъ образомъ, втиснуть въ геометрію, въ видѣ понятія о конгруэнтности, начало, имѣющее эмпирическое происхожденіе, совершенно чуждое остальнымъ ея основнымъ понятіямъ и посылкамъ, или мы можемъ безъ этого обойтись, — должны ли мы идеальную конгруэнтность просто предполагать, какъ нѣчто данное, отъ обычной конгруэнтности независящее, или мы можемъ это понятіе сами построить, — это въ системѣ Гильберта остается недостаточно выясненнымъ. Какое значеніе имѣетъ увѣренность, что идеальная конгруэнтность никогда не можетъ привести къ противорѣчію, если мы не въ состояніи ея осуществить, не прибѣгая къ обыкновенной конгруэнтности? Идеальная конгруэнтность, безъ пособія эмпирическихъ и физическихъ средствъ, (циркуль, линейка) существуетъ только тогда, когда она установлена тѣмъ самымъ, что установлены всѣ точки, линіи и поверхности. Такимъ образомъ должно быть возможно:

А) воспроизводить равные отръзки и углы посредствомъ „имманентнаго геометрическаго построенія“, т. е. такого построенія, которое не прибѣгаетъ къ матеріальнымъ инструментамъ ни непосредственно, ни даже въ представленіи; построеніе это должно, такимъ образомъ, заключаться въ томъ, чтобы мы, предполагая существованіе въ пространствѣ точекъ, поверхностей и линій^{*)}, вызывали въ нашемъ сознаніи тѣ изъ нихъ, при посредствѣ которыхъ устанавливается соотвѣтствіе отръзковъ, именуемыхъ конгруэнтными. Для того же, чтобы движеніе все таки, въ концѣ концовъ, не появлялось въ геометріи, необходимо, чтобы

В) на этомъ „имманентномъ построеніи“ можно было основать также „имманентное опредѣленіе конгруэнтности“, т. е. нужно, чтобы мы, исходя изъ этого построенія, никоимъ образомъ не прибѣгая къ конгруэнтности, могли предварительно чисто логически доказать, что условія 1) — 6) соблюдены; тогда можно было бы конгруэнтность просто опредѣлить этимъ построеніемъ. Такимъ образомъ, вопросъ о томъ, есть ли въ строго логической геометріи мѣсто конгруэнтности, зависитъ отъ дру-

*) См. примѣчаніе на страницѣ 14.

того вопроса: существует ли „имманентное построение“ конгруэнтных отрезков и углов, относительно которого, не прибѣгая къ обычнымъ предположеніямъ о конгруэнтности, можно доказать, что оно допускаетъ однозначное сопряженіе, требуемое предположеніями 1) — 6)?⁵⁾

§ 5. Построеніе Штейнера.

1. Существуетъ построеніе, которое удовлетворяетъ, по крайней мѣрѣ, требованію А) предыдущаго параграфа. Як. Штейнеръ въ знаменитомъ небольшомъ своемъ сочиненіи^{*)}, которое должно быть отнесено къ перламъ элементарной математики, чрезвычайно простыми средствами обнаружилъ, что всякое построеніе, которое можетъ быть произведено циркулемъ и линейкой, можетъ быть выполнено одной только линейкой, если намъ дана одна окружность и ея центръ. Такъ какъ линейка служить здѣсь исключительно для проведенія прямыхъ линий, то намъ достаточно представить себѣ или, лучше, мыслить эту окружность и всѣ прямыя, какъ уже существующія, и мы получимъ требуемое имманентное построеніе. Конечно, понятія прямая и окружность должны быть безукоризненно опредѣлены; здѣсь мы должны предварительно допустить, что это сдѣлано. Штейнеръ въ своихъ построеніяхъ пользуется свойствами трапеціи которая легко доказать:

Предложеніе 1. Прямая, соединяющая точку пересѣченія непараллельныхъ сторонъ трапеціи съ точкой пересѣченія ея діагоналей, дѣлитъ параллельныя стороны трапеціи пополамъ.

Предложеніе 2. Если прямая, соединяющая точку пересѣченія двухъ противоположныхъ сторонъ четырехугольника съ точкой пересѣченія діагоналей, дѣлитъ одну изъ двухъ другихъ сторонъ пополамъ, то она дѣлитъ и четвертую сторону пополамъ, и послѣднія двѣ стороны параллельны⁶⁾.


Если, слѣдовательно, даны двѣ параллельныя прямыя u и v и на одной изъ нихъ, скажемъ, на прямой v данъ отрезокъ AB , то мы можемъ помощью одной линейки раздѣлить этотъ отрезокъ пополамъ (фиг. 3).

⁵⁾ Нужно сознаться, что эти идеи изложены здѣсь крайне неясно. Какъ ихъ понимаетъ авторъ, выясняется отчасти въ слѣдующемъ параграфѣ, — а главнымъ образомъ, въ слѣдующей главѣ, гдѣ дѣйствительно устанавливаются въ различныхъ случаяхъ критеріи конгруэнтности.

^{*)} Jacob Steiner. „Geometrische Konstruktionen“. Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften. № 60. Издательство „Mathesis“ готовитъ къ печати переводъ этого сочиненія.


⁶⁾ Если мы себѣ представимъ, что на фиг. 3 въ четырехугольникѣ $ABba$ стороны AB и ab пересѣкаются въ нѣкоторой точкѣ N , то точки N и M дѣлятъ гармонически отрезокъ AB по свойствамъ полнаго четырехугольника. Если поэтому точка N уходитъ въ безконечность, то M представляетъ собой середину отрезка AB — и обратно. Таковы соображенія Штейнера; но предложеніе можно доказать, и не прибѣгая къ гармоническому дѣленію.

Для этого выберем на прямой u произвольно две точки a и b и точку пересечения S прямых Aa и Bb соединим с точкой пересечения T



и проводим прямые SA , SM , SB и aB . Прямые aB и SM определяют точку пересечения T ; а прямая AT встречает прямую SB в точке b таким образом, что прямая ab параллельна прямой AB . (Построение 2).

Если теперь на нашей плоскости начерчена окружность K с центром O (фиг. 4), то точка O делит пополам каждый диаметр PP' . Следовательно, при помощи построения 2., мы можем через любую точку Q



окружности (как и через любую другую точку) провести прямую, параллельную PP' . Если R есть вторая точка пересечения этой параллели с окружностью K , то диаметры QO и RO определяют на нашей окружности для других точки Q' и R' таким образом, что прямые QR , PP' и $Q'R'$ параллельны и отстоят друг от друга на одно и то же расстояние. Эти три прямые встречают всякую прямую g , или не параллельную, в трех точках, из которых две точки также отстоят на равных расстояниях от средней точки. Следовательно, при помощи построения 2. можно через любую точку провести прямую, параллельную прямой g . При помощи же построения 1. мы теперь можем на прямой g разделить любой отрезок пополам. Так как диаметр PP' всегда можно выбрать так, чтобы он не был параллелен заданной прямой g , то мы получим теорему:

Предложение 3. Если начерчена окружность и дана ее центром, то с помощью линейки, без циркуля, возможно:

прямых Ab и Ba . Эта прямая ST делит пополам не только отрезок AB , но и отрезок ab . (Построение 1).

Наоборот, если дана середина M отрезка AB и точка a вне прямой AB , то мы можем провести через точку a прямую, параллельную AB . Для этого на прямой Aa выбираем произвольно точку S , отличную от A и a ,

и проводим прямые SA , SM , SB и aB . Прямые aB и SM определяют точку пересечения T ; а прямая AT встречает прямую SB в точке b таким образом, что прямая ab параллельна прямой AB . (Построение 2).


Если теперь на нашей плоскости начерчена окружность K с центром O (фиг. 4), то точка O делит пополам каждый диаметр PP' . Следовательно, при помощи построения 2., мы можем через любую точку Q

окружности (как и через любую другую точку) провести прямую, параллельную PP' . Если R есть вторая точка пересечения этой параллели с окружностью K , то диаметры QO и RO определяют на нашей окружности для других точки Q' и R' таким образом, что прямые QR , PP' и $Q'R'$ параллельны и отстоят друг от друга на одно и то же расстояние. Эти три прямые встречают всякую прямую g , или не параллельную, в

1) къ данной прямой через данную точку провести параллельную прямую;

2) раздѣлить данный отрезок пополамъ.

2. После этихъ предварительныхъ разсужденій мы можемъ прежде всего указать приемъ Штейнера для „передвиженія“ отрезка вдоль по своей прямой. Чтобы на прямой u отложить отъ точки A' отрезокъ, равный AB , въ томъ же направленіи (фиг. 5), проведемъ, согласно предположенію 3, двѣ прямыя v и w , параллельныя прямой u . Далѣе, произвольную точку S на прямой w соединимъ прямыми съ точками A и B . Пусть a и b будутъ точки пересѣченія прямой v съ прямыми SA и SB ; тогда прямая $A'a$ опредѣляетъ на прямой w точку S' такимъ образомъ, что прямая $S'b$ встрѣчаетъ прямую u въ требуемой точкѣ B' , т. е. $A'B' = AB$.



Фиг. 5.


Легко уяснить себѣ, какъ произвести то же построение, если отрезокъ $A'B'$ долженъ имѣть направленіе, противоположное AB . Заданную точку, отъ которой нужно произвести отложеніе, лучше всего въ этомъ случаѣ обозначить черезъ B' и затѣмъ указаннымъ выше построениемъ опредѣлить точку A' . Доказательство основывается на подобіи треугольниковъ aSb и ASB , съ одной стороны, и треугольниковъ aSb и $A'SB'$, съ другой стороны. Такъ какъ три параллели отсѣкаютъ на любыхъ двухъ прямыхъ пропорціональныя части, то

$$AB : ab = SA : Sa = S'A' : S'a = A'B' : ab,$$


слѣдовательно $AB = A'B'$.

Къ этому построению мы присоединимъ еще одно, которое даетъ возможность произвести поворотъ отрезка, расположеннаго на диаметрѣ данной окружности K , вокругъ ея центра O . Положимъ, что диаметръ d , на которомъ лежитъ отрезокъ PQ , нужно повернуть такимъ образомъ, чтобы онъ занялъ положеніе d' (фиг. 6). Прямая d' пересѣкаетъ окружность K въ двухъ точкахъ; мы можемъ еще произвольно выбрать изъ нихъ точку A' , въ которую должна упасть точка окружности A , лежащая между O и P . Если мы теперь черезъ точки P и Q проведемъ прямыя, параллельныя AA' (предположеніе 3₁), то онѣ встрѣтятъ прямую d' въ двухъ точкахъ P' и Q' , причемъ, какъ легко показать, $P'Q'$ равно PQ .

Положим наконец, что нам нужно произвольный отрезок AB на прямой u перенести на любую другую прямую u' , при чем конечная точка данного отрезка и его направление нам заданы. В таком случае, очевидно, нужно только из центра O провести две прямые v и v' (фиг. 7),




Фиг. 6.



Фиг. 7.

параллельная данному, перенести отрезок $PQ = AB$ на прямую v посредством построения параллелограмма $PQAB$, далее повернуть отрезок PQ в положение $P'Q'$ на прямой v' и, наконец, перенести отрезок $P'Q'$ на прямую u' путем построения параллелограмма $P'Q'A'B'$; тогда $A'B' = AB$. Смотри потому, отмечена ли данная конечная точка E отрезка $A'B'$ буквою A' или B' , искомая точка (соответственно B' или A') расположена на прямой u' справа или слева от точки E .



Фиг. 8.


3. Предложение 4. Если в данной окружности K центральные углы AOB и $A'O'B'$ равны (фиг. 8), то, смотря потому, можно ли одноименная сторона

привести в совпадение вращением вокруг точки O , не выводя их из плоскости, или нет, мы будем иметь:

$$AB \parallel BA' \text{ или } AA' \parallel BB'.$$

Чтобы это доказать, нужно из центра O опустить перпендикуляр на одну из параллелей и воспользоваться симметрией фигуры относительно этого перпендикуляра.

Опираясь на предложения 3. и 4., можно при помощи одной линейки повернуть центральный угол неподвижного круга K вокруг центра O в любое требуемое положение ⁷⁾. Чтобы теперь привести любой угол со сторонами b, k в новое положение b', k' , в котором луч b' и сторона, с которой должен быть расположен луч k' относительно b' , заданы, мы поступим следующим образом (фиг. 9): из центра O проведем лучи a, b и a', b' , параллельные и сонаправленные с лучами b, k, b' ; затем повернем угол $a, b = b, k$ в положение a', b' таким образом, чтобы угол $b', k' = a', b' = a, b = b, k$ был расположен с требуемой стороны луча b' , когда мы проведем луч k' параллельно лучу b' , принимая во внимание его направление. Это построение несколько сложно, но его легко понять. При вращении центрального угла, нужно пользоваться точками A и B , которые определяются на окружности лучами b и k , взятыми в направлении лучей a и b , а не дополнительными лучами.



Фиг. 9.

При изложении этой теории для удобства речи мы пользовались обычными выражениями элементарной геометрии; мы говорили, что прямую, на которой мы сосредоточиваем наше внимание, всегда нужно „провести“. Если же мы будем просто предполагать, что окружность, все прямые и точки уже существуют, как это необходимо сделать в строгой логической геометрии, то для „построения“ нужно только вызвать в сознании необходимые линии и точки. Тогда мы получаем требуемое „имманентное построение“ ⁸⁾.

⁷⁾ Если, следовательно, мы желаем повернуть угол AOB в положение $A'O'B'$ (фиг. 8₁), то мы должны провести прямую BA' , а затем параллельную ей прямую AB' ; последняя в пересечении с окружностью дает точку B' . Если же мы желаем повернуть угол другой стороной так, чтобы он занял положение $A'O'B'$ (фиг. 8₂), то мы должны провести сперва прямую AA' , а потом параллельную ей прямую BB' .

⁸⁾ Построение Штейнера дает возможность указанными средствами отложить на данной прямой при данной точке в данном направлении отрезок, равный данному, и при данном луче с данной стороны его угол, равный данному. Если поэтому некоторая плоская фигура перемещена в плоскости (с поворотом другой стороной или без него) так, что некоторая точка O и луч OA совпадают с данной точкой O' и лучем $O'A'$, то с помощью построения Штейнера мы имеем возможность построить точку B' , с которой совместится любая точка B фигуры: для этого достаточно при луче $O'A'$ с надлежащей стороны построить луч $O'B'$

§ 6. Натуральная геометрія.

1. Идеализация при посредствѣ предѣльнаго перехода, которая обыкновенно производится надъ сырымъ матеріаломъ геометріи—матеріальными точками, прямыми и плоскостями, чтобы освободить его отъ неопредѣленности и всякой произвольности, вызвала такой рядъ сомнѣній, что возникаетъ какъ бы даже вопросъ объ истинности всей геометріи. Съ другой стороны, какъ мы увидимъ ниже, аналитическая геометрія, если развивать ее, какъ чистый анализъ трехмѣрнаго линейнаго численнаго многообразія⁹⁾ безъ всякаго отношенія къ пространственнымъ представленіямъ, обнаруживаетъ, что элементарная геометрія никогда не можетъ привести къ логическому противорѣчію. И все же наши критическія указанія, что такъ называемыя „геометрическія“ точки, плоскости и прямыя не имѣютъ пространственнаго существованія, что обыкновенное опредѣленіе конгруэнтности относится только къ матеріальнымъ, совершенно неизмѣннымъ образамъ и т. д., остаются въ полной силѣ. Содержащееся въ этомъ кажушемся противорѣчіи разрѣшается слѣдующимъ образомъ.

Евклидъ, конечно, предпосылаетъ своей системѣ сомнительныя опредѣленія, и многіе учебники, даже такой прекрасный, какъ Бальцера¹⁰⁾, повторяютъ то же еще и по настоящее время. Но при дальнѣйшемъ развитіи системы изъ этихъ опредѣленій не дѣлается никакихъ выводовъ, потому что къ этому не представляется повода. Что, собственно, худого даже въ томъ, что окружность или другая линія имѣютъ въ толщину нѣсколько десятыхъ миллиметра? Лишь въ теоріи функций сказывается надобность въ точкахъ, не имѣющихъ протяженія, и линіяхъ, не имѣющихъ толщины, именно, когда мы относимъ въ комплексной числовой плоскости каждому числу точку и обратно. Несогласія, вызываемая недопустимой идеализаціей основныхъ понятій, издавна возникали лишь въ ученіи о параллельныхъ линіяхъ и вообще повсюду, гдѣ играетъ роль понятіе о безконечности. Если поэтому элементарная геометрія можетъ остаться въ силѣ, какъ геометрія созерцаемаго, то она должна быть построена, безъ всякой идеализаціи.

2. Возникаетъ вопросъ, нельзя ли построить геометрію—ее можно было бы назвать натуральной геометріей,—которая категорически отказалась бы отъ всякаго предѣльнаго перехода и придерживалась бы

такъ, чтобы онъ составилъ съ лучемъ OA' уголъ $A'O'B'$, равный углу AOB , и на немъ отложить отрезокъ $O'B'$, равный OB . Въ этомъ смыслѣ построеніе Штейнера даетъ возможность осуществить геометрически наше переимѣненіе фигуры въ ея плоскости. Это авторъ и имѣетъ въ виду.

⁹⁾ Это понятіе выяснится ниже.

¹⁰⁾ R. Baltzer. „Elemente der Mathematik“, въ двухъ томахъ. Въ шестидесятыхъ годахъ это было наиболѣе распространенное въ Германіи сочиненіе по элементарной математикѣ. Во второмъ изданіи этого сочиненія, появившемся въ 1867 г., была впервые изложена для широкой публики сущность идей Н. И. Лобачевского.

только того, что наши чувства действительно воспринимают, или, по крайней мере, того, что мы представляем себя доступным нашим чувствам, т. е. материальных точек, линий и поверхностей в конечной части пространства, которая доступна нашему обозрению, в пределах которой мы можем даже подвергнуть проверке все наши суждения и выводы. Научная система натуральной геометрии должна была бы прежде всего в вводной главе собрать сырой материал геометрии в фактах и представлениях методами естествознания. Такого рода глава, как мы себя ее представляем, составила бы прекрасный материал для пропедевтического обучения геометрии, чтобы пробудить и укрепить пространственные представления, чтобы развить способность к геометрическому созерцанию — этому первоисточнику геометрического творчества. Чего бы только нельзя было сказать о материальной прямой! Натянутая нить, не слишком большой длины, как мы уже указывали выше, могла бы пробудить представление о прямой. Мы можем вытянуть проволоку таким образом, чтобы она плотно прилегала к натянутой нити, это была бы более устойчивая модель. Визируя вдоль этой проволоки, мы как бы сводим ее к точке: „внутренняя ее часть заслоняется наружной“ (Платон). Мы подопрем проволоку в двух точках, она остается неподвижной, между тем при одной подпертой точке (за исключением середины) она не могла бы оставаться в покое. Мы далее сдвигаем пруть, сохраняя те же две точки опоры и в то же время визируем: прямая опять-таки сводится к точке и как будто остается в покое. Таким образом устанавливается, что прямая (отрезок) может быть продолжена, а также и тот факт, что она может быть механически проложена через две точки и в понятие ими определяется. Затем можно было бы выяснить провешивание¹¹⁾ прямых линий в поле путем последовательного визирования, упомянуть о прицелье и о многом другом, на чем эмпирически осуществляется понятие о прямой. Наконец, линейка была бы наиболее совершенной реализацией прямой линии, но взгляды в увеличительное стекло предостерегали бы нас от иллюзий, что это осуществление прямой действительно достигает совершенства*).

3. Наблюдения становятся обильнее, когда мы восходим к понятию о натуральной (материальной) плоскости. Зеркальная поверхность спокойной жидкости может послужить прототипом; мы тотчас замечаем, что мы можем прикладывать к ней острие линейки во всех направлениях. Это свойство мы сейчас же замечаем и на ряде других поверх-

¹¹⁾ Подъ „провешиваніемъ“ прямой линии въ геодезіи разумѣютъ последовательное нанесеніе въ поле точекъ, расположенныхъ на одной прямой.

См. Э. Вихертъ „Введеніе въ геодезію“. 80 стр. и 41 рис. Mathesis.

*) Ср. также. P. du Bois-Reymond, „Die allgemeine Funktionentheorie“. Tübingen 1882.

ностей, которыя мы непосредственно приложимъ для испытанія къ поверхности жидкости. Такимъ образомъ мы получимъ въ видѣ, напимѣръ, тонкой пластинки прочную модель плоскости. Она механически устанавливается на трехъ своихъ точкахъ, не расположенныхъ на одной прямой (за исключеніемъ прямыхъ, проходящихъ черезъ центръ тяжести, которыя достаточно подпереть въ двухъ точкахъ); по тремъ точкамъ опоры пластинку можно свободно передвигать, при чемъ при визированіи она не двигается: плоскость опредѣляется тремя точками. Далѣе было бы интересно показать, какъ различнаго рода ремесленники изготовляютъ (ограниченную) плоскость, какъ они ее затѣмъ продолжаютъ во всѣхъ направленіяхъ. Тѣ особенныя прямая, которыя достаточно закрѣпить, чтобы механически привести плоскость въ равновѣсіе, перемѣщаются при ея продолженіи, какъ и центръ тяжести; они представляютъ собой, такимъ образомъ, перемѣнныя свойства натуральной плоскости, тогда какъ способность ея опредѣляться тремя точками, не лежащими на одной прямой, представляетъ собой существенное свойство плоскости. Нѣтъ, конечно, необходимости выдвигать это различіе: плоскость во всякомъ случаѣ имѣетъ центръ тяжести, какъ бы мы ее ни продолжали. Здѣсь только ясно выражается произвольность, которая проявляется въ построеніи понятія о плоскости. Если бы при продолженіи плоскости мы придавали больше значенія тому, что она осуществляется спокойной поверхностью воды, то она превратилась бы въ то, что мы теперь называемъ сферой*), конечно, необозримо большой. Здѣсь нѣтъ мѣста возраженію, что на такой плоскости не можетъ умѣститься прямая. Въ эту прямую мы должны были бы получить лишь путемъ продолженія сравнительно небольшого прямолинейнаго отрѣзка на плоскости, напимѣръ, при помощи визированія. Если бы при этомъ послѣ большого труда было обнаружено нѣкоторое уклоненіе, то достаточно было бы этотъ опытъ повторить, чтобы навѣрное получить другое уклоненіе; къ тому же сколько-нибудь гладкихъ плоскостей значительнаго протяженія вовсе не существуетъ, такъ что экспериментальному рѣшенію вопроса вовсе нѣтъ мѣста. Мимоходомъ намѣтимъ здѣсь вопросъ: что стало бы съ геометрией, если бы ея „плоскости“ въ „дѣйствительности“ были бы большими „сферами“? Отвѣтъ на этотъ вопросъ могъ бы поразить того, кто стоитъ далеко отъ математическихъ соображеній этого рода; мы могли бы, какъ мы увидимъ ниже, въ этомъ предположеніи получить всѣ предложенія нашей геометріи; такая постановка вопроса для физики имѣла бы даже нѣкоторыя преимущества.

4. Однако, довольно! Изъ этого очерка достаточно ясно, какъ, на нашъ взглядъ, можно было бы провести первое наглядное обученіе эмпирической геометріи; это могло бы быть очень полезно! Мы позволимъ себѣ

*) Строго говоря, геоидомъ.

только еще указать, какой богатый материал представило бы наблюдение симметрии в предметах природы. Прежде всего мы грубо воспроизведем симметрию относительно оси в плоскости таким образом, что мы на листе бумаги черным мелом нарисуем какую либо фигуру, например, каштановый лист, а затем, перегнув бумагу по оси симметрии и плотно сложив оба полулиста, оттиснем фигуру по другую сторону оси. Это дает уже нам переход от обыкновенной, чисто созерцательной геометрии к чертежной. Легко усмотреть и доказать на основании определения, что окружность, центр которой лежит на оси симметрии, при копировании переходит сама в себя. Пользуясь двумя окружностями такого рода, можно непосредственно дать построение точки, сопряженной с данной¹²⁾. Это приводит к решению целого рода конструктивных задач.

Когда эмпирический материал геометрии таким образом в достаточной мере собран, когда простые заключения уже привели к сознанию возможности логической разработки, когда нам удалось уже пробудить вкус к тонким логическим выводам, которые раскрывают нам глубоко сокрытые свойства фигур, то следующая глава „натуральной“ геометрии должна точно разграничить те свойства геометрических фигур, которые могут быть доказаны, от тех, которые нужно заимствовать непосредственно из опыта. Тогда обнаружится, что одно и то же предположение иногда может оказаться доказуемым, а иногда недоказуемым, смотря по тому, какие положения мы приняли без доказательства. В конце концов является, таким образом, в значительной мере делом произвола и вкуса, что принять за основные положения: нужно только, чтобы основные посылы легко познавались эмпирически, без сложных экспериментов.

5. Но теперь возникает коренный вопрос. Можно ли из этого сырого материала, из этих грубо эмпирических точек, линий и поверхностей построить науку? На этот вопрос может дать ответ лишь успех такого начинания, и в этом смысле вопрос нужно считать уже решенным. Сочинение Паша „Лекции по новой геометрии“¹³⁾ дает такого

¹²⁾ Если мы через данную точку проведем две окружности, центры которых расположены на оси, то вторая точка пересечения этих окружностей есть точка, симметричная данной относительно оси.

¹³⁾ M. Pasch. „Vorlesungen über Neuere Geometrie“. Leipzig, 1882. Мы решительно не можем согласиться с тем, что книга Паша воспроизводит ту „натуральную“ геометрию, о которой говорит автор. Мы очень ценим это сочинение, но главную заслугу автора усматриваем именно в том, что он первый дал аксиомы, которые дают возможность формально обосновать расположение точек на прямой. (См. сочинение: В. Каганъ. „Основания геометрии“, т. II, гл. 35).

Вообще, эти рассуждения относительно „натуральной геометрии“ представляются нам очень шаткими; их значение в дальнейшем крайне ограничено.

рода разработку геометрической, въ узкомъ смыслѣ этого слова, части геометріи, той части, которую мы выше называли „натуральной геометріей“. Чтобы охарактеризовать эту прекрасную книгу, которую каждому слѣдовало бы прочитать, такъ какъ она имѣетъ цѣлью болѣе интензивное углубленіе внутрь науки, чѣмъ экстенсивное ея расширеніе, мы приведемъ слѣдующую выдержку изъ предисловія.

„Съ геометріей можно, конечно, связывать самыя разнообразныя соображенія спекулятивнаго характера; но плодотворныя примѣненія, которыя геометрія постоянно находитъ въ естествознаніи и въ практической жизни, во всякомъ случаѣ, основаны на томъ, что геометрическія понятія первоначально строго соответствовали эмпирическимъ объектамъ, хотя постепенно онѣ и были обвиты сѣтью искусственныхъ понятій для содѣйствія теоретическому ея развитію; и поскольку мы напередъ ограничиваемъ себя этимъ эмпирическимъ ядромъ, геометрія сохраняетъ характеръ естественной науки, которая отличается отъ другихъ вѣтвей естествознанія только тѣмъ, что она заимствуетъ изъ опыта лишь небольшое число понятій и законовъ“.

Сообразно этой точкѣ зрѣнія, „точками“ у Паша являются не мистическіе туманные объекты нашего мышленія, а матеріальныя тѣла, „дѣленіе которыхъ надаетъ за предѣлы нашего наблюденія“; такимъ образомъ, это не вещи, „не имѣющія частей“ (Евклидъ), а такія, частями которыхъ приходится пренебрегать. Если по Пашу мы также должны представлять себѣ точки, линіи, поверхности очень тонкими, то это, собственно, совершенно несущественно; у Паша (ограниченная) прямая имѣетъ, строго говоря, конечное число такихъ точекъ; двѣ точки даже не должны быть слишкомъ близки одна отъ другой, если онѣ должны опредѣлять прямую (I. с. стр. 17): ничего худого не произошло бы и отъ того, что мы нѣсколько увеличили бы точки, линіи и поверхности; но только область того, что мы на объектахъ непосредственно наблюдаемъ и изучаемъ, нѣскольکو бы сократилась. Если кто-либо опасается, что эта натуральная точка зрѣнія, возвращающая насъ на тотъ путь, по которому геометрія исторически достигла современнаго своего развитія, вводитъ въ геометрію реализмъ и грубыя чувственныя представленія, то мы советуемъ прочитать основные параграфы книги Паша. Нужно имѣть чрезвычайно тонкое чутье, чтобы оцѣнить всѣ эти незначительныя, даже ничтожныя объекты, изъ которыхъ геометрія дѣлаетъ свои великіе выводы. Каждый, повидимому, знаетъ, что значить „между“, но кто сумѣлъ такъ точно указать свойства, которыми это понятіе опредѣляется? ¹⁴⁾

¹⁴⁾ Мы считаемъ нужнымъ еще разъ сказать, что чтеніе Паша насъ къ этимъ заключеніямъ не привело. Сила Паша обнаруживается именно тамъ, гдѣ онъ становится на почву строго теоретическихъ разсужденій, къ числу которыхъ и принадлежитъ характеристика понятія „между“. Но этимъ сбивчивымъ эмпирическимъ разсужде-

6. Мы не имѣемъ въ виду излагать здѣсь идеи Паша; мы хотѣли бы только подчеркнуть одно обстоятельство: было бы совершенно невозможно установить какія-либо общія предложенія, если бы мы оставили эмпирическія прямыя и плоскости во всемъ ихъ несовершенствѣ, если бы мы даже не устранили ихъ ограниченности въ пространствѣ. Но это осуществляется не путемъ недопустимыхъ операций надъ объектами чувственнаго воспріятія, вошедшими въ геометрію,—это осуществляется на понятіяхъ.

Совокупность прямыхъ, проходящихъ черезъ одну и ту же точку A , называютъ связкой лучей; лучи, образующіе связку, обладаютъ той особенностью, что любые два изъ нихъ (которые расположены не слишкомъ близко другъ къ другу) опредѣляютъ плоскость. Всѣ эти образы нужно, конечно, представлять себѣ пространственно ограниченными. Если мы въ такой плоскости возьмемъ два луча связки u и v , на прямой u выберемъ двѣ точки B и B' , на прямой v двѣ точки \mathfrak{B} и \mathfrak{B}' , такъ что прямыя $B\mathfrak{B}$ и $B'\mathfrak{B}'$ пересѣкутся въ точкѣ S , прямыя $B\mathfrak{B}'$ и $B'\mathfrak{B}$ въ точкѣ T , то прямая ST встрѣтитъ прямую u въ точкѣ A' *), положеніе которой, какъ мы увидимъ ниже, зависитъ только отъ первоначально выбранныхъ точекъ A , B и B' и не зависитъ отъ v , \mathfrak{B} , \mathfrak{B}' , S , T . Если мы теперь проведемъ черезъ прямую u произвольную плоскость, выберемъ въ ней произвольную точку S , соединимъ ее съ точками B , B' и A' ,—на прямой SA' возьмемъ вторую точку T , которую также соединимъ съ B и B' , то прямая BT встрѣчаетъ прямую SB' и прямая $B'T$ прямую SB соответственно въ точкахъ \mathfrak{B} и \mathfrak{B}' такимъ образомъ, что прямая $x = \mathfrak{B}\mathfrak{B}'$ проходитъ черезъ точку A . При всѣхъ этихъ построеніяхъ мы вовсе не пользовались точкой A . Если теперь u и v суть двѣ прямыя въ плоскостяхъ, о которыхъ мы не можемъ утверждать, что онѣ пересѣкаются, то мы все же можемъ указаннымъ выше пріемомъ построить произвольное число прямыхъ x , по одной черезъ каждую точку пространства. Относительно двухъ такихъ прямыхъ мы опять таки не можемъ сказать, пересѣкаются ли онѣ или нѣтъ; но можно показать, что каждые два такихъ луча опредѣляютъ плоскость, совершенно такъ же, какъ два луча связки. И вотъ, по Пашу, такая система лучей также называется „связкой“ и именно „несобственной связкой“, и ей приписывается „несобственная“ точка, черезъ которую „проходятъ“ всѣ лучи связки. Это, такимъ образомъ, не болѣе, какъ форма выраженія. Такимъ же образомъ опредѣляются „несобственная“ сѣченія плоскостей, которыя „въ дѣйствительности“ не пересѣкаются. Трудности понятія о конгру-

иимъ мы придаемъ столь же мало цѣны здѣсь, какъ и у Паша; и въ настоящемъ сочиненіи большую цѣну имѣютъ лишь дальнѣйшія строгія разсужденія, а не эти чуждые соображенія о конечномъ числѣ „натуральныхъ“ точекъ на „натуральной“ прямой и т. д.

*) Четвертая гармоническая къ точкамъ A и B , B' .

энтности также преодолеваются здесь не путем неосуществимых представлений, а помощью надлежащих понятий. Очень интересен параграф (§ 9, I. с.), в котором расширяется понятие „между“. Соображения, которые необходимы, чтобы выяснить, что мы действительно можем говорить об этих несобственных прямых и плоскостях, как о действительно существующих, в высшей степени интересны. В результате же получается стройная система натуральной геометрии, свободная от противоречий. Она выясняет и оправдывает все геометрические системы, которые относятся к образам, действительно доступным нашему представлению, к точкам, линиям и поверхностям, локализованным в пространствах¹⁵⁾.

¹⁵⁾ Понятие о „несобственных“ или „идеальных“ точках, прямых, плоскостях и т. д., введенное Клейном и развитое Пашем, принадлежит к числу наиболее трудных понятий в абстрактной геометрии; мы удивляемся, что автор, упоминая о нем здесь лишь вскользь, апеллирует к нему ниже неоднократно. Мы не считаем возможным выяснить это понятие в пределах подстрочного примечания, а потому посвятим ему особое дополнение в конце книги: „Об идеальных образах в геометрии положений“. Было бы полезно ознакомиться с этим дополнением до чтения дальнейшего. Рассчитывая на это, мы не входим уже в пояснение того, что изложено ниже в § 7.

ГЛАВА II.

Натуральная геометрія, какъ одна изъ безчисленныхъ формъ проявленія строго отвлеченной геометріи (метагеометріи).

§ 7. Натуральная геометрія и приближенная геометрія. Analysis situs. Метагеометрія.

Изложенныя выше соображенія о натуральной геометріи должны были достаточно выяснить сущность основныхъ ея понятій. Они представляютъ своеобразную смѣсь эмпиризма и формализма. Понятія „точка“, „прямая“ и т. д., имѣющія эмпирическое происхожденіе, должны быть „расширены“ за предѣлы узкой области, къ которой они собственно относятся, если мы хотимъ получать общія предложенія. Этотъ процессъ расширения совершается чисто формально, путемъ введенія особаго способа выраженія, позволяющаго, напримѣръ, трактовать прямыя въ плоскости, не пересѣкающіяся въ доступной нашему созерцанію области, такъ же, какъ тѣ, которыя пересѣкаются. Эта игра фиктивными фактами должна была бы привести къ дурнымъ результатамъ, если бы въ основѣ ихъ не лежала истина болѣе глубокая, которая недостаточно объективно выражается этимъ искусственнымъ языкомъ. Такъ, въ рассмотрѣнномъ примѣрѣ есть иѣчто, что всегда существуетъ, когда двѣ прямыя расположены въ одной плоскости; это есть связка лучей, ими опредѣляемая, т. е. совокупность лучей, которые вмѣстѣ съ данными двумя прямыми обладаютъ тѣмъ свойствомъ, что любые два изъ нихъ опредѣляютъ плоскость. Связка существуетъ всегда, общей же точки всѣхъ лучей можетъ и не быть,—по крайней мѣрѣ, мы воздерживаемся отъ опредѣленнаго сужденія въ этомъ отношеніи. Необходимость введенія искусственнаго понятія „несобственной“ точки пересѣченія сказывается тогда, когда мы желаемъ получить возможность присвоить и случайное свойство (существованіе точки пересѣченія) таюже и общему понятію. Пашъ совершенно справедливо утверждаетъ, что понятіе „точка“ можно было бы вовсе устранить, замѣнивъ его связкой,

конечно, не съ самаго начала. Но это слишком удалило бы насъ отъ обычной точки зрѣнія на геометрическія предложенія и создало бы большія затрудненія въ словесномъ ихъ выраженіи.

2. Къ тому же этотъ шагъ необходимо повлекъ бы за собой слѣдующій. Двѣ плоскости (въ предѣлахъ доступной намъ части пространства) имѣютъ прямую пересѣченія лишь случайно, между тѣмъ какъ содержащая ее связка существуетъ всегда. Чтобы избѣжать понятія о „несобственной“ прямой, было бы, такимъ образомъ, необходимо устранить изъ геометріи также понятіе о „собственной“ прямой и вмѣсто этого ввести понятіе о пучкѣ плоскостей. Разсмотрѣнному въ пунктѣ 1. случаю двухъ прямыхъ, расположенныхъ въ одной плоскости, здѣсь соответствовали бы два пучка плоскостей, имѣющихъ общую плоскость; они опредѣляютъ тогда связку плоскостей, т. е. такую систему пучковъ (плоскостей), изъ которыхъ каждыя два имѣютъ общую плоскость. Основными образами геометріи при такой постановкѣ служили бы плоскость, пучекъ плоскостей и связка плоскостей. Напротивъ, точки и прямая были бы въ такомъ случаѣ лишь вспомогательными образами, которые служили бы лишь для построенія основныхъ образовъ. Если принять, такимъ образомъ, что существуютъ всѣ пучки и связки плоскостей, то можно было бы вовсе обойтись безъ точекъ и прямыхъ; но это уже не была бы натуральная геометрія. Уже самый тотъ фактъ, что предложенія этой геометріи трактовали бы исключительно о пучкахъ и связкахъ плоскостей, представлялся бы въ достаточной мѣрѣ ненатуральнымъ; но попробуйте выразить въ этой формѣ понятіе объ отрѣзкѣ, объ углѣ, попробуйте формулировать предложенія о конгруэнтности! Мы предпочтемъ поэтому остаться при понятіяхъ о „несобственныхъ“ точкахъ и прямыхъ, хотя и онѣ не вполне соответствуютъ дѣйствительному положенію вещей. Здѣсь нужно остерегаться еще одной логической ошибки: если логически расширенное понятіе о точкѣ, охватывающее какъ собственныя, такъ и несобственныя точки, не можетъ вести къ противорѣчію, то это имѣетъ наиболѣе глубокія причины не въ томъ, что въ дѣйствительности мы въ каждомъ случаѣ можемъ считать существующими *) только „собственныя“ точки; для такого заключенія мы не имѣемъ никакихъ основаній. Совершенно подобный случай мы встрѣчаемъ въ обыкновенной геометріи, оперирующей съ безконечными прямыми, когда мы разсматриваемъ окружность и прямую въ одной плоскости. Прямая встрѣчаетъ окружность или не встрѣчаетъ ея. Если прямая не встрѣчаетъ окружности, то мы все же говоримъ о двухъ „мнимыхъ“ точкахъ пересѣченія; и эта форма выраженія можетъ быть проведена такимъ образомъ, что она не содержитъ внутренняго противорѣчія. Но это рѣшительно не даетъ намъ права принять, что прямая и

*) См. примѣчаніе на стр. 14.

окружность, расположенная в одной плоскости постоянно должны пересекаться. Напротив, если в некоторой геометрической системѣ имѣть мѣсто теорема, что изъ четырехъ точекъ на прямой всегда двѣ и только двѣ пары другъ друга раздѣляютъ, то въ плоскости кривой второго порядка, какъ мы увидимъ ниже, всегда существуютъ прямыя, ея не пересѣкающія; иначе мы впадаемъ въ противорѣчіе съ упомянутой теоремой. Аналогія съ „несобственнымъ“ пересѣченіемъ двухъ прямыхъ на плоскости здѣсь совершенно ясна. Съ другой стороны, когда мы говоримъ о „несобственныхъ“ элементахъ, то это отнюдь не исключаетъ возможности въ расширенной области, въ которой мы оперируемъ, во многихъ случаяхъ замѣщать эти „несобственные“ элементы при продолженіи разсматриваемыхъ прямыхъ и плоскостей „собственными“ элементами; эта постановка вопроса въ скромномъ самоограниченіи старается лишь избѣгать всякаго заключенія, если мы не имѣемъ возможности проверить на объектахъ, справедливо ли оно или нѣтъ.

3. Въ этомъ заключается извѣстный произволъ, или, если угодно, нерѣшительность, мало удовлетворяющая умъ, стремящійся къ ясности и къ опредѣленности. То обстоятельство, что мы должны представлять себѣ прямыя и плоскости ограниченными, создаетъ неспокойное состояніе нашей фантазіи: мы можемъ представлять себѣ границы прямой то шире, то уже, границы плоскости—расположенными то такъ, то иначе. Къ этимъ неопредѣленностямъ присоединяются еще другія, болѣе глубокія. Такъ какъ прямыя, плоскости и точки имѣютъ извѣстную толщину, безъ чего мы ихъ реально вовсе не можемъ себѣ представить, то можно вообразить себѣ цѣлый рядъ геометрій $G_1, G_2, G_3 \dots$ такимъ образомъ, что основные образы въ каждой послѣдующей системѣ тоньше, чѣмъ въ предыдущей; скажемъ, напримѣръ, въ G_1 они имѣютъ 1 мм. въ толщину, въ G_2 только 0,1 мм., въ G_3 только 0,01 и т. д.; врядь ли нужно говорить, что и самый миллиметръ не имѣетъ абсолютно точной величины, а опредѣленъ лишь въ предѣлахъ некотораго интервала, правда, весьма незначительнаго *). То, что въ системѣ G_1 представляетъ собой линію, въ системѣ G_2 есть тѣло, которое можно заполнить многочисленными линіями этой системы, обвести многочисленными касательными линіями. Если мы, обратно, отъ системы G_2 возвратимся къ системѣ G_1 , то многія тонкости, которыя еще доступны въ системѣ G_2 , здѣсь совершенно отпадаютъ: отрѣзокъ длиной въ 1 м. въ системѣ G_1 будетъ имѣть тотъ же видъ, взявъ ли онъ отъ прямой линіи или отъ окружности съ радіусомъ въ 300 м. Внутри (пустой) прямой системы G_1 можно помѣстить много линій системы G_2 и, подавно, системы G_3 , которыя даже могутъ и не быть непременно прямыми; это могутъ быть, напримѣръ, узкія синусоиды или части кривыхъ третьяго

*) Ср. Дю-Буа Реймондъ, I. с. (стр. 25).

Веберъ. Энциклоп. элемент. геометріи.

порядка. И отсюда, повторимъ это попутно, вновь вытекаетъ, что натуральное понятіе о прямой или о плоскости не можетъ быть абсолютно определеннымъ. Между тѣмъ математическая мысль, можно сказать, съ непреодолимой силой стремится къ абсолютнымъ понятіямъ, свободнымъ отъ всякаго произвола и неопределенности, стремится къ определенности, хотя бы даже за счетъ эмпирической правильности. Чѣмъ глубже мы занимаемся натуральной геометрией, тѣмъ тверже становится наша вѣра въ возможность геометріи, свободной отъ всего случайнаго, геометріи, которая опредѣляетъ свои образы свойствами, оказавшимися плодотворными въ примѣненіи къ основнымъ образамъ натуральной геометріи, — геометріи, которая изъ этихъ опредѣленій, быть можетъ, съ помощью постулатовъ, раскрываетъ свои истины строго дедуктивно, независимо отъ ихъ осуществленія, доступнаго нашимъ чувствамъ. Конечно, безъ произвола при опредѣленіи основныхъ образовъ нельзя обойтись и здѣсь, ибо а priori нельзя рѣшить, какія свойства эмпирическихъ прямыхъ нужно считать существенными и ввести въ опредѣленіе идеальныхъ прямыхъ. Въ самомъ дѣлѣ, мы вѣдь видѣли (стр. 26), что, исходя изъ представленія о плоскости, какъ о поверхности неподвижной жидкости, мы могли бы собственно придти при продолженіи этой ограниченной поверхности къ представленію очень большой сферы; и съ этими „сферическими“ плоскостями можно было бы столь же хорошо построить нашу обыкновенную геометрію, какъ и съ „дѣйствительными“ плоскостями¹⁾; „сферы“ этой своеобразной геометріи были бы также сферами въ обыкновенномъ смыслѣ; экспериментально никогда нельзя было бы рѣшить, которая изъ двухъ геометрій отвѣчаетъ „дѣйствительности“, хотя бы уже по той причинѣ, что безконечныя прямая и плоскости могутъ имѣть только абстрактное, а не дѣйствительное существованіе²⁾.

4. Наша оцѣнка натуральной геометріи сложится, однако, совершенно иначе, если мы будемъ развивать ее не въ томъ направленіи, которое отвлекается отъ ея несовершенствъ, а напротивъ, сдѣлаемъ предметомъ своего изслѣдованія именно ея неточности, — если мы будемъ руководиться при этомъ принципомъ, — не искать въ ея построеніяхъ

¹⁾ Это утверженіе здѣсь представляется столь же голословнымъ, какъ и непонятнымъ; но это будетъ выяснено въ слѣдующей главѣ.

²⁾ Итакъ, мысль автора заключается въ томъ, что строго научной является не „натуральная“ геометрія, а геометрія абстрактная, которая развивается изъ целесообразно, но все таки условно установленныхъ опредѣленій и постулатовъ; натуральная же геометрія представляетъ собой лишь примѣненіе этой абстрактной геометріи къ реальнымъ объектамъ, какъ теперь часто говорятъ „реальное осуществленіе абстрактной геометріи“, — осуществленіе, которое никогда не бываетъ совершеннымъ.

Это основная мысль, которую авторъ проводитъ черезъ все сочиненіе и выясненіе которой, строго говоря, и составляетъ цѣль самаго сочиненія.

большей точности, нежели та, которую можно ожидать при неточности ее точек, линий и поверхностей. Это будет тогда „приближенная геометрия“, часть той „приближенной математики“, которая в настоящее время составляет предмет горячих желаний, которая оказала бы величайшую пользу во всех приложениях математики. Но и в чистой математике, например, в теории функций, когда мы рассматриваем функцию в пределах определенной полосы, она нашла бы себе место; мы имеем здесь в виду указание и исследование Клейна; но в пределах элементарного учебника, которому еще нужно выработать понятие о функции (см. ниже, в тригонометрии), этого нельзя достаточно выяснить. Но к элементарным частям приближенной геометрии отнюдь нельзя относиться пренебрежительно, особенно в виду практического ее значения. Мы указывали выше, что в натуральной геометрии при известной толщине точек, линий и поверхностей некоторые образы, которые абстрактно различны, эмпирически не могут быть отличены один от другого, как например, части прямой и окружности весьма большого радиуса. Задача приближенной геометрии, согласно руководящим ее принципам, здесь заключалась бы в том, чтобы составить образы, абстрактно определенные или заданные как-либо иначе, скажем, кривая, из более простых образов настолько точно, насколько это возможно при принятой толщине точек и т. д. Чтобы рассмотреть определенный случай, вообразим эллипс с заданными осями $2a$ и $2b$. Построение эллипса не представляет затруднений, но все же довольно сложно; положим, что его нужно начертить штрихом в $0,5$ мм. толщиной. При такой толщине штриха некоторые тонкости точного построения необходимо теряются. Таким образом возникает вопрос; нельзя ли составить из более простых кривых, которые было бы удобно чертить, например, из дуг окружностей, кривую, которая в указанных пределах погрешности замѣняла бы эллипс? Это была бы типичная задача геометрии, о которой идет речь; решение этой задачи будет приведено в отделе „Начертательная геометрия“ (в III томѣ); для этой дисциплины весьма важно иметь возможность с помощью циркуля и линейки чертить более сложные кривые. Окружности, которыми мы при этом пользуемся, называются „окружностями кривизны“, потому что они по кривизне в соответствующем месте настолько сливаются с кривой, что в пределах известного расстояния могут совершенно ее замѣнять. Точнее это, конечно, расплывчатое понятие устанавливается только в дифференциальной геометрии²⁾.

²⁾ Выясненная здесь вкратце идея „приближенной геометрии“, как и приближенной математики вообще, принадлежит профессору Ф. Клейну (F. Klein, Göttingen) и проводится в его сочинении: „Anwendung der Differential- und Integralrechnung auf die Geometrie. Eine Revision der Prinzipien“. Leipzig 1901 (второе издание в 1907 г.). Литографированные лекции. Нужно сказать, однако, что взгляды,

5. Намъ пришлось въ понятяхъ прямой и плоскости обыкновенной геометрии столь многое отвергнуть, что именно здѣсь, прежде чѣмъ мы постараемся подняться до геометрии, болѣе чистой, будетъ умѣстно поставить вопросъ, возможна ли геометрия, которая вовсе обходится безъ этихъ понятій, безъ понятія о математическихъ линияхъ и поверхностяхъ вообще, которая высказываетъ только то, что вообще можно сказать о кривыхъ линияхъ и поверхностяхъ. Есть ли въ такой геометрии предложения, имѣющія дѣйствительно интересъ? Возьмемъ шарообразную поверхность, пустую внутри, скажемъ, тыкву, изъ которой вырѣзана сердцевина. Если мы гдѣ-либо на этой поверхности воткнемъ ножъ и поведемъ его по какой-нибудь линіи, пока концы разрѣза не сойдутся, то поверхность распадется на два куска. „Совершенно тривиальный фактъ“, скажетъ математикъ. Но именно математикъ будетъ склоненъ утверждать, что такъ будетъ всегда, что разрѣзъ, концы котораго сойдутся („кольцевой“ разрѣзъ), всегда раздѣлитъ поверхность на части. Если мы, однако, къ этой поверхности, которую мы представляемъ себѣ тонкостѣнной, приделаемъ „ушко“ изъ согнутой тонкостѣнной трубки (см. фиг. 10), то разрѣзъ, который начнется на первоначальной поверхности, переходитъ на ушко, огибаетъ



Фиг. 10.

его и затѣмъ вновь по первоначальной поверхности безъ поворота возвращается въ точку исхода, не дѣлитъ поверхности на двѣ части. Точно такъ же, если мы, не снимая ушка, разрѣжемъ его поперекъ, то мы не получимъ двухъ кусковъ. Можно даже оба эти разрѣза произвести совмѣстно, они все-таки не раздѣлятъ поверхности; но послѣ этого, какъ легко себѣ уяснить, каждый кольцевой разрѣзъ уже раздѣлитъ поверхность на куски.

Если мы къ первоначальной поверхности приделаемъ p такихъ ушекъ, то можно будетъ произвести $2p$ такихъ разрѣзовъ, которые не раздѣляютъ такой поверхности на куски, но сообщаютъ ей то свойство, что каждый слѣдующій кольцевой разрѣзъ уже раздѣлитъ ее на куски.

высказываемые Клейномъ въ названномъ сочиненіи, отнюдь не получили всеобщаго признанія. Противники этихъ взглядовъ указывали, что математика можетъ быть только точная; что задача тѣхъ дисциплинъ и пріемовъ, которые Клейнъ называетъ приближенной математикой, можетъ заключаться лишь въ томъ, чтобы съ точностью опредѣлять предѣлы ошибокъ, которыя мы получимъ, если будемъ замѣнять одни выраженія другими, болѣе простыми. Клейнъ, однако, твердо проводитъ свою точку зрѣнія, что отражается и на его взглядахъ на задачи математики въ средней школѣ. См. F. Klein und E. Riecke. „Neue Beiträge zur Frage des mathematischen und physikalischen Unterrichts an den höheren Schulen“. Leipzig. 1904.

Можно показать, что на такого рода поверхности можно разнообразно провести такие не разделяющие ее сечения, такую „систему поперечных сечений“ и другими способами; можно это выполнить даже так, что они разрежут несколько ушек. Но и в этом случае имеются 2р сечений, которая сообщают поверхности свойства так называемой односвязности, заключающейся в том, что всякий кольцевой разрез уже разделяет поверхность на куски. Если мы вообразим себе два таких системы поперечных разрезов, то разрезы одной системы в некоторых точках будут встречать разрезы другой системы. Можно ли что-либо сказать относительно числа точек пересечения? Конечно, можно, но вывод этих предложений настолько труден, что для этого обыкновенно прибегали к интегрированию в комплексной области и к высшим трансцендентным функциям^{*)}. Совершенно ясно таким образом, что мы имеем здесь своеобразную геометрию, которая ведет не только к интересным, но и весьма трудным задачам. Это так называемый *Analysis situs* (**), творение Римана, развитое главным образом Клейном и Диком (Дук). Эта дисциплина представляет одно из наиболее действительных орудий теории функций и все же она оперирует только общим понятием о линии и поверхности (в приближенном смысле слова) и связности, а потому она гораздо проще обыкновенной геометрии. В полном учебно-научном плане геометрии *Analysis situs* должен был бы занять место до элементарной геометрии

§ 8. Евклидова геометрия в параболической сферической сфере.

1. Прежде чем мы рѣшимся противопоставить натуральной геометрии со всеми ее недостатками чисто идеальную систему, необходимо прежде всего вполне выяснить себе, какие свойства основных геометрических образов являются носителями геометрических истин. Мы видели, что процесс предельного перехода, который должен заместить натуральные точки, линии и поверхности чем-то вполне определенным, не только недопустим, но и ненужен. При всем том могло бы казаться, что точка необходимо представляет собой нечто такое, размерами которого можно пренебрегать, линия — есть образ с преобладающим линейным протяжением и т. д. Следующие соображения имеют

^{*)} Чисто геометрическое доказательство предложено автором, *Mathem. Annalen*, Bd. 54.

^{**)} Термин принадлежит Лейбницу, который в письме к Гюйгенсу (1679), точно по предчувствию, называет этим именем то, что мы теперь называем исчислением отрезков (кватернионы, учение о протяжении, *Ausdehnungslehre*); вместо *analysis situs* было бы правильнее называть эту дисциплину учением о связности (*Zusammenhangslehre*). См. *Leibniz, Mathematische Schriften*, herausgegeben von C. J. Gerhardt, I, 19.

въ виду преодолѣть глубоко вѣдрившійся предрасудокъ, будто видъ, форма геометрическихъ образовъ что либо вноситъ въ существо геометрическихъ предложеній, обуславливаетъ ихъ правильность. Мы увидимъ, что можно безчисленнымъ множествомъ способовъ замѣнить объекты, соотвѣтствующіе понятіямъ „точка, прямая и плоскость“, другими, отъ нихъ совершенно отличными объектами; и если мы будемъ эти послѣдніе называть соотвѣтственно точками, прямыми и плоскостями, то мы осуществимъ обычную геометрію ⁴⁾).

Простѣйшій примѣръ такого рода заключается въ слѣдующемъ: въ пространствѣ R Евклидовой геометріи ^{*)}) мы выберемъ точку O и подѣ

^{*)} Такъ называютъ обычную геометрію, въ отличіе отъ другихъ геометрическихъ системъ, съ которыми мы вскорѣ познакомимся.

⁴⁾ Авторъ выясняетъ эту идею на примѣрѣ, къ которому онъ сейчасъ и переходитъ. Этотъ примѣръ, указанный Пуанкарэ и развитый авторомъ настоящаго сочиненія, онъ называетъ простѣйшимъ. Это, однако, далеко не такая простая идея, и мы считаемъ цѣлесообразнымъ предпослать дѣйствительно простой примѣръ.


Всякій шаръ, діаметръ котораго равенъ нѣкоторой постоянной длинѣ r , мы условимся называть точкой геометріи фигуръ.

Всякій безконечный цилиндръ, діаметръ поперечнаго сѣченія котораго также равенъ r , будемъ называть прямой линіей геометріи фигуръ.

Плоскостью геометріи фигуръ мы условимся называть ограниченный двумя параллельными плоскостями слой, толщиной въ r .

Если шаръ лежитъ цѣликомъ внутри цилиндра, касаясь его по большому кругу, мы будемъ говорить, что въ геометріи фигуръ точка лежитъ на прямой.

Если шаръ лежитъ цѣликомъ внутри слоя, касаясь его границъ въ двухъ діаметрально противоположныхъ точкахъ, то мы будемъ говорить, что



Фиг. а.

въ геометріи фигуръ точка лежитъ въ плоскости или плоскость проходитъ черезъ точку.

Точно такъ же, если цилиндръ лежитъ цѣликомъ внутри слоя, касаясь его границъ по двумъ діаметрально противоположнымъ образующимъ, то мы будемъ говорить, что въ геометріи фигуръ прямая лежитъ въ плоскости или плоскость проходитъ черезъ прямую.

Очевидно, что въ нашей геометріи фигуръ всякія двѣ точки опредѣляютъ собой прямую: вѣдь вокругъ двухъ шаровъ діаметра r можно всегда описать ци-


R' будемъ разумѣть пространство, которое будетъ имѣть всѣ тѣ же точки, что и пространство R , кромѣ точки O . Совокупность всѣхъ сферъ и окружностей пространства R , которыя проходятъ черезъ точку O , называютъ „сферической сѣтью“ и притомъ параболическаго типа, въ отличіе отъ дру-

лиандръ, касающійся ихъ внѣшне; и діаметромъ поперечнаго сѣченія этого цилиндра будетъ служить r .

Точно такъ же убѣждаемся, что всякія три точки геометріи фигуръ опредѣляютъ собой одну и только одну плоскость: ибо къ тремъ шарамъ діаметра r можно всегда построить одну и только одну пару внѣшне-касательныхъ плоскостей, которыя и опредѣляютъ собой слой толщиной въ r .

Далѣе, мы условимся считать двѣ прямыя геометріи фигуръ пересѣкающимися только тогда, когда онѣ имѣютъ общую точку; двѣ плоскости—если онѣ имѣютъ общую прямую; плоскость и прямую—если имъ принадлежитъ общая точка.

Поэтому, когда два цилиндра, изображающихъ прямыя геометріи фигуръ, пересѣкаются въ обычномъ значеніи этого слова, то эти прямыя въ геометріи фигуръ еще отнюдь не должны непременно пересѣкаться. Только въ томъ случаѣ,



Фиг. в.


когда оси нашихъ цилиндровъ пересѣкаются, мы можемъ вписать въ нихъ шаръ, изображающій собой точку геометріи фигуръ; а потому только въ этомъ случаѣ мы будемъ считать прямыя геометріи фигуръ пересѣкающимися.

Покажемъ, что въ нашей геометріи фигуръ имѣетъ мѣсто аксіома о параллельныхъ, т. е. во всякой плоскости изъ любой ея точки можно провести къ любой ея прямой, черезъ точку не проходящей, одну и — только одну параллельную.

Возьмемъ въ обыкновенномъ пространствѣ (фиг. с) ограниченный двумя параллельными плоскостями слой толщиной въ r и впишемъ въ него цилиндръ, діаметръ сѣченія котораго тоже равенъ r . По опредѣленіямъ, эти образы дадутъ намъ то, что мы называемъ плоскостью и лежащей на ней прямою геометріи фигуръ. Затѣмъ впишемъ въ слой шаръ діаметра r ; при чемъ центръ шара выберемъ не лежащимъ на центральной линіи построеннаго цилиндра. Шаръ этотъ будетъ, оче-

гихъ видовъ сѣтей, съ которыми мы познакомимся ниже. Плоскости и прямая пространства R , проходящая черезъ точку O , также принадлежатъ сѣти въ качествѣ „предѣльныхъ сферъ“ и „предѣльныхъ окружностей“ (съ безконечно большимъ радиусомъ),—точка зрѣнія, которая вообще оказы-

видно, изображать въ геометріи фигуру лежащую въ построенной плоскости точку, черезъ которую построенная прямая не проходитъ. Опишемъ теперь вокругъ нашего шара касающійся его по большому кругу цилиндръ такъ, чтобы образующія этого цилиндра были параллельны образующимъ цилиндра, построеннаго выше. Цилиндръ этотъ, очевидно, также будетъ вписанъ въ слой, т. е. онъ представитъ собой прямую, лежащую въ плоскости геометріи фигуру и параллельную первой прямой; вѣдь общей точки у этихъ прямыхъ быть не можетъ: чтобы въ два цилиндра можно было вписать общій шаръ, касающійся ихъ поверхностей, необходимо, чтобы ихъ центральныя прямыя пересѣкались. Итакъ, въ геометріи фигуру изъ точки плоскости, лежащей внѣ любой прямой этой плоскости, можно провести къ послѣдней параллельную. Теперь покажемъ, что эта параллельная единственная. Дѣйствительно, если мы вокругъ нашего шара діаметра r опишемъ любой касающійся его цилиндръ такъ, чтобы онъ лежалъ внутри нашего



Фиг. 5.


слоя толщины r , и если его образующія не параллельны образующимъ перваго цилиндра, то и центральныя прямыя этихъ цилиндровъ будутъ не параллельны другъ другу; но такъ какъ оба цилиндра эти вписаны въ одинъ и тотъ же слой, то центральныя линіи ихъ лежатъ въ одной плоскости; итакъ, онѣ пересѣкаются. Описавъ изъ точки ихъ пересѣченія шаръ діаметра r , получимъ шаръ, одновременно вписанный въ оба цилиндра; т. е. эти цилиндры изображаютъ въ геометріи фигуры пересѣкающіяся прямыя. Этимъ аксіома параллельныхъ доказана для всякой плоскости нашей геометріи фигуръ.

Покажемъ теперь, что въ геометріи фигуръ точки расположены на прямыхъ, а прямыя въ плоскостяхъ и, наконецъ, плоскости въ трехмѣрномъ пространствѣ точно такъ же, какъ обыкновенныя точки на обыкновенныхъ прямыхъ, обыкновенныя прямыя на обыкновенныхъ плоскостяхъ и послѣднія въ обы-

вается полезной въ сферической геометріи. Теперь примемъ за „прямая“ и „плоскости“ пространства R' окружности и сферы пространства R , принадлежащія нашей сѣти. Чтобы избѣжать путаницы, мы будемъ употреблять для этихъ „прямыхъ“ и „плоскостей“ термины „псевдо-прямая“

и „псевдо-плоскости“ въ обыкновенномъ пространствѣ трехъ измѣреній. Для этого мы установимъ слѣдующее однозначное соотвѣтствие между образами геометріи фигуръ и обыкновеннаго пространства.

Пусть всякой плоскости обыкновеннаго пространства соотвѣтствуетъ та плоскость геометріи фигуръ, которая получится, если провести къ первой по обѣ ея стороны двѣ параллельныя плоскости на разстояніи обыкновенной прямой $\frac{r}{2}$. Пусть, далѣе, всякой обыкновенной прямой соотвѣтствуетъ та прямая геометріи фигуръ, которая получится, если мы вокругъ первой, какъ вокругъ центральной прямой, опишемъ цилиндръ діаметра r . Наконецъ, всякой точкѣ обыкновеннаго пространства пусть соотвѣтствуетъ та точка геометріи фигуръ, которая получится, если мы вокругъ первой, какъ центра, опишемъ діаметромъ r шаръ.



Фиг. d.

Нетрудно убѣдиться въ томъ, что соотвѣтствіе, установленное такимъ образомъ, однозначно, т. е. каждому образу геометріи фигуръ соотвѣтствуетъ одинъ и только одинъ образъ обыкновеннаго пространства и наоборотъ.

Но что еще важнѣе,—это соотвѣтствіе такого рода, что при немъ распределеніе элементовъ какой-либо фигуры въ обыкновенномъ пространствѣ переносится безъ измѣненія на соотвѣтствующую фигуру нашей геометріи фигуръ. Такъ, напримѣръ, ряду точекъ какой-либо прямой обыкновеннаго пространства соотвѣтствуетъ рядъ точекъ, лежащихъ на соотвѣтствующей прямой и притомъ въ томъ же порядкѣ.

Читатель, безъ сомнѣнія, уже видитъ, что наша геометрія фигуръ, съ формальной точки зрѣнія, ничѣмъ не отличается отъ геометріи обыкновеннаго пространства. Для полнаго совпаденія необходимо еще установить, что мы будемъ въ


и „псевдо-плоскости“⁵⁾. Тогда будут справедливы слѣдующія предложенія.
 I_1 . Двѣ различныя точки A и B пространства R' постоянно опредѣляютъ псевдо-прямую.

геометріи фигуръ понимать подъ разстояніемъ и угломъ. Но послѣ сказаннаго выше это не можетъ представить затрудненія.

Подъ разстояніемъ двухъ точекъ геометріи фигуръ мы будемъ понимать разстояніе между центрами тѣхъ шаровъ обыкновеннаго пространства, которые изображаютъ собой эти точки геометріи фигуръ; т. е. мы выбираемъ опредѣленіе разстоянія такъ, чтобъ въ вышеприведенномъ соотвѣтствіи разстояніе между любыми двумя точками геометріи фигуръ было бы равно разстоянію соотвѣтствующихъ имъ обыкновенныхъ точекъ.

Аналогично этому опредѣляемъ и уголъ въ геометріи фигуръ: подъ угломъ двухъ прямыхъ геометріи фигуръ мы будемъ понимать уголъ, образуемый центральными прямыми цилиндровъ, служащихъ изображеніемъ этихъ прямыхъ геометріи фигуръ.

Изъ всего вышесказаннаго мы можемъ теперь безъ труда заключить, что, съ формальной точки зрѣнія, наша геометрія фигуръ есть не что иное,



Фиг. 6.

какъ Евклидова геометрія трехъ измѣреній. Это многообразіе, какъ и обыкновенное пространство, даетъ намъ систему объектовъ, подходящую подъ логическую схему Евклидовой геометріи.

Фигура a поясняетъ, что двѣ точки опредѣляютъ прямую въ нашей геометріи фигуръ. Фигура b изображаетъ двѣ прямыя, пересекающіяся въ одной точкѣ. Фигура c поясняетъ, что черезъ одну точку проходитъ безчисленное множество прямыхъ. Фигура d поясняетъ, что черезъ точку внѣ прямой можно къ ней провести одинъ и только одинъ перпендикуляръ; наконецъ, фигура e поясняетъ, что черезъ точку внѣ прямой можно къ ней провести только одну параллельную прямую.

Д. Шоръ, „Геометрія фигуръ“. „Вѣстникъ Оп. Физики“, № 386.

⁵⁾ Итакъ, значить: подъ псевдо-прямой въ пространствѣ R' мы будемъ разумѣть любую окружность (конечнаго радіуса или бесконечно большаго — прямую)

- I_2 . Та же псевдо-прямая определяется также любыми двумя другими различными своими точками.
- I_3 . На каждой псевдо-прямой всегда имеются по меньшей мере две точки, на каждой псевдо-плоскости по меньшей мере три точки, не расположенные на одной прямой.
- I_4 . Три точки, не лежащие на одной псевдо-прямой, всегда определяют псевдо-плоскость.
- I_5 . Эта псевдо-плоскость определяется также любыми тремя другими своими точками, не расположенными на одной псевдо-прямой.
- I_6 . Если две точки псевдо-прямой лежат в псевдо-плоскости, то все точки этой псевдо-прямой лежат в этой плоскости.
- I_7 . Если две псевдо-плоскости имеют общую точку, то они имеют еще по крайней мере одну общую точку.
- I_8 . Существуют по крайней мере четыре точки, не расположенные в одной псевдо-плоскости.

Число этих предложений можно было бы легко увеличить; мы привели здесь первые восемь основных положений Гильбертовой системы евклидовой геометрии, именно его „аксиомы сопряжения“; мы будем иметь еще случай говорить о них ниже. Доказательства крайне просты, если мы будем рассматривать предложения этой псевдо-геометрии в пространстве R' с точки зрения евклидовой геометрии в пространстве R . Так, например, две точки, о которых идет речь в предложении I_1 , вместе с точкой O всегда определяют окружность⁶⁾; точка O всегда определяется с тремя точками, о которых идет речь в предложении I_4 , сферу, включая сюда и предельный случай, когда четыре точки расположены в одной плоскости. В случае I_7 сферы имеют, конечно, общую линию пересечения.


2. Образы нашей псевдо-геометрии обладают также всеми теми свойствами, которые в евклидовой геометрии можно высказать относительно понятия „между“. Мы приведем только те предложения, которые по Гильберту служат основными положениями (аксиомами). Эти „аксиомы расположения“, как их называет Гильберт, в нашем случае гласят:

в пространстве R , проходящую через точку O . Точно так же под псевдо-плоскостью в пространстве R' — любую сферу (конечного радиуса или бесконечно большого — плоскость) в пространстве R , проходящую через точку O .

⁶⁾ Предложение I_1 утверждает, что в пространстве R' через две псевдо-точки A и B проходит одна псевдо-прямая. При переводе на обыкновенный язык это означает, что в евклидовом пространстве R через две точки A и B проходит одна и только одна окружность, проходящая в то же время через постоянную точку O . Это хорошо известное предложение евклидовой геометрии. Таким же образом переводятся на язык обыкновенной геометрии остальные предложения и легко доказываются.

П₁. Если A, B, C суть точки псевдо-прямой, причем точка B лежит между точками A и C , то точка B лежит также между C и A .

П₂. Если A и C суть две точки псевдо-прямой, то на ней всегда существует по крайней мере одна




Фиг. 11.

точка B , лежащая между A и C , и по крайней мере такая точка D , что точка C лежит между A и D .

П₃. Из трех точек псевдо-прямой всегда одна и только одна лежит между двумя другими.

П₄. Пусть A, B и C будут три точки, не лежащие на одной псевдо-прямой, а π псевдо-прямая в псевдо-плоскости ABC , не проходящая ни через одну из точек A, B, C . Если прямая π имеет общую точку с одной из сторон псевдо-треугольника ABC , лежащую между крайними точками этой стороны, то она встречает также одну из других сторон треугольника в точке, лежащей между крайними точками этой стороны.

Заметим, что эти предложения имеют место в пространстве R' , а не в пространстве R ; в самом деле в пространстве R соотношение „между“ относительно двух точек A и C на окружности вовсе не



Фиг. 12.

установлено, потому что точка на окружности может перейти из A в C как движением в одну сторону, так и движением в другую сторону; но, исключая точку O , мы делаем это невозможным. (См. фиг. 12)⁷⁾.


3. Особенно интересно, что в нашей псевдо-геометрии справедлива также аксиома параллельности. „Параллельными“ мы должны называть две псевдо-прямые, если в евклидовом пространстве R они представляют собой две окружности, соприкасающиеся в точке O ⁸⁾. Точно так же две псевдо-плоскости мы должны считать параллельными, если в пространстве R они представляют собой сферы, соприкасающиеся в точке O . Эти „параллели“ обладают всеми свойствами обыкновенных параллелей и, в частности, удовлетворяют аксиоме параллельности, обозначенной у Гильберта номером IV:

⁷⁾ Эта терминология принадлежит Папу. Если мы выключаем точку O и тем самым делаем невозможным непрерывное движение по окружности через точку O (фиг. 12), то от точки A к точке C можно перейти, непрерывно передвигаясь по окружности только через точку B . В этом смысле, при исключенной точке O , точка B лежит между точками A и C .

⁸⁾ Ибо только в этом случае они в пространстве R' не имеют общей точки.

IV. Через точку, лежащую вне прямой, можно провести къ ней только одну параллельную прямую.

Чтобы установить теперь въ пространствѣ R' также понятие о конгруэнтности, мы воспользуемся, за отсутствіемъ наглядной аналогіи, построениями Штейнера при помощи линейки. „Псевдо-середину“ M „псевдо-отрѣзка“ AB мы установимъ построениемъ помощью трапеціи (§ 5,1)⁹⁾. Однако, чтобы этотъ приемъ можно было признать правильнымъ, нужно доказать, что положеніе точки M не зависитъ отъ выбора опредѣляющихъ ее вспомогательныхъ линій¹⁰⁾. Прежде, чѣмъ приводить доказательство, мы хотимъ довести до конца самую идею. Раздѣливъ „пополамъ“ псевдо-отрѣзокъ AB , мы будемъ, обратно, имѣть возможность, какъ указано въ § 5, проводить черезъ каждую точку параллель къ прямой AB ; это можно непосредственно видѣть на фиг. 13, обозначенія которой совершенно совпадаютъ съ обозначеніями на фиг. 3 въ § 5¹¹⁾. Мы можемъ



Фиг. 13.

перенести также въ нашу геометрію указанный въ § 5 приемъ, посредствомъ котораго любой отрѣзокъ можно передвинуть вдоль по его прямой на произвольное разстояніе. Съ точки зрѣнія обычной геометріи отрѣзокъ

⁹⁾ Иными словами, мы въ нашей псевдо-плоскости по даннымъ псевдо-точкамъ A и B произведемъ то построеніе, которое указано на фиг. 3.

¹⁰⁾ Т. е. отъ выбора прямой ab и точки S .

¹¹⁾ Это значитъ, намъ дана псевдо-прямая AB , на ней отрѣзокъ AB и его псевдо-середина M ; кромѣ того, дана точка a . Мы проведемъ псевдо-прямая Aa и Bb ,

будет становиться тѣмъ меньше, чѣмъ болѣе онъ приближается къ выключенной точкѣ O . Чтобы осуществить также вращеніе отрезковъ, мы должны имѣть еще въ каждой плоскости „окружность“. Для этого мы возьмемъ нѣкоторую шаровую поверхность k въ пространствѣ R и ее будемъ разсматривать также, какъ „сферу“ въ пространствѣ R' , а ея сѣченія съ псевдо-плоскостями примемъ за „окружности“ на нихъ. Какъ опредѣлять „псевдо-центры“ этихъ „окружностей“ (и „сферъ“), мы покажемъ ниже, въ пунктѣ 4; такимъ образомъ на всѣхъ псевдо-плоскостяхъ, которыя пересѣкаютъ сферу k , мы имѣемъ нужные намъ окружности и ихъ центры. Чтобы имѣть возможность производить также построения въ псевдо-плоскости η , которая не сѣчетъ сферы k , нужно только спроектировать псевдо-плоскость η при помощи параллельныхъ псевдо-прямыхъ на параллельную ей псевдо-плоскость η' , встрѣчающую сферу k ; затѣмъ выполняемъ построеніе въ плоскости η' и проектируемъ весь чертежъ обратно на плоскость η .

Если мы будемъ теперь называть два „псевдо-отрезка“ или „псевдо-угла“ конгруэнтными, если они переходятъ одинъ въ другой при помощи этого построения, однозначность котораго мы сейчасъ докажемъ, то на этомъ опредѣленіи можно легко построить теорію конгруэнтности и равенства площадей ¹²⁾.

4. Что наша псевдо-геометрія въ пространствѣ R' совпадаетъ съ евклидовой геометрией, совершенно ясно; но полное доказательство этого мы воспроизведемъ такимъ образомъ, что укажемъ способъ отображенія, который превращаетъ „псевдо-плоскости“ и „псевдо-прямая“ пространства

которыя пересѣкаются въ точкѣ S . Далѣе проводимъ псевдо-прямая MS и aB , которыя пересѣкаются въ точкѣ T . Теперь проводимъ псевдо-прямую AT , которая пересѣкаетъ псевдо-прямую BS въ точкѣ b . Псевдо-прямая ab параллельна AB .

¹²⁾ Построенія Штейнера даютъ возможность въ обыкновенной геометріи построить на плоскости при помощи прямыхъ линій фигуру, конгруэнтную данной прямойлинейной фигурѣ въ любомъ другомъ положеніи.

Эти Штейнеровы построения могутъ быть выполнены и въ нашихъ псевдо-плоскостяхъ, если въ каждой изъ нихъ дана „псевдо-окружность“. Авторъ и устанавливаетъ прежде всего „псевдо-окружность“ въ каждой псевдо-плоскости, какъ указано въ текстѣ, и при помощи ея производитъ построения Штейнера. Выбѣсъ съ тѣмъ онъ опредѣляетъ „конгруэнтныя“ фигуры въ своей псевдо-геометріи, какъ такія, которыя могутъ быть преобразованы одна въ другую посредствомъ Штейнера построения. Но здѣсь возникаетъ вопросъ, не приведетъ ли такое опредѣленіе конгруэнтности къ противорѣчію въ самой системѣ. Авторъ доказываетъ, что это не можетъ случиться, при помощи метода инверсій. Этотъ методъ играетъ во всѣхъ дальнѣйшихъ разсужденіяхъ какъ здѣсь, такъ и ниже очень важную роль. Между тѣмъ теоріи самаго метода посвящены только немногія строки въ слѣдующемъ пунктѣ и въ § 24. Мы сочли поэтому необходимымъ изложить подробно въ особомъ дополненіи (II) теорію инверсій. Читатель найдетъ тамъ же и поясненія того примѣненія, которое эта теорія находитъ здѣсь въ п. 4-омъ.

R' въ действительныхъ плоскости и прямыхъ пространства R . Это отображеніе заключается въ инверсіи (или обращеніи).

„Инверсія“ въ плоскости, или „круговое сопряженіе“, предполагаетъ постоянную окружность ω , „окружность инверсіи“, центръ и радиусъ которой мы будемъ обозначать черезъ O и r . Различаютъ два вида инверсіи— „гиперболическую“ и „эллиптическую“. Каждой точкѣ P въ плоскости постоянной окружности ω гиперболическая инверсія относитъ „обратную“ или „гиперболически инвертированную“ точку P' ; именно, точка P' лежитъ на лучѣ OP , выходящемъ изъ точки O , такимъ образомъ, что $OP \cdot OP' = r^2$ ¹³⁾. Точка P , въ свою очередь, является, такимъ образомъ, обратной точкой относительно P' ; инверсія есть сопряженіе взаимное или инволюторное. То же относится и къ эллиптической инверсіи, которая отличается отъ гиперболической только тѣмъ, что взаимно обратныя точки, будучи также расположены на прямой, проходящей черезъ точку O , лежатъ, однако, по разныя стороны точки O ; поэтому теперь отрѣзкамъ OP и OP'' , произведеніе которыхъ по абсолютной величинѣ по прежнему равно r^2 , присваиваются противоположные знаки. Такимъ образомъ, при эллиптической инверсіи $OP \cdot OP'' = -r^2$. Если поэтому P' и P'' суть двѣ точки, обратныя P въ гиперболической и эллиптической инверсіи, то онѣ расположены симметрично относительно точки O , какъ центра симметріи.

Предложеніе 1. Эллиптическая инверсія относительно окружности ω получается, такимъ образомъ, изъ гиперболической инверсіи относительно той же окружности путемъ симметрическаго преобразованія относительно точки O , какъ центра симметріи.

Намъ будетъ поэтому достаточно остановиться подробнѣе на гиперболической инверсіи.

5. Построеніе точки P' , гиперболически обратной къ точкѣ P , производится непосредственно по формулѣ, которой она опредѣляется: $OP \cdot OP' = r^2$. Если точка P лежитъ внѣ окружности ω (фиг. 14), то мы строимъ окружность на отрѣзкѣ OP , какъ на діаметрѣ; она пересѣкаетъ окружность ω въ двухъ точкахъ U и V ; прямая UV пересѣкаетъ отрѣзокъ OP въ искомой точкѣ P' . Действительно, въ прямоугольномъ треугольникѣ $OP'U$, согласно Пифагоровой теоремѣ,

$$OP' \cdot OP = OU^2 = r^2.$$


Если же данная точка лежитъ внутри окружности ω и совпадаетъ, скажемъ, съ точкой P (фиг. 14), то мы возстаиваемъ изъ точки P пер-

¹³⁾ Точка P' лежитъ, слѣдовательно, на прямой OP по ту же сторону точки O , что и точка P (фиг. 14).

пендикуляр $P'U$, который встретит окружность ω в точке U . Из точки U проводим перпендикуляр к прямой OU (это будет касательная к окружности ω), который перескакает прямую OP' в искомой точке P .

Если λ есть окружность, проходящая через взаимно обратные точки P, P' (фиг. 14), и некоторый луч OQ , выходящий из точки O , встречает окружность λ в точках Q и Q' , то—по известному свойству


скажущих — $OQ \cdot OQ' = OP \cdot OP' = r^2$; иными словами, Q и Q' также суть взаимно обратные точки в гиперболической инверсии относительно окружности ω .



Фиг. 14.

Предложение 2. Каждая окружность, проходящая через две взаимно-обратные точки, инвертируется в себя самое.

Благодаря этому, если уже построены две взаимно обратные точки и окружность ω , то можно очень просто находить точку R' , обратную любой данной точке R ; для этого проводим из точки Q , как из центра, окружность, проходящую через точку R ; она встретит окружность λ в точке Q' ; пусть Q' будет вторая точка пересечения прямой OQ с окружностью λ ; тогда из точки O , как из центра, проведем окружность, проходящую через точку Q' ; она встретит прямую OR в искомой точке R' .



Фиг. 15.

6. Пусть A и A' будут две взаимно-обратные точки. Через одну из них, скажем через A , проведем перпендикуляр a , к прямой OA (фиг. 15); пусть P будет точка, обратная некоторой точке P' прямой a . Так как

$$OA \cdot OA' = OP \cdot OP' = r^2,$$

то четыре точки A, A', P, P' лежат на одной окружности, а потому $\sphericalangle A'PP'$ есть прямой угол, как и угол $\sphericalangle A'AP$. Поэтому $\sphericalangle A'P'O$ есть прямой угол и точка P' лежит на окружности a' , имеющей диаметром отрезок OA' .


Если точка P перемещается по прямой a , то точка P' занимает другія положенія на окружности a' ; иными словами, a' есть геометрическое мѣсто точекъ, обратныхъ точкѣ a . Итакъ:

Предложеніе 3. Если точка P описываетъ прямую, то обратная ей точка P' описываетъ окружность, проходящую черезъ центръ инверсіи O , и обратно ¹⁴⁾.

Точкѣ O окружности a' на прямой a естественно отвѣчаетъ безконечно удаленная ея точка; плоскость по отношенію къ инверсіи имѣетъ какъ бы только одну безконечно удаленную точку, черезъ которую проходятъ всѣ ея прямыя.

7. Предложеніе 4. Если точка P описываетъ окружность κ , не проходящую черезъ центръ инверсіи, то и обратная точка P' описываетъ окружность ¹⁵⁾.

Діаметръ окружности κ , проходящій черезъ точку O (фиг. 16), встрѣчаетъ послѣднюю въ точкахъ A и B ; пусть A' и B' будутъ соот-



Фиг. 16.

вѣтственно обратныя точки; пусть, наконецъ, C' будетъ точка, обратная произвольной третьей точкѣ C окружности κ . Въ такомъ случаѣ:

$$OA \cdot OA' = r^2 = OC \cdot OC'; \quad OA : OC = OC' : OA'.$$

Поэтому треугольникъ $OAC \sim OC'A'$ и $\angle OC'A' = \angle OAC = \alpha$. Такимъ же образомъ:

¹⁴⁾ Если прямая, которую пробѣгаетъ точка P , проходитъ черезъ центръ инверсіи, то обратная точка, по самому ея опредѣленію, пробѣгаетъ ту же прямую. Иными словами: прямая, проходящая черезъ центръ инверсіи, инвертируется въ себя самое. Это предложеніе содержится въ предыдущемъ, если мы будемъ смотрѣть на прямую, какъ на окружность безконечно большого радіуса.

¹⁵⁾ Это предложеніе въ томъ предположеніи, что на прямую мы смотримъ, какъ на окружность безконечно большого радіуса, представляетъ собой развитіе предыдущаго: окружность, проходящая черезъ центръ инверсіи обращается въ прямую, т. е. также въ окружность, но безконечно большого радіуса. Вотъ почему преобразованіе, состоящее изъ одной или нѣсколькихъ инверсій, относится къ круговымъ преобразованіямъ (Kreisverwandtschaft).

Веберъ. Энциклоп. элемент. геометріи.

$$OB \cdot OB' = OC \cdot OC', \quad OB : OC = OC' : OB';$$

$$OBC \sim OCB', \quad \sphericalangle OC'B' = \sphericalangle OBC = 2d - \beta.$$


Так как въ прямоугольномъ треугольникѣ ACB углы α и β дополняютъ другъ друга до прямого, то

$$\sphericalangle A'CB' = 2d - \alpha - \beta = d.$$

Отсюда слѣдуетъ, что точка C' лежитъ на окружности ω' , имѣющей своимъ діаметромъ отрезокъ $A'B'$, что и требовалось доказать. Однако, центры окружностей ω и ω' не обратны другъ другу.

Всѣ эти предложенія, по способу ихъ вывода, относятся къ гиперболической инверсіи; но въ виду соображеній, изложенныхъ въ концѣ п. 4., они остаются въ силѣ и для эллиптической инверсіи.

7. Если двѣ окружности ω и λ пересѣкаются въ точкѣ S , то подѣ ихъ угломъ въ точкѣ S разумѣютъ уголъ, который въ точкѣ S образуютъ ихъ касательныя. Впрочемъ, это понятіе остается



Фиг. 17.

еще многозначнымъ, какъ и уголъ двухъ пересѣкающихся прямыхъ; его легко, однако, установить однозначно (фиг. 17). Именно, окружности ω и λ раздѣляютъ плоскость на четыре области $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, ограниченныя дугами окружностей, на такъ называемые „круговые двугольники“; самыя дуги ограничиваются точками S и T пересѣченія окружностей ω и λ . За уголъ двугольника въ точкѣ S мы принимаемъ тотъ изъ угловъ между касательными въ точкѣ S , который цѣликомъ содержитъ сходящійся въ точкѣ S вырѣз-

зокъ ¹⁶⁾. Это уголъ вполне опредѣленный, и въ этомъ именно смыслѣ двугольникъ имѣетъ одинаковые углы при обѣихъ вершинахъ.

¹⁶⁾ Это опредѣленіе трудно признать вполне точнымъ. Такъ, напримѣръ, уголъ γ , къ которому относится дальнѣйшія разсужденія, не только не содержитъ цѣликомъ

Предложеніе 5. Характеристическая особенность инверсіи заключается въ томъ, что опредѣленные такимъ образомъ углы круговаго двуугольника не мѣняются при инверсіи.

Это значитъ, точкамъ двуугольника γ отвѣчаютъ при инверсіи точки, заполняющія другой двуугольникъ γ' , и оба двуугольника имѣютъ одинаковые углы. Въ самомъ дѣлѣ, уголь двуугольника γ въ точкѣ S содержится между двумя лучами a и b , которымъ въ обратной фигурѣ отвѣчаютъ двѣ круговыя дуги $Oa'S'$ и $Ob'S'$; касательныя къ этимъ дугамъ въ точкѣ O , а вслѣдствіе этого и въ точкѣ S' , параллельны лучамъ a и b ¹⁷⁾; иными словами, эти двѣ дуги образуютъ двуугольникъ, углы котораго равны угламъ двуугольника γ . Но касательныя въ точкѣ S' касаются такоже окружностей μ' и λ' , обратныхъ окружностямъ μ и λ . Эти окружности образуютъ такимъ образомъ 4 двуугольника, одинъ изъ которыхъ соотвѣтствуетъ двуугольнику γ и имѣетъ тѣ же углы.

Какъ и при прямолинейныхъ углахъ, здѣсь представляетъ особенный интересъ тотъ случай, когда двуугольники $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ прямоугольны; въ этомъ случаѣ говорятъ, что окружности μ и λ пересѣкаются подъ прямыми углами или ортогонально. На фиг. 21 окружности M и C пересѣкаются ортогонально; радиусы обѣихъ окружностей; проведенные въ точку пересѣченія, взаимно перпендикулярны, и каждый изъ нихъ касается другой окружности. Это свойство ортогональнаго пересѣченія инверсіи переноситъ также на обратныя окружности.

Если общая хорда двухъ окружностей проходитъ черезъ центръ одной изъ нихъ, то говорятъ, что эта послѣдняя пересѣкается второй окружностью діаметрально, или по діаметру. Это свойство, однако, не сохраняется при инверсіи. Окружность разсѣкается своимъ діаметромъ одновременно какъ ортогонально, такъ и діаметрально¹⁸⁾.

8. Всѣ эти соображенія легко переносятся на пространство. Инверсія въ пространствѣ предполагаетъ постоянную сферу ω — „сферу инверсіи“, центръ которой называется „центромъ инверсіи“. Опредѣленіе гиперболической и эллиптической инверсіи остается то же, что и на плоскости (п. 4).

Предложеніе 1 также остается въ силѣ, при чемъ только подъ ω нужно разумѣть сферу инверсіи. Если мы будемъ разсматривать фиг. 14-ую, какъ соотвѣствующаго двуугольника, но не содержать, строго говоря, даже конца этого двуугольника въ точкѣ S , какъ это, повидимому, разумѣетъ авторъ. Уголь двуугольника есть уголь между лучами, выходящими изъ точки S въ направленіи дугъ, ограничивающихъ двуугольникъ, и касающимися этихъ дугъ въ точкѣ S .

¹⁷⁾ Изъ построенія, указаннаго на чертежѣ 15, видно, что касательная въ точкѣ O къ окружности a' , обратной прямой a , параллельна прямой a . Касательныя въ точкѣ S' обыкновенно не параллельны лучамъ a и b , но заключаютъ тотъ же уголь.

¹⁸⁾ При этомъ діаметръ данной окружности, въ свою очередь, разсматривается, какъ окружность безконечно большаго радиуса.

сѣчение сферы инверсии одной изъ ея діаметральныхъ плоскостей, то мы получимъ слѣдующее предположеніе, аналогичное предположенію 2.

Предположеніе 6. Каждая сфера, проходящая черезъ двѣ взаимно обратныя точки, инвертируется въ себя самое.

Если мы будемъ вращать фигуры 14 и 15 вокругъ оси OA , то мы получимъ:

Предположеніе 7. Плоскость превращается инверсіей въ сферу, проходящую черезъ центръ инверсии, и обратно.

Предположеніе 8. Каждая сфера инвертируется также въ сферу.

Обѣ сферы имѣютъ точку O центромъ подобія; при гиперболической инверсии это будетъ внѣшній центръ подобія, а при эллиптической—внутренній. Предположеніе 5-ое съ соответствующими измѣненіями также переносится въ пространство.

9. Если мы теперь примѣнимъ инверсію къ псевдо-прямымъ и къ псевдо-плоскостямъ пространства R' (п. 1—4), принимая точку O за центръ и при совершенно произвольной степени инверсии $\pm r^2$, то онѣ превращаются въ прямыя и плоскости пространства R . Напротивъ, вспомогательная сфера, которой мы воспользовались для производства Штейнеровыхъ построений, переходитъ въ сферу пространства R ; всѣмъ указаннымъ выше „псевдо-построеніямъ“ отвѣчаютъ обыкновенныя Штейнеровы построения, если псевдо-центры псевдо-окружностей (и псевдо-сферы) представляютъ собой обращенія дѣйствительныхъ центровъ обратныхъ имъ окружностей (и обращенной сферы)¹⁹⁾. Этимъ не только доказана

¹⁹⁾ Въ пунктѣ 3. авторъ выяснилъ, какъ онъ устанавливаетъ конгруэнтность въ своемъ „псевдо-пространствѣ“. Точкой отправленія для него служатъ Штейнеровы построения, для осуществленія которыхъ въ пространствѣ R' ему нужно имѣть „сферу“ и „окружность“ въ каждой псевдо-плоскости. Въ п. 3 выяснено, какъ онъ этого достигаетъ. Но кромѣ сферы и окружности въ каждой плоскости, для производства Штейнеровыхъ построений нужно еще знать центръ этой сферы и центръ каждой окружности. Что же принять за „псевдо-центръ“ этой псевдо-сферы и за „псевдо-центръ“ каждой псевдо-окружности въ псевдо-пространствѣ R' ? Авторъ обѣщаетъ установить это ниже (обѣщаетъ собственно сдѣлать это въ п. 4; но такъ какъ послѣдній листъ нѣсколько измѣненъ по 2-му изданію, то это перенесено сюда, въ п. 9). Вотъ какъ онъ здѣсь это осуществляетъ. Онъ производитъ нѣкоторую инверсію относительно точки O . Эта инверсія превращаетъ псевдо-сферу σ псевдо-пространства R' въ нѣкоторую сферу σ' въ пространствѣ R ; пусть C будетъ центръ сферы σ' въ пространствѣ R , а C точка, обратная относительно C' ; эту точку C авторъ принимаетъ за псевдо-центръ псевдо-сферы σ въ псевдо-пространствѣ R' ; эту псевдо-точку онъ принимаетъ за „равноотстоящую“ отъ всѣхъ точекъ псевдо-сферы въ R' . Только при этомъ соглашеніи между Штейнеровыми построениями въ псевдо-пространствѣ R' и аналогичными построениями въ пространствѣ R устанавливается то соответствіе, которое автору нужно: если псевдо-прямая проходитъ черезъ псевдо-центръ нѣкоторой псевдо-окружности, то соответствующая прямая въ пространствѣ R проходитъ черезъ центръ соответствующей окружности.


допустимость этих построений для определения конгруэнтности, но вместе с тем обнаружено, что псевдо-геометрия никогда не может привести к логическим противоречиям; в самом деле, всякое противоречие в этой системе путем инверсии привело бы к противоречию в Евклидовой геометрии, которая, как мы увидим ниже, может быть абстрактно обоснована, так что отсутствие в ней противоречия становится очевидным. Сейчас мы имеем в виду только обнаружить, что можно построить геометрию, которая в словесном выражении ее предложенной буквально совпадает с обычной геометрией, между тем как ее „плоскости“ и „прямые“ совершенно отличаются от обыкновенных.

§ 9. Сферическая сфера.


1. Если лучи пучка O ²⁰⁾ встречают окружность M соответственно в точках A и A' , B и B' , C и C' (см. фиг. 18 и 19), то, согласно известному предложению,

$$OA \cdot OA' = OB \cdot OB' = OC \cdot OC' \dots,$$

независимо от того, расположена ли точка O вне или внутри окружности. В первом случае это постоянное произведение, так называемая



Фиг. 18.



Фиг. 19.

„степень точки O относительно окружности“, может быть определена, как квадрат касательной OT , во втором случае, как квадрат полухорды OX , перпендикулярной к прямой OM . Если прямая OM встречает окружность в точках B и B' , то мы можем также положить в первом случае:

²⁰⁾ Под пучком лучей разумеем совокупность прямых, расположенных в одной плоскости и проходящих через общую точку, центр пучка.

$$OB \cdot OB' = (OM - r)(OM + r) = OM^2 - r^2,$$

во второмъ случаѣ:

$$OB \cdot OB' = (r - OM)(r + OM) = r^2 - OM^2 = -(OM^2 - r^2),$$

гдѣ M означаетъ центръ, а r радиусъ круга. Это выраженіе степени точки относительно окружности $\pm(OM^2 - r^2)$, дѣлаетъ цѣлесообразнымъ признать этой „степени“ также знакъ; именно, считать степень точки O относительно окружности положительной, если она лежитъ внѣ окружности, и отрицательной въ противоположномъ случаѣ; это можно обосновать еще и тѣмъ, что въ первомъ случаѣ оба отрезка сѣкущей всегда расположены по одну сторону точки O , во второмъ случаѣ—по разныя стороны точки O ; если этимъ отрезкамъ въ первомъ случаѣ приписать одинаковые знаки, то во второмъ они естественно получаютъ различные знаки. Такимъ образомъ, степень точки O относительно окружности M

$$\text{на фиг. 18 есть } +(OM^2 - r^2) = +OT^2,$$

$$\text{на фиг. 19 „ } -(r^2 - OM^2) = -OX^2 \text{ } ^{21}.$$

Эти понятія можно также распространить и на сферу. Если лучи связки O ²² встрѣчаютъ сферу центра M въ точкахъ A и A' , B и B' , C и C' . . . , то плоскость, определяемая лучами $OA A'$ и $OB B'$, сѣчетъ сферу по окружности, для которой $OA \cdot OA' = OB \cdot OB'$; точно такъ же въ плоскости лучей $OB B'$ и $OC C'$ степень точки O относительно сѣченія есть $OC \cdot OC' = OB \cdot OB'$. Такъ что и здѣсь соотношеніе

$$OA \cdot OA' = OB \cdot OB' = OC \cdot OC' \dots$$

справедливо для всѣхъ лучей связки O . Это постоянное произведеніе называется „степенью точки O относительно сферы“, его берутъ со знакомъ $+$ или $-$, смотря по тому, лежитъ ли точка O внѣ сферы или внутри ея; въ томъ же другомъ случаѣ степень равна $+(OM^2 - r^2)$.

Задача 1. Каково геометрическое мѣсто точекъ, имѣющихъ одинаковую степень p^2 (или $-p^2$) относительно данной окружности?

Задача 2. Построить всѣ точки, степень которыхъ относительно окружности M_1 , есть $\pm p_1^2$, а относительно окружности M_2 есть $\pm p_2^2$.

Задача 3. Распространить тѣ же задачи на сферу.

2. Положимъ, что точка P (фиг. 20) имѣетъ одинаковую степень (съ однимъ и тѣмъ же знакомъ) относительно двухъ окружностей, произвольно расположенныхъ въ одной плоскости, такъ что

²¹) Такимъ образомъ, степень точки относительно окружности всегда выражается разностью $OM^2 - r^2$.

²²) Подъ связкой лучей разумѣютъ совокупность прямыхъ въ пространствѣ, выходящихъ изъ одной точки.

$$PM_1^2 - r_1^2 = PM_2^2 - r_2^2.$$

Если Q есть основание перпендикуляра, опущенного из точки P на прямую M_1M_2 , то, вычитывая из обеих частей предыдущаго равенства PQ^2 , мы получимъ:


$$(PM_1^2 - PQ^2) - r_1^2 = (PM_2^2 - PQ^2) - r_2^2,$$

$$QM_1^2 - r_1^2 = QM_2^2 - r_2^2.$$

Но въ такомъ случаѣ точка Q также имѣетъ одинаковую степень относительно обеихъ окружностей; если мы теперь къ обѣимъ частямъ послѣдняго равенства прибавимъ QS^2 , гдѣ S есть произвольная точка прямой PQ , то

$$(QM_1^2 + QS^2) - r_1^2 = (QM_2^2 + QS^2) - r_2^2,$$

$$SM_1^2 - r_1^2 = SM_2^2 - r_2^2.$$



Фиг. 20.

Мы видимъ, такимъ образомъ, что и точка S имѣетъ одинаковую степень относительно обеихъ окружностей. Съ другой стороны, на центральной оси M_1M_2 есть только одна точка Q , въ которой имѣетъ мѣсто соотношение

$$QM_1^2 - r_1^2 = QM_2^2 - r_2^2,$$

или

$$QM_1^2 - QM_2^2 = r_1^2 - r_2^2.$$

Въ самомъ дѣлѣ, такъ какъ $QM_1 + QM_2 = M_1M_2 = c$, то предыдущее соотношение даетъ:

$$c[QM_1 - (c - QM_1)] = r_1^2 - r_2^2,$$

откуда мы получаемъ для QM_1 значеніе:

$$QM_1 = \frac{1}{2} r_1^2 - \frac{r_2^2 - c^2}{c}$$

Изъ этого слѣдуетъ:

Предложеніе I. Точки, имѣющія одинаковую степень относительно двухъ окружностей, расположенныхъ въ одной плоскости, образуютъ прямую, перпендикулярную къ ихъ линіи центровъ.

Степень точки относительно двухъ окружностей, естественно, имѣеть въ различныхъ точкахъ этой прямой такъ называемую „радикальную ось двухъ окружностей“, различные значенія.

Если окружности пересѣкаются, то радикальной осью служитъ обшая хорда (теорема объ отрѣзкахъ хорды)²³⁾. Чтобы найти по крайней мѣрѣ одну точку, имѣющую одинаковую степень относительно двухъ окружностей въ томъ случаѣ, когда послѣднія не пересѣкаются, прибѣгаютъ къ третьей окружности, которая пересѣкаетъ обѣ данныя окружности; точка пересѣченія двухъ общихъ хордъ этой третьей окружности съ двумя данными удовлетворяетъ требованію. Тѣмъ же способомъ можно построить и другую такую же точку. Прямая, соединяющая эти двѣ точки или перпендикуляръ, опущенный изъ первой точки на линію центровъ, и будетъ радикальной осью двухъ окружностей.

Если мы будемъ вращать обѣ окружности вокругъ линіи центровъ, то мы получимъ двѣ сферы. вмѣстѣ съ тѣмъ мы приходимъ къ слѣдующему выводу:

Предложеніе II. Геометрическое мѣсто точекъ, имѣющихъ одну и ту же степень относительно двухъ сферъ, есть плоскость, такъ называемая „радикальная плоскость“ этихъ сферъ; эта плоскость перпендикулярна къ линіи центровъ двухъ сферъ, а въ томъ случаѣ, когда послѣднія пересѣкаются, она содержитъ окружность, по которой это пересѣченіе происходитъ.


Задача 4. Построить радикальную плоскость двухъ непересѣкающихся сферъ k_1 и k_2 при помощи двухъ вспомогательныхъ сферъ, которыя пересѣкаютъ данныя сферы k_1 и k_2 .

3. Если три окружности расположены въ одной плоскости, и ихъ центры M_1 , M_2 , M_3 образуютъ треугольникъ, то радикальная ось этихъ окружностей p_{12} , p_{23} , p_{31} пересѣкаются въ одной точкѣ C , въ такъ называемомъ „радикальномъ центрѣ“ этихъ окружностей; въ самомъ дѣлѣ, точка пересѣченія прямыхъ p_{12} и p_{23} имѣеть одинаковую степень относительно всѣхъ трехъ окружностей; поэтому черезъ эту точку необходимо должна пройти также третья радикальная ось p_{31} . Въ томъ же случаѣ, когда точки M_1 , M_2 , M_3 расположены на одной прямой, прямая p_{12}

²³⁾ Согласно тому, что сказано выше, чтобы найти радикальную ось двухъ окружностей, нужно на линіи центровъ найти точку Q , имѣющую одинаковую степень относительно обѣихъ окружностей, и изъ нея возставить перпендикуляръ

f_{23} , f_{31} либо различны—и въ такомъ случаѣ онѣ параллельны, либо онѣ совпадаютъ. Въ первомъ случаѣ говорятъ о такъ называемомъ „несобственномъ“ радикальномъ центрѣ²⁴⁾; послѣдній же случай имѣетъ мѣсто тогда, когда двѣ изъ радикальныхъ осей совпадаютъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ этомъ случаѣ точка пересѣченія двойной оси съ линіей центра имѣетъ одинаковую степень относительно всѣхъ трехъ окружностей; а мы видѣли, что такая точка на линіи центровъ двухъ окружностей можетъ быть только одна.

Если три окружности M_1 , M_2 , M_3 имѣютъ несобственный радикальный центр²⁵⁾, то линія центровъ сѣчетъ ортогонально и діаметрально всѣ три окружности; вмѣстѣ съ тѣмъ помимо этой прямой нѣтъ ни одной окружности, которую пересѣкали бы ортогонально или діаметрально всѣ три окружности, ибо центръ такой окружности имѣлъ бы одинаковую степень относительно трехъ данныхъ окружностей. Напротивъ, если C есть конечная точка и $\pm r^2$ есть ее степень относительно трехъ окружностей, и мы проведемъ изъ центра C окружность радиуса r , то она, согласно п. 2., разсѣкается окружностями M_1 , M_2 , M_3 ортогонально (фиг. 21) или діаметрально (фиг. 22), смотря по тому, имѣетъ ли степень положительное или отрицательное значеніе²⁶⁾.



Фиг. 21.

Аналогичныя предложенія справедливы и относительно сферъ. Если ихъ радикальныя плоскости $\pi_{1,2}$ и $\pi_{2,3}$ пересѣкаются по прямой линіи, то каждая точка этой прямой имѣетъ одинаковую степень относительно трехъ сферъ; слѣдовательно, и третья радикальная плоскость $\pi_{3,1}$ должна проходить черезъ эту прямую.

къ линіи центровъ. Если окружности пересѣкаются, то точкой Q служить пересѣченіе общей хорды съ линіей центровъ, такъ какъ ее степень относительно обѣихъ окружностей равна квадрату общей полухорды.


²⁴⁾ Каковымъ служить принимаемая въ проєктивной геометріи безконечно удаленная точка пересѣченія этихъ параллельныхъ линій. См. дополненіе I въ концѣ книги (ср. также стр. 30).

²⁵⁾ т. е. если три радикальныя оси параллельны.

²⁶⁾ Если степень радикальнаго центра C относительно окружностей равна $\pm r^2$, то точка C лежитъ внѣ окружностей, и степень представляетъ собой квадратъ касательной, проведенной изъ точки C къ любой изъ трехъ окружностей. Касатель-

Предложение III. Если из трех радикальных плоскостей трех сфер две пересекаются по прямой линии, то последняя лежит также и в третьей плоскости; эта прямая называется „радикальной осью“ трех сфер.

Предложение IV. Если каждая три из четырех сфер определяют радикальную ось, то эти три оси пересекаются в одной точке, в „радикальном центре“ этих четырех сфер. В самом деле, каждая две радикальные оси расположены в одной плоскости, а потому должны пересекаться.



Фиг. 22.

Предложение V. Радикальный центр C четырех сфер служит центром некоторой сферы k , которая разскается всеми четырьмя сферами ортогонально или диаметрально, смотря по тому, имеет ли общая степень положительное или отрицательное значение.

ными служат поэтому радиусы окружности C , которая, таким образом, счесть данная окружности ортогонально (фиг. 21).

Если степень радикального центра C относительно окружностей есть $-r^2$, то он лежит внутри трех окружностей, и полухорда каждой окружности, перпендикулярная к ее диаметру в точке C , равна r . Окружность C счесть три окружности диаметрально (фиг. 22).

Только въ томъ случаѣ, когда точка C уходитъ въ бесконечность и сфера k вырождается въ плоскость, пересѣченіе становится одновременно ортогональнымъ и діаметральнымъ.

Кромѣ того, нужно упомянуть еще о томъ частномъ случаѣ, когда степень равна нулю, т. е. сферы касаются другъ друга; общая діаметральная или ортогональная сфера вырождается въ этомъ случаѣ въ точку. Врядъ ли нужно перечислять частности, которыя могутъ имѣть мѣсто, если одна изъ данныхъ сферъ неограниченно возрастаетъ или убываетъ. Мы приведемъ еще нѣсколько задачъ; предварительно, однако, сдѣлаемъ еще слѣдующее общее замѣчаніе.

Въ то время, какъ построеніе обыкновенной элементарной геометріи въ ея догматическомъ изложеніи производитъ впечатлѣніе тяжеловѣсности, и отдѣльныя теоремы часто оказываются изолированными, часто поражаютъ своими неожиданными особенностями, — сферическая геометрія даетъ намъ возможность въ первый разъ заглянуть въ богатую область новой геометріи, факты которой разматываются естественно изъ немногихъ плодотворныхъ основныхъ понятій и внимательному изслѣдователю являются сами собой.

Задача 5. Найти геометрическое мѣсто точекъ, изъ которыхъ выходятъ равныя касательныя къ двумъ сферамъ.

Задача 6. Найти точки, которыя имѣютъ относительно данныхъ трехъ сферъ k_1, k_2, k_3 данныя степени P_1, P_2, P_3 ($P_i = \pm d_i^2, i = 1, 2, 3$).

Задача 7. Найти геометрическое мѣсто центровъ всѣхъ сферъ, пересѣкающихъ данную сферу k подъ даннымъ угломъ.

Задача 8. Превратить двѣ пересѣкающіяся сферы при помощи инверсіи въ двѣ плоскости и показать, что послѣднія пересѣкаются подъ тѣмъ же угломъ, что и сферы. Отсюда вытекаетъ общее предложеніе, что двѣ сферы всегда пересѣкаются подъ тѣмъ же угломъ, что и обратныя (инвертированныя) сферы.

Задача 9. Найти геометрическое мѣсто центровъ всѣхъ сферъ, которыя пересѣкаютъ данныя двѣ плоскости подъ данными углами.

Задача 10. Найти геометрическое мѣсто центровъ всѣхъ сферъ, которыя пересѣкаютъ двѣ данныя пересѣкающіяся сферы подъ данными углами.


Быть можетъ, цѣлесообразно рѣшить предварительно аналогичныя задачи относительно окружностей. Предлагаемъ также построить радикальную плоскость двухъ сферъ, радикальную ось трехъ сферъ и рассмотреть ихъ пересѣченія съ плоскостью.

4. Подъ „пучкомъ окружностей“ разумѣютъ совокупность окружностей, расположенныхъ въ одной плоскости и имѣющихъ общую радикальную ось. Если двѣ окружности такого пучка имѣютъ общую точку, то степень послѣдней относительно окружности равна нулю; она лежитъ

на радикальной оси, и все окружности пучка через нее necessarily проходят, потому что каждая точка оси имеет одинаковую степень относительно всех окружностей пучка. В зависимости от того, сколько общих точек имеют окружности пучка, различают пучки трех типов:

1. Гиперболические пучки, в которых окружности вовсе не имеют общих точек;
2. Параболические, в которых окружности имеют одну общую точку;
3. Эллиптические, в которых окружности имеют две общие точки.

Окружности параболического пучка касаются друг друга по общей радикальной оси a в одной и той же точке A ; центры их расположены




Фиг. 23.

на одной прямой a' , перпендикулярной к a в точке A (фиг. 23). Окружности пучка, „ортогонального“ к этому, центры которых расположены на прямой a , а радикальной осью которых служит прямая a' , пересекают окружности данного пучка под прямыми углами.

Эллиптический пучок также очень легко построить: его окружности проходят через

две неподвижные точки A_1 и A_2 („основные точки“), центры же их расположены на прямой a' , перпендикулярной к A_1A_2 в середине отрезка A_1A_2 (фиг. 24).




Фиг. 24

Самой большой окружностью пучка, как и в параболическом пучке, служит радикальная ось a ; самая же малая окружность пучка имеет диаметром отрезок A_1A_2 , так что все остальные окружности пучка пересекают ее диаметрально. И здесь каждая точка радикальной оси имеет одинаковую степень относительно всех

окружностей пучка. В точках P оси a , которые лежат вне отрезка A_1A_2 , степень имеет положительные значения p^2 , так что из точки P всегда можно провести ко всем окружностям пучка касательные, имеющие общую длину p . Окружность радиуса p , имеющая центр в точке P ,

счесть таким образом ортогонально всё окружности пучка. Если M_1 и M_2 суть центры двух окружностей пучка (см. фиг. 25), r_1 и r_2 их радиусы, то M_1 имѣет относительно окружности P степень r_1^2 , точка M_2 —степень r_2^2 . Если Q есть другая окружность, относительно которой мы предположим только, что она сѣчет ортогонально окружности M_1 и M_2 , то относительно нея точка M_1 также имѣет степень r_1^2 , а точка M_2 —степень r_2^2 . Слѣдовательно, прямая a' , соединяющая точки M_1 и M_2 , есть общая радикальная ось всѣхъ окружностей, которыя сѣкутъ ортогонально окружности данного пучка. Такъ какъ, съ другой стороны, прямая a сама также принадлежитъ первому пучку,




Фиг. 25.

то центры ортогональныхъ окружностей расположены на прямой a ; ортогональныя окружности также образуютъ пучекъ, „ортогональный“ къ первому пучку; осью второго пучка служить прямая a' . Но второй пучекъ будетъ гиперболическимъ. Въ самомъ дѣлѣ, если O есть середина отрезка A_1A_2 , то въ первомъ эллиптическомъ пучкѣ

$$PM_1^2 = p^2 + r_1^2 = M_1O^2 + P(O)^2.$$

Такъ какъ $M_1O < r_1$, то отсюда слѣдуетъ, что $p < PO$, иными словами, окружность P не встрѣчаетъ прямой a' ; а такъ какъ a' принадлежитъ второму пучку въ качествѣ предѣльной окружности, то окружности этого пучка не пересѣкаются. Эта зависимость двухъ пучковъ взаимная, потому что окружности второго пучка, въ свою очередь, пересѣкаютъ ортогонально окружности перваго пучка; если мы, такимъ образомъ, исходимъ отъ гиперболическаго пучка, то тѣмъ же путемъ мы придемъ къ ортогональному эллиптическому пучку. Такъ какъ внутри каждой окружности гиперболическаго пучка расположены меньшія окружности пучка, то эти окружности съ каждой стороны пучка приближаются къ нѣкоторой точкѣ. Эти двѣ точки A_1 и A_2 расположены симметрично относительно радикальной оси и называются „нулевыми окружностями“ гиперболическаго пучка, или „основными точками“ соответствующаго ортогональнаго эллиптическаго пучка. Эллиптическій пучекъ вовсе не имѣетъ нулевыхъ окружностей, параболическій имѣетъ одну, а гиперболическій имѣетъ двѣ (см. также фиг. 26).

Чтобы перейти от эллиптического пучка к ортогональному гиперболическому, мы исходили из точки P , расположенной вне отрезка, соединяющего основные точки. Теперь интересно взять точку P внутри этого отрезка; в таком случае степень точки P относительно окружностей пучка имеет отрицательное значение $-p^2$; окружность (P) , имеющая центр в точке P и радиус p , в этом случае разскается диаметрально всеми окружностями пучка²⁷⁾. Если точка P пробегает весь отрезок A_1A_2 , то окружность (P) изменяется по величине и положению,




Фиг. 26.

но при этом постоянно касается эллипса ϵ , имеющего точки A_1 и A_2 своими фокусами и малую ось, равную A_1A_2 . Впрочем, последним фактом нам ниже не придется пользоваться, вследствие чего мы и ограничимся этим указанием.

5. Совокупность окружностей на плоскости, относительно которых некоторая точка O имеет одну и ту же степень, называется „связкой окружностей“. Так как все окружности, проходящие через одну и ту же точку плоскости, сообщают последней одну и ту же степень 0, то они образуют предельный случай связки, так называемую „параболическую“ связку. Связка называется „гиперболической“ или „эллиптической“, если общий радикальный центр имеет соответственно положительную или отрицательную степень относительно окружностей связки. Если в гипер-

²⁷⁾ Если степень точки P относительно окружности M' (фиг. 26) есть $-p^2$, то p есть полухорда окружности M' , перпендикулярная к $M'P$ в точке P , как это изображено на чертеже. Поэтому окружность M' счесть окружность P диаметрально.

болической связки значение степени есть $+p^2$, то окружность κ , имѣющая центръ въ точкѣ O и радиусъ p , пересѣкаетъ ортогонально всѣ окружности связки. Связка можетъ быть въ этомъ случаѣ опредѣлена, какъ совокупность окружностей, пересѣкающихся ортогонально окружностью κ . Это соображение даетъ также способъ для построения окружностей связки (фиг. 27): въ произвольной точкѣ A окружности κ проводимъ къ ней касательную и изъ произвольной точки C этой касательной проводимъ окружность, проходящую черезъ точку A ; такъ какъ точка O имѣетъ относительно этой окружности степень $+p^2$, то послѣдняя принадлежитъ нашей связкѣ. Нашей связкѣ принадлежитъ также каждый пучекъ, опредѣляемый двумя окружностями связки. Нулевые круги всѣхъ гиперболическихъ пучковъ расположены на окружности κ ; основ-



Фиг. 27.

ныя точки каждаго эллиптического пучка взаимно обратны другъ другу при инверсии, центромъ которой служить точка O , а степенью p^2 . Обратно, всякая окружность, проходящая черезъ двѣ взаимно обратныя въ этой инверсии точки, принадлежитъ пучку. Вообще, каждая прямая, проходящая черезъ точку O , пересѣкаетъ каждую окружность связки, которую она встрѣчаетъ въ двухъ точкахъ, взаимно обратныхъ въ этой инверсии; такія двѣ точки называются „парой точекъ связки“. Поэтому черезъ двѣ точки плоскости не взаимно обратныя проходить только одна окружность связки, которую можно построить, опредѣляя точку обратную одной изъ данныхъ. Вообще эта инверсія преобразовываетъ связку въ себя самое²⁸⁾.

²⁸⁾ Нужно помнить, что въ гиперболической связкѣ касательная изъ центра къ каждой окружности связки равна p .


На фиг. 27 изображены три пучка, принадлежаще связкѣ ортогональной окружности κ : слѣва гиперболическій, внизу параболической, справа эллиптической. Нулевая окружности гиперболическаго пучка, какъ и всѣ окружности пучка, пересѣкаютъ окружность κ (ортогонально), т. е. попросту лежатъ на этой окружности. Обратно, если мы возьмемъ произвольныя двѣ точки на окружности κ и построимъ гиперболическій пучекъ, для котораго эти двѣ точки служатъ нулевыми окружностями, то всѣ окружности пучка имѣютъ (какъ и нулевая) относительно точки O степень p^2 , сѣкутъ окружность κ ортогонально, а потому принадлежатъ связкѣ (O) .

Если двѣ окружности связки (O) пересѣкаются въ точкахъ Q_1 и Q_2 , то произведение $OQ_1 \cdot OQ_2$ равно квадрату касательной, проведенной изъ O къ каждой

Задача 11. Найди общую окружность двух пучков, принадлежащих одной связке²⁹⁾.

Задача 12. Преврати эллиптический пучек окружностей путем инверсии в пучек лучей. Во что обратится в этом случае ортогональный пучек?

Эллиптическая связка отличается большим единообразием, нежели гиперболическая. Так как общий радикальный центр имеет в этом случае отрицательную степень — p^2 относительно всех окружностей связки, то последние все пересекают диаметрально окружность k , имеющую центр в точке O и радиус p . Между тем, как ортогональная окружность и



Фиг. 28.

гиперболической связки не принадлежит самой связке, так как точка O имеет относительно нее отрицательную степень, — „диаметральная окружность“ k эллиптической связки входит в состав последней. И здесь весь пучек, определяемый двумя окружностями связки, принадлежит связке; но так как в этом случае точка O находится внутри всех окружностей связки, то последние попарно пересекаются в двух

точках. Таким образом, в состав связки в этом случае входят исключительно эллиптические пучки, (см. фиг. 28 и 29; на фигуре 29 основные точки эллиптического пучка расположены на диаметральной окружности); основные точки этих пучков естественно и в этом случае взаимно обратны относительно центра O при степени инверсии — p^2 . Вообще, как и в гиперболической связке, каждая прямая, проходящая через точку O ,

из этих двух окружностей, т. е. равно p^2 . Поэтому точки Q_1 и Q_2 взаимно обратны при инверсии, имеющей центр O и степень p^2 . Обратно, если точки Q_1 и Q_2 взаимно обратны в этой инверсии, т. е. $OQ_1 \cdot OQ_2 = p^2$, то касательная из точки O к любой окружности, проходящей через точки Q_1 и Q_2 имеет длину p ; иначе говоря, все окружности, проходящие через точки Q_1 и Q_2 , принадлежат нашей связке (O). Если поэтому Q_1 и Q'_1 суть две взаимно обратные в нашей инверсии точки, то через них проходит бесчисленное множество окружностей связки, они не определяют окружности связки. Но если они не взаимно обратны, то мы построим точку Q_2 , обратную Q'_1 , и проведем окружность, проходящую через точки Q_1 , Q'_1 и Q_2 ; это будет окружность связки и притом единственная, проходящая через точки Q_1 и Q'_1 . Если точки Q_1 , Q'_1 и Q_2 лежат на одной прямой, то окружность вырождается в прямую, проходящую через точку O .


²⁹⁾ Центр искомой окружности лежит в пересечении осей обоих пучков.

встрѣчаетъ каждую окружность связки въ двухъ точкахъ, взаимно обратныхъ въ этой инверсiи, — въ „парѣ точекъ связки“.

Задача 13. Построить общую окружность двухъ пучковъ связки.

Задача 14. Черезъ любыя двѣ не-обратныя точки проходить окружность связки. Построить ее ³⁰⁾.

Если даны двѣ связки съ совпадающими или различными центрами O_1 и O_2 , а P_1 и P_2 суть точки, обратныя въ этихъ связкахъ относительно одной и той же точки P , то окружность π , проходящая черезъ точки P, P_1, P_2 принадлежитъ обѣимъ связкамъ. Если τ есть другая такая же окружность, то O_1O_2 есть радикальная ось этихъ двухъ окружностей, и определяемый ими пучекъ принадлежитъ обѣимъ связкамъ ³¹⁾. Если точка O_2 совпадаетъ съ точкой O_1 , то этотъ пучекъ вырождается въ совокупность прямыхъ, проходящихъ черезъ точку O_1 . Если мы будемъ разсматривать этотъ пучекъ лучей, какъ предѣльный случай эллиптического пучка окружностей, въ который онъ къ тому же можетъ быть превращенъ мегодомъ инверсiи, то мы получимъ теорему: общія окружности двухъ связокъ образуютъ пучекъ окружностей.



Фиг. 20

³⁰⁾ Въ виду важности, которую имѣютъ эти двѣ задачи для дальнѣйшаго, мы приведемъ ихъ рѣшенiе.

Для рѣшенiя задачи 13 замѣтимъ, что пучекъ въ эллиптической связкѣ определяется либо двумя его основными точками, либо двумя его окружностями; въ послѣднемъ случаѣ эти двѣ окружности своимъ пересѣченіемъ опять таки определяютъ основныя точки пучка. Линiя центровъ пучка есть перпендикуляръ, восстановленный къ отрѣзку, соединяющему основныя точки, изъ его середины. Если даны два пучка связки, то ихъ линiи центровъ своимъ пересѣченіемъ определяютъ центръ окружности, принадлежащей обоимъ пучкамъ. Если линiи центровъ параллельны, то основныя точки обонхъ пучковъ лежатъ на одной прямой, въ которую въ этомъ случаѣ и вырождается общая окружность.

Для рѣшенiя задачи 14 строимъ точку, обратную относительно одной изъ данныхъ, φ проводимъ окружность черезъ данныя двѣ точки и вновь построенную точку. Если эти три точки лежатъ на одной прямой, то въ нее вырождается искомая окружность.

³¹⁾ Какъ мы видѣли въ п. 5, всякая окружность, проходящая черезъ двѣ точки, взаимно обратныя въ инверсiи связки, принадлежитъ этой связкѣ; поэтому окружность π принадлежитъ какъ связкѣ O_1 , такъ и связкѣ O_2 . Радикальная ось

6. Намъ остается только распространить эти результаты на сферы. Прежде всего, вращая пучекъ окружностей вокругъ линіи центровъ, мы получимъ „пучекъ сферъ“, т. е. совокупность сферъ, имѣющихъ общую радикальную плоскость. Если окружности, принадлежащая связкѣ (не относя сюда ортогональнаго круга, когда онъ существуетъ) вращаются каждая вокругъ своего центра, то онѣ описываютъ сферы, которая въ совокупности образуютъ „связку сферъ“, т. е. совокупность сферъ, имѣющихъ общую радикальную ось; эта радикальная ось перпендикулярна къ плоскости вращающейся связки окружностей въ радикальномъ центрѣ послѣдней. Итакъ, центры сферъ, образующихъ пучекъ, въ совокупности составляютъ прямую линію; центры же сферъ, образующихъ связку, составляютъ плоскость. Сферы, принадлежащая связкѣ, либо проходятъ всѣ черезъ двѣ точки, либо это не имѣетъ мѣста³²⁾. Въ первомъ случаѣ прямая, соединяющая эти двѣ точки, есть общая радикальная ось; всѣ сферы такой связки пересѣкаютъ діаметрально нѣкоторую сферу, имѣющую центръ въ точкѣ пересѣченія S плоскости центровъ съ радикальною осью. Во второмъ случаѣ точка S служитъ центромъ сферы, которая пересѣкаетъ ортогонально всѣ сферы, принадлежащая пучку. Радиусъ сферы въ томъ и въ другомъ случаѣ равенъ корню квадратному изъ абсолютной величины степени точки S относительно сферъ связки.

Легко видѣть, что каждой связкѣ сферъ отвѣчаетъ пучекъ сферъ, сѣкущихъ ортогонально всѣ сферы связки, и обратно³³⁾.

Совокупность сферъ, относительно которыхъ нѣкоторая точка O имѣетъ одну и ту же степень, называется „сѣтью сферъ“. Такую сѣть

окружностей π и τ должна проходить черезъ радикальный центръ каждой связки, а потому совпадаетъ съ прямой $O_1 O_2$.

³²⁾ Какъ и въ случаѣ пучка окружностей на плоскости, радикальная ось либо встрѣчаетъ всѣ сферы связки въ одной и той же парѣ точекъ, либо вовсе ихъ не встрѣчаетъ.

³³⁾ Если P есть точка на радикальной оси связки, то она имѣетъ одну и ту же степень относительно всѣхъ сферъ связки. Если эта степень положительная, скажемъ p^2 , то всѣ касательныя изъ точки P къ каждой сферѣ имѣютъ длину p . Поэтому сфера π , имѣющая центръ въ точкѣ P и радиусъ p , сѣчетъ ортогонально всѣ сферы связки.

Итакъ, всѣ сферы π имѣютъ центры на радикальной оси связки. Нетрудно обнаружить, что плоскость, въ которой лежатъ центры всѣхъ сферъ связки, есть общая радикальная плоскость сферъ π . Въ самомъ дѣлѣ, пусть S будетъ произвольная точка этой плоскости, σ — сфера связки, имѣющая центръ въ точкѣ S . Сфера σ сѣчетъ ортогонально всѣ сферы π , а потому имѣетъ относительно нихъ одну и ту же степень (ср. п. 4). Сферы π образуютъ, такимъ образомъ, пучекъ, сѣкущихъ ортогонально всѣ сферы связки.

Если радикальная ось связки пересѣкаетъ ея сферы въ двухъ точкахъ A_1 и A_2 , то ортогональный пучекъ будетъ гиперболическій, A_1 и A_2 будутъ его предѣльными точки. Между точками A_1 и A_2 нѣтъ центровъ сферъ, принадлежащихъ пучку.

образуют прежде всего сферы, проходящая через одну точку,—частный случай, с которым мы уже познакомились выше под названием „параболической сѣти“; ея степень равна нулю. Сѣти, степени которых отличны от нуля, называются гиперболическими или эллиптическими, смотря по тому, имѣет ли соответствующая степень положительное значение ($+p^2$) или отрицательное ($-p^2$). Сфера, имѣющая центръ въ радикальномъ центрѣ O гиперболической сѣти и радиусъ p , пересѣкает ортогонально всѣ сферы сѣти, но сама ей не принадлежитъ. Въ эллиптической же сѣти эта сфера разсѣкается всѣми сферами диаметрально и представляетъ собой особенную сферу сѣти, которая при построенияхъ часто бываетъ очень полезной. Прямая, проходящая черезъ точку O , встрѣчаетъ каждую сферу сѣти, которую она пересѣкаетъ, въ двухъ точкахъ, взаимно обратныхъ при инверсии, центромъ которой служитъ точка O , а степенью — степень сѣти³⁴). Каждая сфера сѣти при этой „инверсии сѣти“ переходитъ въ себя самое³⁵). Если двѣ сферы сѣти пересѣкаются, то окружность сѣченія, плоскость которой, конечно, проходитъ черезъ точку O , обратна самой сѣбѣ; такую окружность называютъ „окружностью сѣти“, а двѣ взаимно обратныя точки называютъ короче „парой точекъ сѣти“³⁶). Черезъ двѣ пары точекъ сѣти всегда проходитъ одна и только одна окружность сѣти, черезъ три пары — одна и только одна сфера³⁷). Относительно двухъ сѣтей

³⁴) Это основное свойство сѣти вытекаетъ изъ того, что степень точки O относительно сферы равна произведенію изъ любой сѣкущей на ея внѣшнюю часть въ гиперболической сѣти и произведенію отрезковъ хорды въ эллиптической сѣти. Нужно имѣть въ виду, что въ гиперболической сѣти предполагается гиперболическая инверсія, а въ эллиптической — эллиптическая.

³⁵) Согласно предыдущему замѣчанію, двѣ точки M и M' , въ которыхъ прямая $ММ'$, проходящая черезъ центръ сѣти O , встрѣчаетъ сферу этой сѣти, взаимно обратны при инверсии сѣти. Иными словами, эта инверсія замѣщаетъ точки M и M' другъ другомъ, и сфера переходитъ въ себя самое (см. предл. 6 въ § 8).

³⁶) Если сфера проходитъ черезъ двѣ точки A и A' , взаимно обратныя относительно точки O при степени инверсии $\pm p^2$, то степень точки O относительно этой сферы есть $\pm p^2$. Иными словами, сфера принадлежитъ сѣти, имѣющей центръ въ точкѣ O и степень $\pm p^2$.

³⁷) Пусть A и A' , B и B' будутъ двѣ пары точекъ сѣти, такъ что

$$OA' \cdot OA = OB' \cdot OB = \pm p^2.$$

Тогда окружность, проходящая черезъ точки A , A' и B , въ виду предыдущаго соотношенія проходитъ также черезъ точку B' . Если точки A , A' и B лежатъ на одной прямой, то на той же прямой въ силу инверсии лежитъ и точка B' ; эта прямая и представляетъ собой въ этомъ случаѣ окружность сѣти, проходящую черезъ двѣ пары точекъ (см. прим. 30).

Если теперь A и A' , B и B' , C и C' , суть три пары точекъ сѣти, не лежащихъ на одной окружности сѣти, то мы проведемъ окружность, опредѣляемую двумя парами точекъ A и A' , B и B' , и сферу, проходящую черезъ эту окружность и точку C ; эта сфера проходитъ также черезъ точку C' ; это есть сфера сѣти, опредѣляемая двумя парами точекъ.

(O_1) и (O_2) можно построить точки P_1 и P_2 , обратныя любой данной точкѣ P . Всѣ сферы, проходящія черезъ точки P , P_1 и P_2 , принадлежатъ какъ одной, такъ и другой сѣти и имѣютъ прямую O_1O_2 общей радикальной осью³⁸⁾; мы получаемъ такимъ образомъ безчисленное множество пучковъ, принадлежащихъ сѣтямъ (O_1) и (O_2), которые въ совокупности образуютъ связку съ общей радикальной осью O_1O_2 . Нѣтъ возможности исчерпать обширный матеріалъ, который отсюда легко разматывается, и мы вынуждены указать на спеціальныя сочиненія³⁹⁾. Для нашего изслѣдованія объ основаніяхъ геометріи изложеннаго вполне достаточно.

§ 10. Частичное осуществленіе Евклидовой геометріи въ сѣти сферъ. Двѣ неевклидовы геометріи.

1. Если осуществленіе Евклидовой геометріи въ параболической сѣти все еще можетъ поддерживать убѣжденіе, что „точка“ есть нѣчто недѣлимое, то мы располагаемъ теперь средствомъ построить геометрическія системы, въ которыхъ „точками“ служатъ то сферы, то окружности, то пары взаимно обратныхъ точекъ гиперболической или эллиптической сѣти.

А) Если мы подѣ „псевдо-точками“ будемъ разумѣть сферы сѣти (O), подѣ „псевдо-прямыми“ пучки этой сѣти, подѣ „псевдо-плоскостями“ ея связки, то мы можемъ высказать относительно этихъ образовъ всѣ положенія I группы Гильбертовыхъ аксіомъ, съ которыми мы познакомились въ § 8. Въ частности, имѣетъ мѣсто слѣдующее предложеніе.

Двѣ псевдо-точки всегда опредѣляютъ псевдо-прямую; три псевдо-точки, не лежащія на одной псевдо-прямой, всегда опредѣляютъ псевдо-плоскость.

Въ самомъ дѣлѣ, двѣ сферы сѣти опредѣляютъ пучекъ; три сферы, о которыхъ идетъ рѣчь, опредѣляютъ связку, всѣ сферы которой принадлежатъ сѣти⁴⁰⁾. Можно было бы также распространить на „точки“ нашихъ псевдо-прямыхъ вторую группу Гильбертовыхъ аксіомъ, характе-

³⁸⁾ Такъ какъ каждая такая сфера проходитъ черезъ точки P и P_1 , то она принадлежитъ сѣти (O_1) (см. прим. 36); такъ какъ она проходитъ черезъ точки P и P_2 , то она принадлежитъ сѣти (O_2). Такимъ образомъ, какъ точка O_1 , такъ и точка O_2 имѣетъ каждая одну и ту же степень относительно всѣхъ сферъ, проходящихъ черезъ точки P , P_1 , P_2 . Поэтому O_1O_2 есть общія радикальная ось этихъ сферъ.

³⁹⁾ Лучше всего изучить геометрію сѣти сферъ конструктивнымъ методомъ, т. е. рѣшеніемъ многихъ задачъ. Мы можемъ указать задачникъ Милновскаго (Milnowski, II Th.), въ которомъ свойства сѣти подробно разработаны. Изячное изложеніе сферической геометріи, выполненное элементарными средствами, можно найти въ книгѣ Райэ: Th. Reye, „Synthetische Geometrie der Kugel“. Leipzig, 1879.

⁴⁰⁾ Если мы возьмемъ двѣ сферы сѣти, то совокупность сферъ, имѣющихъ съ ними общую радикальную плоскость, образуетъ пучекъ сферъ, принадлежащій сѣти. Три сферы сѣти, не принадлежащія одному пучку, имѣютъ общую радикальную ось; совокупность сферъ, имѣющихъ ту же радикальную ось, образуетъ связку, принадлежащую сѣти.

ризующихъ понятіе „между“, въ той модификаціи, впрочемъ, которую устанавливаетъ Пашъ (I. с. § 1, 18), вводя понятіе о „выключенной“ точкѣ; здѣсь рѣчь идетъ собственно о томъ, чтобы установить значеніе выраженія: двѣ пары точекъ „раздѣляютъ“ или „не раздѣляютъ“ другъ друга. Къ этому мы возвратимся ниже.

В) Другое осуществленіе I и II группъ Гильбертовыхъ аксіомъ (въ указанной выше модификаціи), болѣе доступное конструктивной обработкѣ въ чертежѣ, основывается на томъ, что мы принимаемъ за „псевдо-точку“, „псевдо-прямая“ и „псевдо-плоскости“ окружности, пучки и связки окружностей на нѣкоторой плоскости η . Посредствомъ инверсіи можно превратить плоскость η въ сферу и такимъ образомъ перенести „псевдо-пространство“ нашей псевдо-геометріи на сферу. Двѣ различныя псевдо-точки всегда опредѣляютъ псевдо-прямую; псевдо-точки, не расположенныя на одной псевдо-прямой, всегда опредѣляютъ псевдо-плоскость. Было бы очень полезно и поучительно проверить всѣ предложенія I Гильбертовой группы и ея слѣдствія помощью соответствующихъ построеній. Чтобы, по крайней мѣрѣ, указать всю плодотворность такого рода аналогіи, мы выведемъ предложеніе, которое соответствуетъ здѣсь теоремѣ Дезарга.

Предложеніе Дезарга рассматриваетъ два треугольника $A_1B_1C_1$ и $A_2B_2C_2$ въ двухъ пересѣкающихся плоскостяхъ η_1 и η_2 , расположенные такимъ образомъ, что прямая A_1B_1 и A_2B_2 , B_1C_1 и B_2C_2 , A_1C_1 и A_2C_2 пересѣкаются соответственно въ трехъ точкахъ X , Y , Z , лежащихъ на пересѣченіи S плоскостей η_1 и η_2 . Въ такомъ случаѣ эти три пары прямыхъ опредѣляютъ три плоскости, пересѣкающіяся въ нѣкоторой точкѣ S ; такимъ образомъ, прямыя A_1A_2 , B_1B_2 , C_1C_2 , соединяющія соответственныя вершины треугольниковъ, проходятъ черезъ одну точку S . Если мы теперь возьмемъ еще одинъ треугольникъ A'_1 , A'_2 , A'_3 въ той же плоскости η_1 , стороны котораго проходятъ соответственно черезъ точки X , Y , Z , то прямыя A'_1A_2 , B'_1B_2 , C'_1C_2 также проходятъ черезъ одну точку S . Вместе съ тѣмъ плоскости $A_1A'_1A_2$, $B_1B'_1B_2$, $C_1C'_1C_2$ содержатъ прямыя A_1A_2 и A'_1A_2 , B_1B_2 и B'_1B_2 , C_1C_2 и C'_1C_2 , а потому онѣ содержатъ также точки S и S' ; слѣдовательно, эти три плоскости образуютъ пучекъ съ осью SS' . Этотъ пучекъ пересѣкается плоскостью η_1 по прямой $A_1A'_1$, $B_1B'_1$, $C_1C'_1$, проходящимъ черезъ точку Σ , въ которой прямая SS' пересѣкаетъ плоскость η_1 . Теорема Дезарга, такимъ образомъ, гласитъ:

Если два треугольника $A_1B_1C_1$ и $A_2B_2C_2$ расположены въ одной или въ различныхъ плоскостяхъ такимъ образомъ, что соответственныя стороны A_1B_1 и A_2B_2 , B_1C_1 и B_2C_2 , C_1A_1 и C_2A_2 пересѣкаются въ трехъ точкахъ, расположенныхъ на одной прямой s , то вершины A_1 и A_2 , B_1 и B_2 , C_1 и C_2 расположены на трехъ прямыхъ, проходящихъ черезъ одну точку S .

Это предложение остается также в силе в псевдо-геометриях А) и В). Так, например, на обычном языке геометрии кругов это предложение в системѣ В) гласитъ:

Возьмемъ вѣ одной плоскости 6 окружностей $A_1, B_1, C_1, A_2, B_2, C_2$, изъ которыхъ какъ первыя три, такъ и вторыя три не принадлежатъ одному пучку; положимъ далѣе, что пучки, опредѣляемые окружностями

$$\begin{array}{l} B_1 \text{ и } C_1, B_2 \text{ и } C_2 \text{ имѣютъ общую окружность } X, \\ C_1 \text{ и } A_1, C_2 \text{ и } A_2 \text{ " " " } Y, \\ A_1 \text{ и } B_1, A_2 \text{ и } B_2 \text{ " " " } Z; \end{array}$$

если связки, опредѣляемые окружностями A_1, B_1, C_1 и A_2, B_2, C_2 совпадаютъ, а три окружности X, Y, Z принадлежатъ одному пучку, то три пучка $(A_1, A_2), (B_1, B_2), (C_1, C_2)$ имѣютъ общую окружность S .

Если связки (A_1, B_1, C_1) и (A_2, B_2, C_2) различны, то окружности X, Y, Z также принадлежатъ одному пучку. Эта теорема легко допускаетъ обращеніе. Кто знакомъ съ проективной геометрией, тотъ легко усмотритъ, что теорема о совершенномъ четырехугольнике также справедлива вѣ нашей геометрии В), и это приводитъ къ опредѣленію гармоническаго расположенія четырехъ псевдо-точекъ на псевдо-прямой; это, вѣ свою очередь, даетъ непосредственно понятіе о проективной зависимости двухъ псевдо-прямыхъ, и мы можемъ, такимъ образомъ, построить образъ, аналогичный кривымъ второго порядка. Однако, здѣсь еще мы не предполагаемъ знакомства съ проективной геометрией, и потому не станемъ останавливаться на дальнѣйшемъ развитіи этихъ фактовъ.

2. Гораздо подробнѣе мы разовьемъ другое осуществленіе двухъ группъ Гильбертовыхъ аксіомъ I и II (см. § 8), которое такъ же, какъ система А), разматывается вѣ гиперболической или эллиптической сѣти сфера. Пусть O будетъ радикальный центръ, $+r^2$ или $-r^2$ степень сѣти. Будемъ теперь разумѣть подѣ „псевдо-точкой“ пару точекъ вѣ инверсии сѣти, подѣ „псевдо-прямой“ окружность сѣти, подѣ „псевдо-плоскостью“ сферу этой сѣти; вѣ такомъ случаѣ и здѣсь черезъ двѣ псевдо-точки всегда проходитъ псевдо-прямая и при томъ только одна; черезъ три псевдо-точки, опредѣляющія три различныя псевдо-прямыя, проходитъ одна и только одна псевдо-плоскость, при чемъ послѣдняя содержитъ упомянутыя три псевдо-прямыя. Вѣ самомъ дѣлѣ, двѣ пары точекъ, соответствующія двумъ псевдо-точкамъ, опредѣляютъ окружность, которая устанавливается уже собственно тремя изъ этихъ четырехъ точекъ и проходитъ черезъ четвертую точку. Три псевдо-точки содержатъ шесть точекъ, которыхъ собственно, было бы, слишкомъ много для опредѣленія сферы; но вѣ силу теоремы объ отрѣзкахъ сѣкущей, сфера, проходящая черезъ четыре изъ этихъ точекъ, необходимо должна также пройти черезъ осталь-

няя двѣ ⁴⁰⁾. Теперь легко видѣть, что въ нашей псевдо-геометріи имѣютъ мѣсто аксіомы I Гильбертовой группы.

Въ этой псевдо-геометріи имѣется только одна связка псевдо-прямыхъ, которая въ то же время представляетъ собой связку прямыхъ и въ обычномъ смыслѣ слова; это совокупность прямыхъ, проходящихъ черезъ радикальный центръ O ⁴¹⁾. Съ другой стороны, каждая „дѣйствительная“, а слѣдовательно и псевдо-прямая, проходящая черезъ точку O , пересѣкаетъ каждую окружность и каждую сферу сѣти, которая она встрѣчаетъ, въ парѣ взаимно обратныхъ точекъ, т. е. пересѣкаетъ каждую псевдо-прямую и псевдо-плоскость въ одной псевдо-точкѣ; поэтому на псевдо-плоскости и на псевдо-прямой остаются въ силѣ всѣ свойства, которая высказываются относительно понятія „между“ въ дѣйствительной связкѣ прямыхъ. Такъ, напримѣръ, изъ четырехъ лучей связки a, b, c, d , расположенныхъ въ одной плоскости, всегда два и только два раздѣляютъ два другихъ,— скажемъ, a, b и c, d ,— между тѣмъ какъ при другомъ распредѣленіи двѣ пары лучей другъ друга не раздѣляютъ; точно такъ же четыре псевдо-точки на псевдо-прямой однимъ и только однимъ способомъ разбиваются на двѣ пары, раздѣляющія другъ друга ⁴²⁾. Другія предложенія этого рода приведены у Паша (I. с. § 1, 18). Такимъ образомъ, вторая группа Гильбертовыхъ аксіомъ остается въ силѣ въ нашей геометріи въ той модифи-

⁴⁰⁾ См. примѣчаніе 37.

⁴¹⁾ Что плоскости и прямая, проходящая черезъ точку O , могутъ быть разсматриваемы, какъ сферы и окружности бесконечно большого радіуса, — это ясно, такъ какъ на это неоднократно уже указывалось. Ясно также, что въ параболической сѣти онѣ входятъ въ составъ послѣдней, такъ какъ точка O и относительно нихъ имѣетъ степень 0. Можетъ показаться страннымъ, что онѣ входятъ въ составъ сѣти, когда $r \neq 0$, такъ какъ эти плоскости и прямая и въ этомъ случаѣ, какъ сферы и окружности бесконечно большого радіуса, повидимому, сообщаютъ точкѣ O степень 0. Но возьмемъ, скажемъ, въ эллиптической сѣти, нѣкоторую плоскость, проходящую черезъ центръ сѣти O ; эта плоскость служитъ радикальной плоскостью пучка, входящаго въ составъ сѣти; всѣ сферы этого пучка въ эллиптической сѣти пересѣкаются по одной окружности (п. 6 § 9), плоскость которой и есть наша радикальная плоскость. Центры сферъ этого пучка лежатъ на прямой, перпендикулярной къ нашей плоскости въ центрѣ общей окружности. Когда радіусъ сферы пучка неограниченно возрастаетъ, послѣднія приближаются къ радикальной плоскости, которая входитъ такимъ образомъ въ составъ сѣти, какъ предѣльная сфера этого пучка. Когда радіусъ сферы возрастаетъ, то степень точки O относительно нея все время остается равной r^2 . Точка O дѣлитъ хорду сферы на два отрѣзка, изъ которыхъ одинъ можетъ неограниченно убывать, другой же возрастаетъ такъ, что ихъ произведение будетъ равно r^2 . Разсматривая поэтому нашу плоскость, какъ предѣльную сферу пучка, мы сообщаемъ точкѣ O и относительно нея степень r^2 .

⁴²⁾ Т. е. мы будемъ принимать, что двѣ пары псевдо-точекъ раздѣляютъ другъ друга, если соответствующіе лучи попарно другъ друга раздѣляютъ; этимъ опредѣляется расположеніе псевдо-точекъ на псевдо-прямой въ согласіи съ Гильбертовыми аксіомами расположенія (въ проективномъ пространствѣ).

кации, которую мы уже указывали въ пунктѣ I и которую разовьемъ подробнѣе въ главѣ III.

3. Чтобы теперь занять также определенную позицію относительно аксіомы о параллельности, мы должны различать два типа сферическихъ сѣтей, имѣющихъ степень, отличную отъ нуля. Въ эллиптической сѣти всѣ окружности и всѣ сферы содержатъ радикальный центръ внутри себя; поэтому всѣ сферы, а также всѣ окружности на одной и той же сферѣ необходимо пересѣкаются. Переносъ это на соответствующее „эллиптическое пространство“⁴³⁾, мы получимъ: всякія двѣ псевдо-плоскости въ эллиптическомъ пространствѣ всегда имѣютъ общую псевдо-прямую; любыя двѣ псевдо-прямыя на одной псевдо-плоскости имѣютъ общую псевдо-точку. Такимъ образомъ, въ эллиптической геометріи аксіома о параллельности не имѣетъ мѣста: двѣ прямыя въ одной плоскости всегда встрѣчаются.

Напротивъ, въ гиперболической сѣти всегда имѣется безчисленное множество сферъ, которыя не встрѣчаютъ данной сферы. Здѣсь можно, не впадая въ противорѣчіе, развить систему выраженія такого рода, что двѣ не пересѣкающіяся сферы имѣютъ мнимую окружность пересѣченія. Гиперболическій пучекъ сферъ (происходящій путемъ вращенія гиперболическаго пучка окружностей вокругъ линіи центровъ) можно тогда разсмагивать, какъ совокупность сферъ, имѣющихъ общую мнимую окружность, которая „лежитъ“ въ радикальной плоскости пучка. Каждая прямая, проходящая черезъ точку O въ этой плоскости, „встрѣчаетъ“ мнимую окружность въ двухъ взаимно обратныхъ мнимыхъ точкахъ. Эта пара точекъ въ совокупности образуетъ „идеальную“ точку пересѣченія; мнимой окружности соответствуетъ, такимъ образомъ, „идеальная“ прямая.

Итакъ, двѣ не пересѣкающіяся псевдо-плоскости имѣютъ „идеальную“ прямую пересѣченія: мы получаемъ, такимъ образомъ, пучки и связки псевдо-плоскостей съ идеальной общей псевдо-прямой или соответственно съ идеальной общей псевдо-точкой. Онѣ, очевидно, составляютъ аналогію съ несобственными точками и прямыми въ натуральной геометріи⁴⁴⁾.


Промежуточное мѣсто между этими двумя случаями, когда сферы и окружности гиперболической сѣти пересѣкаются, и когда онѣ не пересѣкаются, занимаетъ третій случай, когда онѣ соприкасаются. Такъ какъ точка соприкосновенія должна быть обратной самой себѣ, то она необходимо должна быть расположена на ортогональной сферѣ ω этой сѣти. Каждая окружность сѣти встрѣчаетъ сферу ω въ двухъ точкахъ A и B . Если P

⁴³⁾ Т. е. пространство, которое представляетъ эллиптическая сѣть, если „псевдо-точка“, „псевдо-прямая“ и „псевдо-плоскости“ имѣютъ установленныя выше значенія.

⁴⁴⁾ Какъ уже было указано въ своемъ мѣстѣ, объ идеальныхъ образахъ будетъ рѣчь въ особомъ дополненіи.

есть произвольная точка, а P' обратная ей точка, то окружности, проходящая через точки A, P, P' и B, P, P' , будут касаться каждая данной окружности соответственно в точках A или B ; вообще, все окружности, проходящие через точку ортогональной сферы, соприкасаются в этой точке⁴⁸⁾). Если мы хотим теперь в нашей гиперболической псевдо-геометрии иметь нечто подобное параллелизму, то нужно определить „пространство“ этой геометрии, как то, что мы получаем, если мы из обыкновенного пространства геометрии сферу устраним ортогональную сферу ω . В остающемся таким образом гиперболическом пространстве имеем место предложение, что к псевдо-прямой AB через псевдо-точку P всегда проходят две псевдо-параллели. Чтобы изобразить это наглядно на рисунке, припомним, что плоскости, проходящие через точку O , принадлежат сфер в качестве предельных сфер и в таком смысле тоже могут считаться псевдо-плоскостями. В такого рода псевдо-плоскости мы выберем псевдо-прямую g и через точку P проведем параллели PA и PB . Сечение псевдо-плоскости с ортогональной сферой обозначим через κ (См. фиг. 30).

Две параллели образуют в точке P четыре угла; один из них содержит псевдо-прямую g , мы его обозначим через γ ; это так называемый угол параллельности, играющий важную роль в геометрии Болье и Лобачевского. В двух углах q, q , смежных с γ , проходят те псевдо-прямые, которые встречаются с прямой g в идеальных точках, между тем как внутри угла параллельности γ проходят те псевдо-прямые, которые действительно встречаются с псевдо-прямой g . Соединяя, таким образом, все сказанное, мы приходим к следующему выводу: в гиперболической геометрии аксиома о параллельности также не имеет места: напротив,



Фиг. 30.

к данной прямой всегда можно провести две параллели, которые определяют два вертикальных угла q, q таким образом, что все прямые, проходящие внутри этих углов, вовсе не имеют действительных точек пересечения с данной прямой⁴⁹⁾).

⁴⁸⁾ Они будут иметь общей касательной проходящей через эту точку радиус ортогональной сферы.

⁴⁹⁾ Строго говоря, все эти прямые можно было бы считать параллельными данной прямой; но (асимптотическая) параллели PA и PB имеют больше сходства с Евклидовыми параллелями.

4. Мы имѣемъ, такимъ образомъ, двѣ геометріи; въ каждой изъ нихъ черезъ двѣ точки всегда проходить одна и только одна прямая, черезъ три точки, опредѣляющія три различныя прямыя, всегда проходить одна и только одна плоскость; вообще, всѣ предложенія Евклидовой геометріи, которыя относятся къ пересѣченію прямыхъ и плоскостей, справедливы въ обѣихъ этихъ геометріяхъ, за исключеніемъ только аксіомы о параллельности. Это приводитъ, такимъ образомъ, къ безупречному и совершенно наглядному доказательству того, что попытки доказать аксіому о параллельности или, какъ было бы правильнѣе ее назвать, пятый постулатъ Евклида, попытки вывести это предложеніе изъ остальныхъ посылокъ, не прекращавшіяся въ теченіе двухъ тысячелѣтій, необходимо должны были потерпѣть крушеніе. Аксіома о параллельности не представляетъ собой логическаго слѣдствія изъ остальныхъ основныхъ положеній геометріи. Мы можемъ даже сказать: Еслибы двѣ геометріи, въ которыхъ аксіома о параллельности не имѣетъ мѣста, когда-либо привели къ противорѣчіямъ, то и Евклидова геометрія необходимо содержала бы противорѣчія; въ самомъ дѣлѣ, было бы достаточно перевести эти противорѣчія неевклидовой геометріи на языкъ обыкновенной геометріи сферъ въ Евклидовомъ пространствѣ, и мы получили бы здѣсь противорѣчія. Что же касается того, что Евклидова геометрія опирается на посылки, не содержащія никакого противорѣчія, то это мы будемъ имѣть возможность обнаружить въ одномъ изъ слѣдующихъ параграфовъ. Однако, это относится, конечно, только къ идеальной геометрической системѣ.

Изъ независимости аксіомы о параллельности, съ одной стороны, и изъ недопустимости понятія о параллельности въ натуральной геометріи, съ другой стороны, слѣдуетъ, что средствами натуральной геометріи вопросъ о трехъ возможныхъ допущеніяхъ въ теоріи параллельности никогда не можетъ быть рѣшенъ въ пользу какого-либо одного изъ нихъ. Фактически и Пашъ въ своихъ „лекціяхъ“, о которыхъ мы неоднократно упоминали, вынужденъ былъ оставить этотъ вопросъ открытымъ; въ небольшой области, въ предѣлахъ которой остаются плоскости и прямыя, доступныя нашему наблюденію, можно очень хорошо описать всѣ факты натуральной геометріи независимо отъ того, проходятъ ли черезъ данную точку двѣ параллели къ данной прямой, одна или ни одной. Можно даже сказать болѣе: эмпирически никогда не будетъ возможно рѣшить, представляетъ ли собой то, что мы называемъ прямыми и плоскостями, „дѣйствительныя“ прямыя и плоскости или псевдо-прямыя и псевдо-плоскости сферической сѣти съ чрезвычайно большою степенью. Если бы, напримѣръ, солнце было радикальнымъ центромъ, а ортогональная или соотвѣтственно діаметральная сфера была бы столь велика, что всѣ планеты были бы расположены внутри ея, то псевдо-плоскости и псевдо-прямая, т. е. сферы и окружности

сѣти въ предѣлахъ нашей земли такъ мало отличались бы отъ прямыхъ и плоскостей натуральной геометріи, что этого различія невозможно было бы обнаружить. Если мы себѣ представимъ касательную къ одной изъ этихъ окружностей, то она на протяженіи 11 километровъ отъ точки касанія была бы удалена отъ окружности всего на 0,001 миллиметра. Различіе между обѣими линіями существовало бы только въ нашемъ воображеніи, эмпирически установить его было бы невозможно.


Можно было бы указать еще многочисленныя другія системы, осуществляющія три геометріи, которыя отличаются одна отъ другой только аксіомой о параллельности, а въ области, доступной нашему эмпирическому изслѣдованію, вполнѣ совпадаютъ съ натуральной геометрией: но элементарныхъ средствъ, которыми мы располагаемъ, для этого недостаточно.

Мы должны еще указать названія, присвоенныя этимъ тремъ геометріямъ. Геометрія, въ которой имѣетъ мѣсто аксіома о параллельности, называется евклидовой или параболической. Именно поэтому мы назвали связку сферъ съ нулевой степенью, вполнѣ осуществляющую эту геометрію, также параболической. Двѣ другія геометріи называются *κατ' ἐξοχήν* неевклидовыми. Строго говоря, подъ этимъ названіемъ слѣдовало бы разумѣть всякую геометрію, посылки которой не вполнѣ совпадаютъ съ Евклидовыми. Та неевклидова геометрія, въ которой параллелизма вовсе нѣтъ, которая иллюстрируется эллиптической сѣтью сферъ, называется эллиптической геометрией, а вторая гиперболической; послѣдняя осуществляется въ гиперболической сѣти сферъ. Гиперболическую геометрію открыли Больэ и Лобачевскій, эллиптическая была позже открыта Риманомъ. Характерное различіе этихъ трехъ геометрій можетъ быть также выражено слѣдующимъ образомъ:

Въ параболической геометріи сумма угловъ въ треугольникѣ равна двумъ прямымъ, въ эллиптической она больше двухъ прямыхъ, въ гиперболической она меньше двухъ прямыхъ, при чемъ въ послѣднихъ двухъ случаяхъ она не имѣетъ постояннаго значенія.


Чтобы обнаружить это также въ обоихъ типахъ сферическихъ сѣтей, мы будемъ измѣрять углы между псевдо-прямыми, т. е. углы, которые окружности образуютъ въ точкѣ пересѣченія, углами между соответствующими касательными. Однако, здѣсь, нѣсколько иначе, чѣмъ въ § 9, 3 мы будемъ подъ угломъ A въ треугольникѣ ABC разумѣть тотъ изъ четырехъ угловъ при вершинѣ A , внутри котораго расположена сторона BC . Если мы возьмемъ теперь въ гиперболической сѣти для удобства псевдоплоскость, проходящую черезъ радикальный центръ (см. фиг. 30), то каждый треугольникъ, вершины котораго A, B, C лежатъ на окружности ω , обладаетъ той особенностью, что три прямыя образуютъ другъ съ другомъ во всѣхъ трехъ точкахъ A, B и C углы, равные нулю. Сумма угловъ такого треугольника, такимъ образомъ, также равна нулю. Стороны

его, согласно предыдущим определениям, попарно параллельны. Что в других треугольниках в этой геометрии сумма углов всегда меньше $2d$, этого нельзя доказать без довольно сложных тригонометрических вычислений. Возможность треугольников с нулевыми углами была уже



Фиг. 31.

известна творцам неевклидовой геометрии; противники же их оспаривали это, как нечто, совершенно противоречащее очевидности. Если, однако, мы представим себе, как было



Фиг. 32.

указано выше, ортогональную сферу настолько большой, что в ней заключены все планеты, то в наших псевдоплоскостях в областях, доступных нашему созерцанию, не могут быть расположены отрезки, принадлежащие всем трем сторонам такого треугольника; никакого противоречия с опытом мы бы не имѣли. Отсутствие наглядного воплощения неевклидовой геометрии служило большим препятствием для ее уяснения. Реализация элементарной геометрии на поверхностях постоянной отрицательной кривизны недостаточно элементарна и не может быть доказана без помощи высшей математики. Риманъ указалъ, что эллиптическая геометрия плоскости осуществляется на сферах, если две ее полярные точки принимать за одну „точку“. Однако, авторы не указывали достаточно определенно, что при этом осуществлении эллиптической геометрии под „точкой“ необходимо разумѣть совокупность двух различных обыкновенных точек; это привело къ целому ряду недоразумѣній, сводившихся, главным образом, къ тому, что геометрию Римана не признавали тождественной съ геометрией сферы. Правильно понимая это осуществление эллиптической „плоскости“ на сферах, мы без труда узнаемъ въ ней нашу псевдоплоскость эллиптической сѣти: Риманова сфера есть диаметральная сфера сѣти; две полярные ея точки взаимно обратны и потому дѣйствительно образуютъ одну псевдо-точку. Поэтому не было, собственно, необходимости присваивать такую исключительную роль двумъ конечнымъ точкамъ диаметра. За псевдоточку можно было бы также принять две конечныя точки каждой хорды, проходящей через постоянную точку, расположенную внутри сферы. Если мы возьмемъ точку O внѣ сферы, то мы получимъ гиперболическую плоскость *).

*) Этотъ именно путь привелъ автора пять лѣтъ тому назадъ къ осуществлению неевклидовой геометрии въ сферической сѣти (Вступительная лекція въ лѣтнемъ

Въ заключеніе мы хотѣли бы показать, по крайней мѣрѣ, на одной фигурѣ (см. фиг. 31), что въ эллиптической геометріи сумма угловъ въ треугольникѣ больше $2d$; общее доказательство этого предложенія требуетъ сложныхъ тригонометрическихъ выкладокъ. Псевдодоплоскостью служитъ плоскость чертежа, проходящая черезъ радикальный центръ O ; k есть сѣченіе діаметральной сферы; нарисованный здѣсь треугольникъ, очевидно, имѣетъ три тупыхъ угла *).

§ 11. Метрика двухъ неевклидовыхъ геометрій.

1. Какъ мы видѣли, геометрія сѣти сферъ, степень которой отлична отъ нуля, какъ и Евклидова, удовлетворяетъ I группѣ Гильбертовыхъ аксіомъ, а также и II группѣ съ небольшою проективной модификаціей, о которой будетъ рѣчь ниже. Чтобы теперь дополнить доказательство, что геометрія сферической сѣти отличается отъ Евклидовой только аксіомой о параллельности и простицающимися изъ нея логическими выводами, намъ остается еще обнаружить, что III и V группы Гильбертовыхъ аксіомъ здѣсь остаются въ силѣ. Но существу дѣло здѣсь сводится къ аксіомамъ о конгруэнтности, на которыхъ основывается измѣреніе геометрическихъ образовъ и связанныя съ этимъ соотношенія --- „метрика“. Лишь въ томъ случаѣ, если двѣ неевклидовы геометріи дѣйствительно въ этихъ предѣлахъ не отличаются отъ Евклидовой, мы можемъ утверждать, что онѣ характеризуются суммой угловъ въ треугольникѣ. Напротивъ, если мы устранимъ въ Евклидовой геометріи, напримѣръ, Архимедову аксіому (Гильбертъ, I. с. § 8, V) то можно построить геометрію, въ которой сумма угловъ треугольника постоянно равна $2d$, между тѣмъ какъ аксіома о параллельности не имѣетъ мѣста **). Однако, мы не будемъ выводить теоремъ, касающихся конгруэнтности съ точки зрѣнія двухъ неевклидовыхъ геометрій, изъ аксіомъ конгруэнтности, потому что Гильбертовы доказательства этихъ теоремъ составлены такимъ образомъ, что они не опираются на теорему о параллельности и потому сохраняютъ свою силу не только въ параболической геометріи, но также въ эллиптической и гиперболической.

— — —
 семестрѣ 1898 г. въ Страсбургѣ, въ которой была также развита и метрика этой системы).

*) Извѣстные доказательства предложенія, что сумма угловъ въ треугольникѣ не можетъ быть больше двухъ прямыхъ, основываются на неявномъ допущеніи, что прямая имѣетъ безконечную длину, или что она раздѣляетъ плоскость на двѣ отдѣльныя части. Ни то ни другое, однако, въ эллиптической геометріи не имѣетъ мѣста. Поэтому въ эллиптической плоскости и выраженіе аксіомы о параллельности *iq' á míou' ióir* (съ той стороны, съ которой . . .) теряетъ смыслъ, такъ какъ прямая не дѣлитъ этой плоскости на двѣ стороны.

**) Ср. M. Dehn, Die Legendreschen Sätze über die Winkelsumme im Dreieck. Math. Ann. 53.

Вообще, привлекательность, которую представляет необычное осуществление той или иной геометрии, заключается не в том, что мы смотрим на нее с точки зрения этой именно геометрической системы, а в том, что мы ее созерцаем с точки зрения другой геометрии. Например, гиперболическая геометрия, осуществленная в гиперболической сфери, как таковая, не отличается ни одним предложением от любого другого осуществления той же геометрии; но ее предложения тотчас приобретают величайший интерес, если мы вновь переводим их на язык Евклидовой геометрии. Сравните, например, теорему Дезарга с ее оригинальным переводом, приведенным в § 10, 1. Обратное, иногда может быть также интересно рассмотреть систему геометрических образов с точки зрения той или иной неевклидовой геометрии. Так, например, в дисциплине, лежащей, на первый взгляд далеко от геометрии, в современной теории функций, именно в теории автоморфных функций, оказывается полезным исследовать в комплексной числовой плоскости некоторые криволинейные многоугольники, сторонами которых служат дуги окружностей, ортогональных к некоторой окружности k ; обращения этих многоугольников относительно сторон, как кругов инверсии, называют „отражениями“ их. Стороны многоугольника, очевидно, принадлежат связке окружностей, ортогональной окружностью которой служит k . Наименьшая сфера O , проходящая через окружность k , представляет собою в таком случае также ортогональную сферу гиперболической сфери, которой принадлежит также числовая плоскость вместе с лежащей в ней связкой. Наши криволинейные многоугольники с точки зрения гиперболической геометрии, осуществляемой сферой O , оказываются прямолинейными многоугольниками⁴⁶⁾, и что особенно изящно, так называемые отражения плоскости от сторон многоугольника, как мы сейчас увидим, обращаются в действительные отражения, т. е. представляют собой отображения плоскости в самой себя при помощи симметрии относительно оси. Здесь, таким образом, действительно оказывается целесообразным предпочесть Евклидовым пространственным представлениям точку зрения гиперболической геометрии, которая в этом случае дает наиболее простое, наиболее целесообразное выражение фактов.

2. Относительно инверсии сфери сфера имеет место следующее основное предложение:

1. Сфера сфер при гиперболической инверсии относительно одной из всегда переходит в себя самое.

⁴⁶⁾ Потому что дуги, из которых составлены эти многоугольники, с точки зрения гиперболической геометрии суть прямолинейные отрезки.

Въ самомъ дѣлѣ, гиперболическая сѣть состоитъ изъ всѣхъ сферъ, пересѣкающихся ортогонально нѣкоторую сферу k . Если λ есть одна изъ сферъ этой сѣти, то ея центръ I , имѣетъ относительно сферы k степень $+P^2$, гдѣ I есть радиусъ сферы λ . Поэтому каждая прямая, которая проходитъ черезъ точку L и встрѣчаетъ сферу k , пересѣкаетъ ее въ двухъ точкахъ A и A' такимъ образомъ, что $LA \cdot LA' = I^2$; иными словами, инверсія относительно сферы λ преобразовываетъ сферу k въ себя самое⁴⁷⁾. Такъ какъ, съ другой стороны, инверсія не мѣняетъ угла, подъ которымъ пересѣкаются двѣ сферы, то всѣ сферы ортогональныя относительно сферы k , вновь переходятъ въ сферы того же типа. Иными словами, инверсія относительно сферы λ перетасовываетъ только сферы этой сѣти между собой, самая сѣть, какъ цѣлое, преобразовывается изъ себя самое.

Если κ есть сфера эллиптической сѣти, и намъ нужно произнести относительно нея гиперболическую (не эллиптическую) инверсію, то нужно только обратить вниманіе на то, что сфера κ пересѣкаетъ каждую сферу λ , принадлежащую сѣти; пусть окружность сѣченія будетъ γ . При гиперболической инверсіи относительно κ каждая точка этой окружности переходитъ въ себя самое⁴⁸⁾; вмѣстѣ съ тѣмъ сфера λ , проходящая черезъ окружность γ , переходитъ въ сферу λ' , которая также принадлежитъ сѣти, такъ какъ она проходитъ черезъ окружность этой сѣти (см. § 9, 6 прим. 36); это и требовалось доказать. На простѣйшимъ случаѣ параболической сѣти намъ не стоитъ останавливаться. Вмѣстѣ съ тѣмъ наша теорема доказана во всемъ ея объемѣ, и мы можемъ перевести ее теперь на языкъ соотвѣтствующей неевклидовой геометріи. Она гласитъ:

II. Гиперболическая инверсія сѣти сферъ относительно одной изъ нихъ κ съ точки зрѣнія соотвѣтствующей неевклидовой геометріи, представляетъ собой отраженіе отъ псевдоплоскости κ .

Въ самомъ дѣлѣ, гиперболическая инверсія относительно сферы κ прежде всего представляетъ собой съ точки зрѣнія этой псевдо-геометріи коллинеацію, т. е. непрерывное отображеніе пространства въ себя; самое, которое относитъ каждой псевдо-точкѣ P нѣкоторую псевдо-точку P' такимъ образомъ, что каждой псевдо-плоскости, которую пробѣгаетъ P , отвѣчаетъ псевдо-плоскость (вообще говоря, другая), которую пробѣгаетъ точка P' ; если поэтому P пробѣгаетъ прямую, то P' также пробѣгаетъ прямую. Эта коллинеація обладаетъ, однако, слѣдующими специальными свойствами:

- а) Точки псевдо-плоскости κ и только эти точки отвѣчаютъ каждая самой себѣ.

⁴⁷⁾ Ибо точка A переходитъ въ A' , и обратно.

⁴⁸⁾ Гиперболическая инверсія относительно сферы κ превращаетъ каждую точку этой сферы въ себя самое.

- б) Псевдо-прямыя, перпендикулярныя къ κ , — какъ окружности, пересекающія ортогонально сферу k , — также переходятъ каждая въ себя самое, но такимъ образомъ, что каждой точкѣ P такой прямой g отвѣчаетъ точка P' той же прямой, когорая, однако, совпадаетъ съ точкой P только въ томъ случаѣ, если послѣдняя лежитъ на псевдо-плоскости κ .


Но такого рода коллинеация обращается въ отраженіе отъ псевдо-плоскости κ , если она въ то же время при преобразованіи сохраняетъ углы, какъ это дѣйствительно имѣетъ мѣсто при инверсіи ⁴⁹⁾.

3. Это предложеніе вмѣстѣ съ симметрией въ пространствѣ устанавливаетъ также въ плоскости симметрію относительно оси. Изъ симметріи же въ плоскости извѣстнымъ способомъ получаются предложенія о конгруэнтности. Доказательство, по существу, основывается на томъ, что два конгруэнтныхъ треугольника, расположенные въ одной плоскости, всегда могутъ быть превращены одинъ въ другой при помощи отраженій, число которыхъ не превосходитъ трехъ; если при этомъ мы имѣемъ два односторонне-конгруэнтныхъ треугольника (совмѣщеніе которыхъ возможно безъ поворота плоскости), то для этого нужно четное число отраженій; если же треугольники разносторонне-конгруэнтны, то для осуществления этого нужно нечетное число отраженій. Въ самомъ дѣлѣ, если мы имѣемъ два разносторонне-конгруэнтныхъ треугольника, которые еще не расположены симметрично относительно нѣкоторой оси, то, отражая одинъ изъ нихъ относительно любой прямой нашей плоскости, мы дѣлаемъ его односторонне-конгруэнтнымъ со вторымъ. Чтобы теперь привести въ совмѣщеніе два односторонне конгруэнтныхъ треугольника ABC и $A'B'C'$, возьмемъ отраженіе треугольника $A'B'C'$ относительно перпендикуляра, возставленнаго изъ середина отрезка AA' , если точки A, A' не совпадали уже и безъ того. Отраженный треугольникъ $AB'C''$ теперь необходимо имѣетъ общую вершину съ треугольникомъ ABC . Вмѣстѣ съ тѣмъ треугольники ABC и $AB'C''$ теперь разносторонне-конгруэнтны, и отраженіе одного изъ нихъ относительно биссектрисы угла BAC'' или CAB'' приводитъ ихъ въ совмѣщеніе ⁵⁰⁾.

⁴⁹⁾ Пусть P будетъ произвольная псевдо-точка, не лежащая на псевдо-плоскости κ . Пусть PK будетъ псевдо-прямая, выходящая изъ P перпендикулярно къ псевдо-плоскости κ и встрѣчающая послѣднюю въ точкѣ K . Такъ какъ точка K , какъ и вся псевдо-плоскость κ , инвертируется въ себя самое, а углы сохраняются, то и псевдо-прямая PK инвертируется въ себя самое. Если точка P переходитъ въ точку P' , а L есть точка на псевдо-плоскости κ , то уголъ PLK равенъ углу $P'LK$. Теперь ясно, что эта инверсія есть не что иное, какъ отраженіе всѣхъ точекъ отъ псевдо-плоскости κ .

⁵⁰⁾ Авторъ недостаточно подчеркиваетъ выводъ, который онъ отсюда дѣлаетъ конгруэнтными въ псевдопространствѣ являются тѣ образы, которые могутъ быть приведены въ совмѣщеніе путемъ отраженій отъ псевдо-плоскостей (т. е. путемъ

Если въ нѣкоторой геометріи, какъ въ разсматриваемомъ случаѣ, отраженіе задано непосредственно, то мы можемъ, какъ показываютъ эти соображенія, откладывать отрѣзки и углы, совершенно не прибѣгая къ помощи циркуля. Однако, съ точки зрѣнія неевклидовой геометріи въ сферической сѣти, гдѣ всѣ псевдо-прямыя суть окружности, нельзя сказать, что въ этой геометріи планиметрия обходится однимъ только циркулемъ безъ пособія линейки, ибо циркуль Евклидовой геометріи съ точки зрѣнія неевклидовой не есть циркуль. Не менѣе важень, чѣмъ циркуль, былъ бы для обѣихъ неевклидовыхъ геометрій инверсоръ, т. е. инструментъ, который—выражаясь языкомъ Евклидовой геометріи—при данныхъ центрѣ и радіусѣ инверсіи даетъ точку, обратную каждой данной точкѣ. Наиболее извѣстный инверсоръ принадлежитъ Пюсселье (Peaucellier) *); это первый параллелограммъ, посредствомъ



Фиг. 33.

котораго былъ рѣшенъ вопросъ о проведеніи прямой линіи путемъ превращенія круговаго движенія въ прямолинейное. Онъ состоитъ изъ ромба $PQP'Q'$, стороны котораго сочленены въ вершинахъ (фиг. 33); изъ двухъ противоположныхъ вершинъ Q и Q' идутъ два равныхъ стержня QO и $Q'O$, которые гакже могутъ вращаться вокругъ точекъ Q , Q' и O . Если M есть центръ ромба, то

$$\begin{aligned} OP \cdot OP' &= (OM - MP)(OM + MP) = \\ &= OM^2 - MP^2 = \\ &= (OQ^2 - QM^2) - (QP^2 - QM^2) = \\ &= OQ^2 - QP^2 = \text{const.} \end{aligned}$$

это произведеніе зависитъ, такимъ образомъ, отъ неизмѣняющихся длинъ стержней, а не отъ перемѣннаго разстоянія OP . Если теперь мы закрѣпимъ точку O , и точка P будетъ описывать нѣкоторую фигуру, то точка P' опишетъ обратную фигуру при центрѣ инверсіи O и степени инверсіи $r^2 = OQ^2 - OP^2$. Если присоединить къ инструменту еще седьмой стержень CP , длина котораго равна OC , то при неподвижности точекъ O и C ,

инверсій относительно сферъ сѣти). Если мы желаемъ отличить конгруэнтность отъ симметріи, то мы должны считать конгруэнтными тѣ образы, которые могутъ быть приведены въ совмѣщеніе четнымъ числомъ отраженій.

*) Nouvelles Annales, II série, 3 (1864), p. 344 и II série 12 (1873), p. 71.

Веберъ. Энциклоп. элемент. геометрія.


точка P может еще описывать окружность, проходящую через центр инверсии O ; обратная точка P' описывает при этом прямолинейный отрезок; если же условие $CP = CO$ не выполнено, то точки P и P' описывают взаимно обратные окружности.

Чтобы инверсор осуществял эллиптическую инверсию, нужно, очевидно, только сделать равные стержни OQ и OQ' меньше, чем PQ (см. фиг. 34); тогда:

$$\begin{aligned} OP \cdot OP' &= (PM - OM)(PM + OM) = \\ &= PM^2 - OM^2 = \\ &= (PQ^2 - QM^2) - (OQ^2 - QM^2) = \\ &= PQ^2 - OQ^2 = \text{const.} \end{aligned}$$

вместе с тем точка O лежит между точками P и P' . Условие прямолинейного движения точки P' такое же, как и для гиперболического инверсора.

4. Конечно, не будет лишено интереса познакомиться с важными элементарными построениями двух неевклидовых геометрий. Прежде



Фиг. 34.

всего спросим, какой вид имеют в этих псевдо-геометриях окружность и сфера? Мы определяем оба образа, как геометрическое место точек (соответственно, линию или поверхность), равноотстоящих от некоторой определенной точки,—псевдо-центра. Так как псевдо-отрезки равны, когда они переходят друг в друга путем отражения, то мы можем определять сферы с псевдо-центром C , как поверхности, которые переходят в самих себя при отражении от всякой псевдо-плоскости, проходящей через точку C . Точно так же окружность можно определить, как кривую, которая переходит в себя самое при отражении от любого диаметра. Но псевдо-плоскости, проходящая через

точку C , образуют связку, которая при отражении от одной из своих плоскостей, как целое, переходит в себя самое. Теперь ясно, что сферы пучка, ортогонального этой связке, образуют систему поверхностей, которая не меняется при упомянутом отражении; это гиперболический пучек, ось которого CC'' проходит через центр O всей нашей сфери сфер; C' и C'' суть составные точки псевдо-точки C и в то же время нулевые точки гиперболического пучка⁵¹⁾. Мы приходим таким образом к следующему выводу:

III. Псевдо-сферы и псевдо-окружности обоих неевклидовых геометрических систем также с точки зрения Евклидовой геометрии представляют собой соответственно сферы и окружности. Не нужно только удивляться тому, что при этом осуществлении двух неевклидовых геометрий псевдо-сфера состоит из двух Евклидовых сфер взаимно обратных относительно сфери⁵²⁾. Обратное, каждая пара сфер, взаимно обратных относительно сфери, представляет собой

⁵¹⁾ Что псевдо-сфера в нашем псевдо-пространстве есть поверхность, которая переходит в самое себя при отражении от любой псевдо-плоскости, проходящей через псевдо-центр C (подобно тому, как это имеет место в обыкновенном пространстве),—это, полагаем, ясно вытекает из п. 3 и примечания 50. Совокупность псевдо-плоскостей, проходящих через псевдо-точку C , с точки зрения обыкновенной геометрии, есть совокупность сфер, проходящих через точки C' и C'' , составляющих псевдо-точку C . Все эти сферы имеют общую хорду $C'C''$, а стало-быть, и общую радикальную ось CC'' , проходящую также через центр сфери O ; иными словами, они образуют эллиптическую связку (п. 6, § 9 и прим. 32). Связка эта при отражении от любой из ее сфер (псевдо-плоскостей) переходит в самое себя; в самом деле, отражение есть гиперболическая инверсия (п. 2) относительно этой сферы; так как эта инверсия оставляет точки C' и C'' в покое, то она превращает всякую сферу, проходящую через C' и C'' , в другую сферу, также проходящую через эти две точки, т. е. превращает всякую сферу связки в сферу той же связки. Согласно п. 6 § 9 (см. также прим. 33) этой связке соответствует гиперболический пучек сфер, сфери сфер связки ортогонально. При отражении (инверсии) каждая из этих сфер, перейдет в сферу того же ортогонального пучка. Но окружность, по которой сфера пучка сечет ту сферу, относительно которой производится инверсия, остается без изменения; а так как через эту окружность проходит только одна сфера ортогонального пучка, то каждая сфера ортогонального пучка переходит в себя самое. Этот пучек и представляется собой, таким образом, совокупность поверхностей, которая не меняется при отражении от любой псевдо-плоскости, проходящей через псевдо-точку C .

⁵²⁾ Те сферы, которые служат псевдо-сферами в нашей псевдо-геометрии, сфери ортогонально сфери сфери, а потому не принадлежат сфери. Если L' есть одна из таких сфер и L'' любая ее точка, а L'' есть точка, обратная L' в инверсии сфери, то точка L'' не принадлежит сфери L' , ибо всякая сфера, проходящая через две взаимно обратные точки, принадлежит сфери. Между тем точки L' и L'' образуют одну псевдо-точку и не могут быть отделяемы в нашем

псевдо-сферу⁵³⁾. Псевдо-центр псевдо-сферы или псевдо-окружности обыкновенно не совпадаетъ съ центромъ Евклидовымъ. Къ псевдо-сферамъ принадлежать также всѣ образы, которые въ смыслѣ Евклидовой геометріи должны называться плоскостями, если онѣ не проходятъ черезъ центръ сѣти.

Въ частности, ортогональная сфера гиперболической сѣти представляетъ собой псевдо-сферу, такъ называемую „абсолютную“ сферу гиперболической геометріи; между тѣмъ диаметральная сфера эллиптической сѣти представляетъ собой псевдо-плоскость эллиптического пространства. Если мы будемъ усматривать существенный признакъ сферы въ томъ, что она сѣчетъ ортогонально всѣ плоскости и лучи связки ея диаметровъ, то въ гиперболической геометріи придется признать псевдо-сферами также два типа своеобразныхъ образовъ, именно ортогональныя сферы всѣхъ содержащихся въ сѣти параболическихъ и гиперболическихъ связокъ. Мы изучимъ эти соотношенія сначала на окружностяхъ, такъ какъ здѣсь легче сдѣлать ихъ наглядными при помощи чертежа.


5. Какъ мы это уже неоднократно дѣлали, мы возьмемъ плоскость чертежа ζ , проходящую черезъ центръ сѣти, такъ что она будетъ также плоскостью псевдо-плоскостью ξ соответствующей неевклидовой геометріи, и

псевдо-пространствѣ. Когда точка L' обѣгаетъ всю сферу λ' , то точка L'' обѣгаетъ сферу λ'' , обратную λ' въ инверсіи сѣти: совокупность сферъ λ' и λ'' содержитъ каждую пару точекъ (L', L'') , онѣ вмѣстѣ образуютъ псевдо-сфера мы употребляемъ въ смыслѣ „сферы“ въ нашемъ псевдо-пространствѣ. Не нужно смѣшивать этого значенія съ тѣмъ, которое присваивается тому же термину въ теоріи поверхностей).


⁵³⁾ Положимъ, что λ' и λ'' суть двѣ сферы, взаимно обратныя въ инверсіи сѣти. Мы предположимъ, что сѣть эллиптическая. Въ такомъ случаѣ сферы λ' и λ'' не имѣютъ общихъ точекъ, ибо центръ сѣти O есть внутренний центръ подобія сферъ (см. п. 8 § 8-го); обѣ сферы расположены по разнымъ сторонамъ плоскости, проходящей перпендикулярно къ линіи центровъ черезъ точку O . Эти двѣ сферы опредѣляютъ пучекъ сферъ, центры которыхъ расположены всѣ на одной прямой; это будетъ пучекъ гиперболическій, такъ какъ радикальная плоскость сферъ λ' и λ'' ихъ раздѣляетъ. Связка, ортогональная къ этому пучку, будетъ эллиптическая (см. прим. 33); всѣ сферы связки проходятъ поэтому черезъ двѣ точки C' и C'' , которыя совокупно образуютъ псевдо-центр псевдо-окружности (λ', λ'') (см. прим. 52).

Если связка гиперболическая, то дѣло не обстоитъ такъ просто. Самое предположеніе справедливо только при нѣкоторыхъ весьма существенныхъ оговоркахъ, такъ какъ самыя сферы въ гиперболической сѣти могутъ быть различнаго типа; трудность заключается въ томъ, что здѣсь пучекъ, опредѣляемый сферами λ' и λ'' , можетъ оказаться эллиптическимъ и параболическимъ; тогда ортогональная связка не будетъ эллиптической и не опредѣлитъ двухъ точекъ (C', C'') , составляющихъ псевдо-центр псевдо-сферы (λ', λ'') . Авторъ на это указываетъ ниже и выясненію этого вопроса посвящаетъ пунктъ 5.

поставим себѣ задачу построить псевдо-окружность, проходящую через данную псевдо-точку P и имѣющую данный псевдо-центр C . Пусть C' и C'' будутъ двѣ точки (фиг. 35, 36, 37), которыя въ совокупности составляютъ псевдо-точку C ; P' пусть будетъ одна изъ составляющихъ псевдо-точки P , а ω сѣчение плоскости ζ съ ортогональной сферой сѣты, которую мы сначала будемъ считать гиперболической. Такъ какъ составляющая окружность x' , которая въ совокупности съ окружностью x'' , обратной ей относительно ω , образуетъ искомую псевдо-окружность x , должна пересѣкаться ортогонально всѣ окружности $a, b \dots$, проходящія черезъ C' и C'' , то она принадлежитъ пучку, ортогональному къ пучку (a, b) . Такимъ образомъ,



Фиг. 35.




Фиг. 36.

псевдо-окружностями съ псевдо-центромъ C служатъ, выражаясь языкомъ Евклидовой геометріи, пары окружностей пучка, ортогональнаго къ пучку діаметровъ. Посредствомъ (гиперболической) инверсіи относительно окружностей $a, b \dots$ мы получаемъ изъ точки P дальнѣйшія точки $P'_a, P'_b \dots$, окружности x' , которыми она вполне определяется⁵⁴⁾. Точка P'_a , очевидно, лежитъ на одной прямой съ P и съ центромъ A окружности a ; точно такъ же прямая $P'P'_b$ проходитъ черезъ центръ B окружности b . Каждая прямая, проходящая черезъ точку A , встрѣчаетъ окружность x' въ двухъ точкахъ P' и K' , взаимно обратныхъ относительно окружности a (на чертежѣ ихъ нѣтъ); съ точки зрѣнія гиперболической геометріи эти точки симметричны относительно псевдо-

⁵⁴⁾ Это та же идея, которая была положена выше въ основу опредѣленія псевдо-сферы: отраженіе псевдо-точки отъ псевдо-діаметра дастъ псевдо-точку, принадлежащую той же псевдо-окружности.

прямой a . Такъ какъ окружность x'' (см. фиг. 37, на фиг. 35 и 36 окружность x' не начерчена) также съчетъ окружность a подъ прямымъ угломъ, то точки, обратныя P' и K' относительно ω , также лежатъ на окружности x'' и взаимно обратны относительно окружности a ⁵⁵⁾. Пары точекъ съи H', H'' и K', K'' образуютъ, такимъ образомъ, двѣ псевдо-точки H, K псевдо-окружности x , расположенныя симметрично относительно псевдо-прямой a , т. е. псевдо-окружность x дѣйствительно преобразуется въ себя самое при отраженіи отъ любого изъ своихъ псевдо-діаметровъ. Если псевдо-діаметры образуютъ эллиптической пучекъ, какъ на фиг. 35, то мы будемъ и самую псевдо-

окружность называть эллиптической.



Фиг. 37.

Пучекъ діаметровъ $a, b \dots$ можетъ оказаться параболическимъ только въ томъ случаѣ, если точки C' и C'' совпадаютъ (естественно, — на окружности ω , см. фиг. 35); его окружности соприкасаются въ общей точкѣ (C', C''). Ортогональный пучекъ въ этомъ случаѣ также параболическій и имѣетъ радикальной осью касательную къ окружности ω въ точкѣ C' . Двѣ окружности этого пучка, взаимно обратныя относительно ω , образуютъ въ совокупности псевдо-окружность

съ центромъ C' . Псевдо-окружности, псевдо-діаметры которыхъ образуютъ параболическій пучекъ, мы будемъ называть параболическими.

Гиперболическому пучку окружностей $a, b \dots$ (фиг. 37) соотвѣтствуетъ эллиптической ортогональный пучекъ; пусть U и V будутъ основныя его точки. Если мы склонны разсматривать $a, b \dots$, какъ пучекъ псевдо-прямыхъ, проходящихъ чрезъ идеальную псевдо-точку C , то теперь гиперболическія псевдо-окружности состоятъ каждая изъ двухъ простыхъ окружностей, которыя проходятъ чрезъ точки U, V и взаимно обратны при (гиперболической) инверсіи относительно окружности ω , какъ, напримѣръ, x' и x'' на фиг. 37. Только въ томъ случаѣ, когда окружность x' совпа-

⁵⁵⁾ При инверсіи относительно ω окружности a и b переходятъ каждая въ себя самое (§ 8, п. 5, пред. 2.), а окружность x' въ x'' .

дасть съ z' , т. е. окружность z сама принадлежит сѣти, не можетъ быть рѣчи о псевдо-окружности: мы имѣемъ тогда передъ собою псевдо-прямую, перпендикулярную къ $a, b \dots$ ⁵⁶⁾. Однако, существуетъ только одна окружность g , проходящая черезъ точки U, V и сѣкущая ортогонально окружность ω ; центръ ея G расположенъ на перпендикулярѣ, возстановленномъ изъ середины отрезка UV такимъ образомъ, что GVO есть прямой уголъ.

Сводя все это воедино, мы можемъ сказать:

IV. Въ гиперболическомъ пространствѣ имѣется три типа псевдо-окружностей: эллиптическія, параболическія и гиперболическія.

- a) Эллиптическія псевдо-окружности имѣютъ псевдо-центромъ дѣйствительную, конечную точку.
- b) Псевдо-центръ параболической окружности лежитъ на абсолютной псевдо-сферѣ; ея псевдо-діаметры параллельны другъ другу, псевдо-окружность проходить черезъ свой псевдо-центръ.
- c) Гиперболическія окружности имѣютъ идеальный псевдо-центръ; діаметры такой окружности не параллельны, но они и не пересѣкаются. Въ этомъ случаѣ существуетъ псевдо-прямая g , которая также сѣчетъ ортогонально пучекъ діаметровъ ⁵⁷⁾,


⁵⁶⁾ Какъ сфера, такъ и окружность, принадлежащая сѣти обращается при инверсіи сѣти, въ себя самое; и обратно, каждая окружность, обратная самой себѣ въ инверсіи сѣти, принадлежитъ сѣти, а потому ортогональна къ окружности ω и представляетъ собой псевдо-прямую въ нашемъ гиперболическомъ пространствѣ.

⁵⁷⁾ Только эллиптическая псевдо-окружность представляетъ собой „окружность“, какъ мы такую обыкновенно понимаемъ, т. е. геометрическое мѣсто (псевдо)-точекъ, равно удаленныхъ отъ центра. Параболическая окружность имѣетъ бесконечно удаленный центръ; это та кривая, которую Лобачевскій называлъ „предѣльной круга“ или „орицикломъ“. Гиперболическая окружность имѣетъ мнимый центръ; она можетъ быть опредѣлена, какъ геометрическое мѣсто псевдо-точекъ на псевдо-плоскости, равно удаленныхъ отъ нѣкоторой псевдо-прямой.

Чтобы уяснить себѣ еще, съ другой точки зрѣнія, тѣ же соображенія, замѣтимъ, что окружность въ обыкновенной плоской геометріи можно разсматривать какъ ортогональную траекторію пучка прямыхъ, т. е. какъ кривую, сѣкущую ортогонально всѣ лучи пучка. Если пучекъ вырождается въ пучекъ параллелей, т. е. когда центръ пучка уходитъ въ бесконечность, то траекторія обращается въ прямую, на которую мы и смотримъ, какъ на предѣльную окружность, какъ на окружность бесконечно большаго радіуса. Этимъ двумя случаями въ гиперболической геометріи отвѣчаютъ эллиптическая и параболическая окружность. Или еще иначе: если центръ окружности въ обыкновенной плоскости уходитъ въ бесконечность, то окружность обращается въ прямую; въ гиперболической плоскости—она обращается въ особую линію, въ „параболическую окружность“, какъ ее называетъ авторъ настоящаго сочиненія,—въ „орициклъ“, какъ ее называетъ Лобачевскій. (На об.).

Последнее предложение допускает обращение: совокупность псевдо-перпендикуляровъ къ одной и той же псевдо-прямой образуетъ пучекъ, и именно—гиперболическій въ гиперболической геометрии и эллиптической въ эллиптической.

Теперь обратимся къ эллиптической сѣти. Пусть плоскость чертежа, какъ псевдо-плоскость, опять проходитъ черезъ центръ сѣти, пусть d



Фиг. 38.

будетъ ея сѣченіе съ диаметальной сферой (фиг. 38). Пусть, какъ и прежде, C, C' будутъ составляющія точки данного псевдо-центра, P' и P'' составляющія данной псевдо-точки, черезъ которую должна проходить псевдо-окружность. Отраженіемъ отъ псевдо-диаметровъ a и b мы получимъ изъ P' двѣ дальнѣйшія точки P'_a и P'_b одной составляющей x' искомой псевдо-окружности x , которая этимъ уже вполне опредѣлена. Вторая составляющая x'' построена по тремъ точкамъ P', Q', S' , которыя получаются изъ точекъ окружности x' посредствомъ эллиптической инверсіи относительно окружности d . Впрочемъ, для опредѣленія центра N окружности x'' достаточно знать одну точку S'' , распо-

ложенную на окружности, такъ какъ $OS''N$ есть прямой уголъ. Такъ какъ въ эллиптической сѣти имѣются только эллиптическіе пучки окружностей, то отсюда слѣдуетъ:

Въ обыкновенной плоскости совокупность перпендикуляровъ къ одной и той же прямой образуетъ пучекъ параллелей; ортогональная ихъ траекторія есть предѣльная круга прямая. Но въ гиперболической плоскости совокупность перпендикуляровъ къ одной прямой (какъ ниже указано и въ текстѣ) не представляетъ собой пучка параллелей; это своеобразный пучекъ (которому можетъ быть отнесена идеальная точка пересѣченія) расходящихся прямыхъ; ортогональныя траекторіи такого пучка суть „гиперболическія окружности“.

V. Въ эллиптическомъ пространствѣ существуютъ только эллиптическія псевдо-окружности (съ дѣйствительнымъ псевдо-центромъ).

Послѣ этого подробнаго разбора псевдо-окружностей мы можемъ относительно сферъ ограничиться замѣчаніемъ, что теоремы IV и V *mutatis mutandis* остаются такоже въ силѣ относительно сферъ.

6. Что касается вычисленій неевклидовой метрики, то мы оставимъ ихъ въ сторонѣ, такъ какъ для выясненія поставленнаго здѣсь вопроса о сущности основныхъ понятій, они вносятъ очень мало ⁵⁸⁾. Метрика неевклидовой геометріи представляетъ высокій интересъ, если мы обозрѣваемъ ее сразу, какъ бы съ птичьяго полета; возможность окинуть ее такимъ взглядомъ даетъ намъ, съ одной стороны, проективное мѣроопредѣленіе Кели, а съ другой стороны,—теорія группъ Софуса Ли. Напротивъ, проникнуть въ эту своеобразную область при помощи методовъ элементарной геометріи представляетъ довольно неблагодарную работу; къ тому же чтеніе основныхъ изслѣдованій затрудняется массой новыхъ искусственныхъ выраженій и символовъ, которые каждый изъ авторовъ вводитъ по своему; къ этому присоединяются еще обыкновенно соображенія фило-софскаго характера, съ которыми далеко не всегда можно согласиться. Неудобство представляетъ такоже и то обстоятельство, что эти идеи не проводятся рядомъ точныхъ построений ⁵⁹⁾; однако, здѣсь приходится на помощь геометрію сферъ, если мы относимъ всю систему къ сферической сѣти. Но тогда эти предложенія гораздо легче обозрѣть съ точки зрѣнія Евклидовой геометріи сферической сѣти, чѣмъ съ точки зрѣнія неевклидовой геометріи. Сферическая тригонометрія такимъ путемъ легко переносится въ псевдо-геометрію.

Для аналитической разработки обѣихъ неевклидовыхъ системъ указали очень удобный путь Шуръ ⁶⁰⁾ и Гильбертъ ⁶¹⁾. Теорія Гильберта предполагаетъ знакомство съ началами аналитической геометріи. Эта теорія становится поразительно ясной, если мы пользуемся гиперболической сѣтью, такъ что развитіе ея этими средствами доставляетъ высокое наслажденіе. Гильбертовы „концы“ прямой въ гиперболической геометріи, очевидно, представляютъ собой не что иное, какъ пересѣченіе ея съ


⁵⁸⁾ Хотя это замѣчаніе не фактическаго свойства, мы все же считаемъ уместнымъ высказать, что мы рѣшительно не разделяемъ этого взгляда. Напротивъ, мы считаемъ, что только изученіе тригонометріи неевклидоваго пространства, какъ первой метрической дисциплины, вполне выясняетъ самую неевклидову геометрію.

⁵⁹⁾ Этотъ упрекъ мы также считаемъ рѣшительно несправедливымъ.

⁶⁰⁾ F. Schur, „Ueber die Grundlagen der Geometrie“. Math. Ann. 55.

⁶¹⁾ D. Hilbert, „Neue Begründung der Bolyai-Lobatschewskyschen Geometrie“. Math. Ann. 57. Перепечатано во второмъ изданіи его сочиненія. „Grundlagen der Geometrie“.

ортогональной сферой. Гильбертову лемму 4 в § 1 указанного мемуара, на которой основываются операции надъ „концами“, нужно сначала выяснить себя в Евклидовой геометрии; но существу, эта теорема тогда сводится к тому, что перпендикуляры, возставленные из серединъ сторонъ треугольника ABC , пересекаются в одной точкѣ, в центрѣ описанной окружности ω . В гиперболической геометрии эти перпендикуляры могут оказаться параллельными, могут и вовсе не пересекаться; в послѣднемъ случаѣ они перпендикулярны къ нѣкоторой прямой. В псевдо-плоскости ζ предыдущаго пункта мы видели непосредственно, что эти перпендикуляры принадлежатъ эллиптическому, параболическому или гиперболическому пучку (пучку потому, что они пересекаютъ ортогонально какъ окружность, проходящую черезъ вершины A, B, C , такъ и абсолютную окружность ω). Такъ какъ мы в гиперболической геометрии присваиваемъ всѣмъ




Фиг. 39.


прямымъ, расположеннымъ в гиперболической плоскости перпендикулярно къ одной прямой идеальную точку пересѣченія (теорема IV), то эта лемма Гильберта остается в силѣ не только в томъ случаѣ, когда перпендикуляры параллельны, но и в томъ случаѣ, когда они имѣютъ идеальную точку пересѣченія. На фигурѣ 39 все это показано, опущена только часть, обратная чертежу относительно окружности ω (какъ и в пунктѣ 5); A', B', C' и ω' суть соответственно составляющія точки A, B, C и окружности ω . Псевдо-перпендикуляры изъ серединъ псевдо-отрѣзковъ $B'C', C'A', A'B'$ представлены здѣсь окружностями x, y, z , центры которыхъ X, Y, Z лежатъ на общей хордѣ UV окружностей ω и ω' . На рисункѣ нанесены всѣ вспомогательныя линіи; касательныя, впрочемъ, проведены на глазъ, но точки касанія опредѣлены перпендикулярами изъ центра при помощи двухъ чертежныхъ треугольниковъ. Если развить себя такого рода вольности, которыя къ тому же допускаются также в начертательной геометрии, то такого рода построения мало затруднительны. Если мы найдемъ пересѣченіе псевдо-перпендикуляра x къ AB съ прямой AB (на фигурѣ не начерченной), то мы получимъ точку M , которую опредѣлимъ, какъ середину псевдо-отрѣзка AB . „Середина“, опредѣляемая такимъ образомъ, во всякомъ случаѣ имѣетъ больше аналогіи съ Евклидовой серединой, чѣмъ точка, опредѣляемая согласно предположенію 1 § 5-го; въ этомъ смыслѣ „срединой“ служила бы точка, которая вмѣстѣ съ без-

конечно удаленной точкой дѣлится гармонически псевдо-отрѣзокъ AB . Такимъ образомъ, въ гиперболической геометрии отрѣзокъ имѣемъ дѣлѣ „серединъ“: въ эллиптической геометрии послѣднее опредѣленіе совершенно непригодно, тогда какъ первое опредѣленіе всегда находитъ себѣ примѣненіе⁶⁰⁾.

7. Мы уже указывали выше, что обѣ псевдо-геометрии эмпирически не могутъ быть отличены отъ обыкновенной, если мы примемъ радиусъ R ортогональной или, соответственно, диаметальной сферы достаточно большимъ (см. стр. 75). Но здѣсь уместно поставить вопросъ, не обнаружались ли бы непосредственно особенности неевклидовой сферы, такъ какъ ни объ одномъ пространственномъ образѣ мы не имѣемъ такого яснаго представленія, какъ о сферѣ. Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, мы выведемъ нѣкоторыя формулы, которыя покажутъ, сколь большимъ



Фиг. 40.



Фиг. 41.

нужно выбрать радиусъ R , чтобы неевклидова плоскость или сфера достаточно приблизились къ евклидовой, т. е. чтобы разница между ними оставалась въ произвольныхъ указанныхъ предѣлахъ. Для этого намъ нужны слѣдующія предложенія евклидовой геометрии.


а) Къ окружности радиуса r (фиг. 40) мы проведемъ касательную и опустимъ на нее перпендикуляръ CB изъ точки окружности C . Положимъ, что намъ при этомъ дано разстояніе $CB = b$ и требуется найти разстояніе a точки B отъ точки касанія A . Изъ чертежа мы находимъ непосредственно: $r^2 = (r - b)^2 + a^2$, такъ что

$$a = \sqrt{2rb - b^2}. \quad (1)$$

Если мы будемъ разсматривать окружность, какъ псевдо-прямую въ неевклидовой геометрии, то мы будемъ называть величину b касательнымъ уклоненіемъ отъ Евклидовой прямой на разстояніи a .

⁶⁰⁾ Мы не входимъ здѣсь въ объясненіе этихъ довольно трудныхъ соображеній, потому что они находятся въ связи съ идеями Гильберта, которыхъ мы не имѣемъ возможности здѣсь излагать.

б) Положим, как на стр. 74, что центр солнца S служит центром сѣти; пусть радиусъ R ортогональной или диаметральной сферы будетъ равенъ n радиусамъ земной орбиты e ; черезъ центръ земли E проведемъ сферу \mathcal{M} , принадлежащую нашей сѣти, и постараемся найти ея радиусъ ρ . На фиг. 41 и 42, соответствующихъ случаямъ эллиптической и гиперболической сѣти, ε изображаетъ эклиптику (которую мы принимаемъ круговой). Согласно теореме объ отрезкахъ сѣкущей и хорды



Фиг. 42.

и гиперболической сѣти, ε изображаетъ эклиптику (которую мы принимаемъ круговой). Согласно теореме объ отрезкахъ сѣкущей и хорды

$$\text{на фиг. 41: } e(2\rho + e) = R^2,$$

$$\text{" " 42: } e(2\rho - e) = R^2,$$

такъ что вообще

$$2\rho = (R^2 - \varepsilon e^2)/e = (n^2 - \varepsilon)e, \quad (2)$$

гдѣ $\varepsilon = +1$ для гиперболической сѣти и $\varepsilon = -1$ для эллиптической.


с) Изъ некоторой точки, доступной съ земли, мы проведемъ касательную плоскость къ сферѣ \mathcal{M} и разсмотримъ разстояние a отъ точки касанія A той точки плоскости B , надъ которой сфера поднимается на высоту b , какъ это выяснено подробно въ рубрику а). Для этого нужно въ формулѣ (1) положить $r = \rho$, и мы получимъ:

$$a = n\sqrt{cb} - \varepsilon bc/n^2 - b^2/n^2 = n\sqrt{cb} \sqrt{1 - \varepsilon/n^2} - b/cn^2. \quad (3)$$

д) Пусть K будетъ произвольная сфера (фиг. 43 и 44), ρ радиусъ, K ея центръ въ евклидовомъ пространствѣ, U ея псевдо-центръ съ точки зрѣнія неевклидовой геометрии соответствующей сѣти, d разстояние послѣдняго отъ центра сѣти S . Разсмотримъ разность $\chi = SU^2 - SK^2$, „аномалию“ сферы относительно соответствующей неевклидовой геометрии, гдѣ U' есть та изъ двухъ составляющихъ точекъ псевдо-точки U , которая лежитъ ближе къ точкѣ S . Чтобы въ гиперболической сѣти U было действительной точкой, сфера K должна проходить внутри ортогональной сферы ⁶¹⁾. Мы примемъ, что плоскость чертежа ξ по прежнему проходить черезъ точку S , а также черезъ K ; поэтому и точка U падаетъ въ ту же плоскость. Черезъ точку U проходитъ сфера сѣти Q , которая сѣчетъ ортогонально окружность K . На фиг. 43 и 44 изображены сѣченія этихъ

⁶¹⁾ Псевдо-окружностью съ действительнымъ центромъ въ гиперболической сѣти, какъ выяснено въ п. 5 и изображено на фиг. 35, служатъ двѣ взаимно обратныя окружности, не имѣющія общихъ точекъ; поэтому одна изъ составляющихъ окружностей лежитъ внутри ортогональной окружности, а другая лежитъ внѣ ея.

сферу съ плоскостью чертежа; на фигурѣ 43, кромѣ того, указано построение точки U^{62}). Треугольник QAK въ обоихъ случаяхъ даетъ:



Фиг. 43.



Фиг. 44.

$$r^2 + \rho^2 = (r + \varepsilon\zeta)^2, \quad (\alpha)$$

гдѣ по прежнему $\varepsilon = +1$ въ гиперболической сѣти и $\varepsilon = -1$ въ эллиптической. Далѣе, треугольник QBS даетъ:

$$\begin{aligned} \text{на фиг. 43: } r^2 + R^2 &= (d + \zeta + r)^2, \text{ такъ что} \\ R^2 &= d^2 + \zeta^2 + 2d\zeta + 2\zeta r + 2rd; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{на фиг. 44: } r^2 - R^2 &= (r - \zeta - d)^2, \text{ такъ что} \\ -R^2 &= d^2 - \zeta^2 + 2d\zeta - 2\zeta r - 2rd. \end{aligned}$$

Объединивъ оба случая, получимъ:

$$\begin{aligned} \varepsilon R^2 &= d^2 + \zeta^2 + 2d\zeta + 2\varepsilon\zeta r + 2\varepsilon rd, \\ \varepsilon R^2 &= d^2 + (\zeta^2 + 2\varepsilon\zeta r) + 2d\varepsilon(r + \varepsilon\zeta). \end{aligned} \quad (\beta)$$

Въ виду соотношений (α) , мы можемъ въ формулѣ (β) положить:

⁶²⁾ Составляющія точки U и U'' псевдо-центра U взаимно обратны въ инверсіи сѣти и служатъ основными точками эллиптическаго пучка окружностей, сѣкущихъ ортогонально пучекъ, определяемый окружностью E и ея инверсіей. Въ частности, слѣдовательно, окружность Q , имѣющая $U'U''$ своимъ діаметромъ, сѣчетъ ортогонально окружность K . Такъ какъ $SU', SU'' = R^2 = SB^2$, то эта окружность Q сѣчетъ подъ прямымъ угломъ и ортогональную окружность S . Отсюда слѣдуетъ, что точка Q имѣетъ степень r^2 какъ относительно окружности S , такъ и относительно окружности K . Это значитъ, точка Q лежитъ на радикальной оси окружностей K и S . Чтобы разыскать эту радикальную ось, строимъ третью вспомогательную окружность Z , находимъ радикальный центръ P трехъ окружностей и опускаемъ изъ P перпендикуляръ на линію центровъ SK . Этимъ путемъ находимъ точку Q . Изъ нея проводимъ касательную QB къ окружности S и радиусомъ QB проводимъ окружность, которая пересѣчетъ прямую SK въ точкахъ U' и U'' .

$$r \neq \varepsilon \chi - \sqrt{V r^2 - \varrho^2}, \quad \chi^2 + 2\varepsilon \chi r = \varrho^2. \quad (7)$$

Отсюда получаем:

$$\varepsilon R^2 = d^2 + \varrho^2 + 2d\varepsilon \sqrt{r^2 + \varrho^2},$$

или

$$\sqrt{r^2 + \varrho^2} = [R^2 - \varepsilon(d^2 + \varrho^2)]/2d, \quad r = \sqrt{[R^2 - \varepsilon(d^2 + \varrho^2)]^2/4d^2 - \varrho^2}. \quad (8)$$

Съ другой стороны, въ виду соотношения (7),

$$\varepsilon \chi = -r + \sqrt{r^2 + \varrho^2}, \quad (8)$$

откуда мы, наконецъ, получаемъ:

$$2\varepsilon \chi d = [R^2 - \varepsilon(d^2 + \varrho^2)] - \sqrt{[R^2 - \varepsilon(d^2 + \varrho^2)]^2 - 4d^2 \varrho^2}, \quad (4)$$

гдѣ радикаль имѣеть одно опредѣленное значеніе.

Изъ формулы (4) мы получаемъ при помощи простаго вычисления:

$$\varrho^2 = \varepsilon \chi R^2 : (\chi + d) - \chi d = \varepsilon \chi R^2/d - \chi d - \varepsilon (\chi R/d)^2/(1 + \chi/d). \quad (5)$$

Эти общія формулы значительно упрощаются однако, если мы примемъ во вниманіе порядокъ входящихъ въ нихъ величинъ и ограничимся приближеніемъ въ нѣсколько десятичныхъ знаковъ. Если проведенная вокругъ центра солнца ортогональная или діаметральная сфера настолько велика (см. стр. 74), что она охватываетъ всѣ планеты, то радіусъ $R = ne$ содержитъ, по крайней мѣрѣ, $n = 30$ радіусовъ земной орбиты (e). Пусть

$$\begin{aligned} n &\geq 30, \\ e &= 148 \cdot 10^6 \text{ km (приблизительно),} \\ b &= \frac{1}{1000} \text{ mm.} = 10^{-9} \text{ km} \end{aligned} \quad (6)$$

т. е. b равно единицѣ, употребляемой при наиболѣе тонкихъ микроскопическихъ измѣреніяхъ. Тогда съ точностью до двухъ десятичныхъ знаковъ

$$a = n \sqrt{eb} = 0,38 \cdot n \text{ km.} \quad (n \approx 30). \quad (7)$$

На фиг. 43 и 44 K есть центръ сферы, относительно которой мы теперь примемъ, что ея центръ доступенъ съ земли. Тогда его разстояніе d отъ солнца лишь незначительно отличается отъ радіуса земной орбиты e . Но при $d = e$ и $R = ne$ формула (3) даетъ:

$$\varrho^2 = \varepsilon \chi n^2 e - \chi e - \varepsilon \chi^2 n^2/(1 + \chi/e).$$

Послѣднимъ членомъ этого выраженія, очевидно, можно пренебречь, если, скажемъ, $\chi^2 n^2 < 10^{-6}$, $\varepsilon \chi n < 10^{-3}$ и χ очень мало по сравненію съ e ; $\varepsilon \chi$ имѣеть всегда положительное значеніе. При такомъ предположеніи мы имѣемъ приближенно:

$$\varrho^2 = \varepsilon \chi e (n^2 - \varepsilon),$$

такъ что ϱ^2 возрастаетъ или убываетъ вмѣстѣ съ произведеніемъ $\varepsilon \chi$. Если $\varepsilon \chi$ не превосходитъ $b = 10^{-9} \text{ km}$, то ϱ не превосходитъ значенія

$$\varrho = 0,38 \cdot n \text{ km} \quad (n \geq 30), \quad (8)$$

съ тѣмъ же приближеніемъ, какъ и въ формулѣ (7). Результатъ этихъ вычисленій можно формулировать слѣдующимъ образомъ.

VI. Двѣ неевклидовы геометріи не только логически равноправны съ Евклидовой геометрией, но и эмпирически. Въ частности, осуществленіе неевклидовыхъ геометрій въ эллиптической или гиперболической сѣти удовлетворяетъ самымъ строгимъ требованіямъ точности. Если центръ солнца служить центромъ сѣти, а радіусъ ортогональной или діаметральной сферы взятъ въ n радіусовъ земной орбиты, $n > 30$, то касательное уклоненіе псевдо-плоскости, доступной намъ на землѣ, составляетъ $\frac{1}{1000}$ mm только на разстояніи

$$a = 0,38 \cdot n \text{ km};$$

такъ что при $n = 30$

$$a = 11 \text{ km}$$

отъ точки касанія. Эллиптическая аномалія псевдо-сферы имѣетъ отрицательное значеніе, а гиперболическая положительное; для того, чтобы она въ томъ и другомъ случаѣ была меньше $\frac{1}{1000}$ mm (Евклидовъ) радіусъ можетъ быть не больше

$$\varrho = 0,38 n,$$

т. е. въ самомъ неблагоприятномъ случаѣ $n = 30$ онъ можетъ не превышать 11 км.

Для сферы и окружностей обыкновенной величины приближеніе псевдо-центра къ Евклидову центру необычайно велико. Было бы неправильно возразить на это, что такимъ образомъ устанавливается хотя и небольшая разница, но все же разница между тремя геометрическими системами. Эмпирически эту разницу врядъ ли возможно обнаружить уже при $n = 30$, при большихъ же значеніяхъ n она фактически вовсе исчезаетъ. Вычисленныя уклоненія гиперболической и эллиптической геометрій отъ Евклидовой остаются, такъ сказать, только на бумагѣ; они существуютъ только въ нашемъ воображеніи. Совершенно такъ же, какъ мы, съ точки зрѣнія Евклидовой геометріи, говоримъ, что псевдо-плоскость гиперболической или эллиптической геометрій всегда имѣетъ уклоненіе отъ плоскости Евклидовой геометріи, доступное вычисленію, можно было бы обратно, съ точки зрѣнія неевклидовой геометріи, возразить, что такъ называемая плоскость Евклидовой геометріи должна быть кривою поверхностью, ибо она отъ касательной плоскости, проведенной въ какой либо точкѣ (въ этой неевклидовой геометріи), уклоняется на разстояніе, которое мы можемъ точно вычислить. Точно такъ же и относительно окружности можно противопоставить одно утверженіе другому. Если бы всѣ три геометріи пользовались однимъ и тѣмъ же (матеріальнымъ) мас-

штабомъ, то онѣ при всей точности измѣреній и вычисленій получили бы, по существу, тѣ же значенія величинъ h и ζ , хотя формулы были бы различныя. Если поэтому обыкновенно говорятъ, что въ безконечно малой области въ обѣихъ неевклидовыхъ геометрiяхъ остается въ силѣ Евклидова метрика, то мы теперь видимъ, что эта область, по сравненiю съ малостью нашего человѣческаго масштаба, еще очень велика.

8. Въ заключенiе остается только доказать, что обѣ неевклидовыя геометрiи въ сферическихъ сѣтяхъ удовлетворяютъ также Гильбертовымъ аксиомамъ непрерывности V_1 и V_2 . Первая изъ нихъ, такъ называемая „аксиома Архимеда“, утверждаетъ, что по прямой, передвигаясь равными шагами, всегда возможно, сдѣлавъ конечное число шаговъ, перешагнуть за любую точку прямой. Доказательство очень легко провести въ пучкѣ окружностей, если мы примемъ во вниманiе, что изъ двухъ точекъ, взаимно обратныхъ относительно окружности \mathcal{S} , та, которая расположена внутри круга, ближе (въ Евклидовомъ значенiи слова) къ его периферiи.

Это справедливо какъ для эллиптической, такъ и для гиперболической инверси.



Фиг. 45.

Аксиома „полноты системы“ V_2 также выполняется въ сѣти, потому что послѣдняя охватываетъ также „плоскости“, „прямыя“ и „точки“ Евклидова пространства. Изъ двухъ аксиомъ непрерывности V Архимедова аксиома важнѣе, такъ какъ она составляетъ основу измѣренiя отрезковъ.

Мы изслѣдуемъ поэтому, въ какой связи находится измѣренiе отрезковъ двухъ неевклидовыхъ геометрiй съ той же задачей Евклидовой геометрiи; мы остаемся при томъ осуществленiи неевклидовой геометрiи, которое даетъ сферическая сѣть. „Длина“ $\langle AB \rangle$ псевдо-отрезка AB будетъ въ такомъ случаѣ иѣкоторое число, зависящее отъ составляющихъ точекъ A, A' и B, B' его концовъ и не мѣняющее своего значенiя

- 1) если точки A' и A'' , B' и B'' замѣщаютъ другъ друга,
- 2) если точки A', A'' и B', B'' замѣщаются ихъ отраженiями $\mathcal{A}', \mathcal{A}''$ и $\mathcal{B}', \mathcal{B}''$ отъ какихъ-либо изъ сферъ сѣти.

Этимъ требованiемъ „длина“ $\langle AB \rangle$ еще не вполне опредѣлена; но во всякомъ случаѣ мы, по крайней мѣрѣ, знаемъ, что мы должны ее искать среди выраженiй, которыя не мѣняются при инверси. Такiя выраженiя называются инвариантами инверси. Если точки A' и A'' , B' и B'' . . . попарно обратны (фиг. 45), и S есть центр инверси, такъ

что $SA \cdot SA'' = SB \cdot SB'' \dots$, то точки A', A'', B', B'' лежат на одной окружности, — точно так же C, C', D, D' и т. д., а потому $\sphericalangle SA'B' = \sphericalangle SB''A'', \dots$ Изъ подобія треугольниковъ $SA'B'$ и $SB''A''$ слѣдуетъ:

$$A'B' : SA' = A''B'' : SB'', \quad A'B' : SB' = A''B'' : SA'',$$

а потому

$$\frac{A'B'}{\sqrt{SA' \cdot SB'}} = \frac{A''B''}{\sqrt{SA'' \cdot SB''}}. \quad (9)$$

Изъ этого наиболѣ простаго инварианта точекъ A', B', A'', B'' легко получить другіе; такъ, напримѣръ, мы имѣемъ тождественно:

$$\frac{A'C}{B'C} : \frac{A'D}{B'D} = \frac{A'C/\sqrt{SA' \cdot SC'}}{B'C/\sqrt{SB' \cdot SC'}} : \frac{A'D/\sqrt{SA'' \cdot SD''}}{B'D/\sqrt{SB'' \cdot SD''}};$$

такъ какъ, съ другой стороны, въ виду соотношенія (9), мы можемъ въ правой части вездѣ замѣнить A', B', C, D' соответственно черезъ A'', B'', C'', D'' , то корни вновь извлекаются, и мы получаемъ:

$$\frac{A'C}{B'C} : \frac{A'D}{B'D} = \frac{A''C''}{B''C''} : \frac{A''D''}{B''D''}. \quad (10)$$


Каждая часть этого равенства называется ангармоническимъ отношеніемъ соответствующихъ четырехъ точекъ.

VII. Ангармоническое отношеніе четырехъ простыхъ⁶⁹⁾ точекъ не мѣняется при инверсіи.

Наши четыре точки могутъ и не лежать въ одной плоскости. Въ то время, какъ выраженіе (9) остается неизмѣннымъ только при той инверсіи, о которой тамъ была рѣчь, ангармоническое отношеніе остается инвариантомъ при всякой инверсіи. Меньшее число точекъ такого инварианта не имѣетъ; однако, элементарными средствами мы не можемъ этого доказать. Итакъ, чтобы приписать двумъ псевдо-точкамъ A, B длину $\langle AB \rangle$, мы неизбежно должны прибѣгнуть еще къ двумъ точкамъ прямой AB . Истинная, глубоко сокрытая причина этого факта можетъ быть выяснена только при помощи теоріи инвариантовъ. Въ гиперболической геометріи мы, естественно, сейчасъ же обратимся къ „концамъ“ псевдо-прямой, т. е. къ точкамъ ея пересѣченія U, V съ ортогональной сферой. Въ эллиптической сѣти, однако, діаметральная сфера, какъ мы видѣли, не представляетъ собой гакого особеннаго образа, и потому точки ея пересѣченія съ псевдо-прямой для насъ непригодны. Аналогію съ ортогональной сферой здѣсь представляетъ другая сфера, также имѣющая центръ въ центрѣ сѣти; но радиусъ этой сферы выражается чисто мнимымъ числомъ, абсолютная вели-

⁶⁹⁾ „Простыхъ“ — въ противоположеніе псевдо-точкамъ, составленнымъ каждая изъ двухъ простыхъ точекъ.

чина котораго выважаетъ радиусъ диаметральной сферы. Такъ какъ, однако, этотъ образъ не можетъ быть наглядно представлень, то мы ограничимся гиперболической геометрией. Мы предположимъ, что точки A', A'', B', B'' и центръ сѣти O расположены въ одной плоскости ξ , которая служитъ также плоскостью чертежа (фиг. 46). Ея сѣчение съ ортогональной сферой



Фиг. 46.

есть окружность ω ; „концы“ псевдо-прямой AB суть UV . При отраженіи отъ одной изъ псевдо-плоскостей сѣти ортогональная сфера переходитъ въ себя самое; отсюда слѣдуетъ: концы псевдо-прямой при отраженіи переходятъ въ концы псевдо-прямой, служащей изображеніемъ первой. Отразимъ теперь псевдо-прямую AB отъ псевдо-прямой l въ плоскости чертежа, перпендикулярной къ AB въ точкѣ V . Центръ I окружности l лежитъ на прямой UV , радикальной оси пучка окружностей, определяемаго окружностями ω и AB . Слѣдовательно, точки U и V взаимно обратны относительно окружности l . Пусть изображенія точекъ A' и A'' при отраженіи отъ l будутъ \mathcal{A}' и \mathcal{A}'' ; эти двѣ точки взаимно обратны относительно сѣти и образуютъ псевдо-точку \mathcal{A} , изображеніе точки A при отраженіи отъ l . Въ виду соотношенія (10) мы имѣемъ, съ одной стороны:

$$\frac{A'U \cdot B'U}{A'V \cdot B'V} = \frac{A''U \cdot B''U}{A''V \cdot B''V} \quad (11)$$

съ другой стороны:

$$\frac{A'U \cdot B'U}{A'V \cdot B'V} = \frac{\mathcal{A}'V \cdot B'V}{\mathcal{A}'U \cdot B'U}, \quad \frac{A''U \cdot B''U}{A''V \cdot B''V} = \frac{\mathcal{A}''V \cdot B''V}{\mathcal{A}''U \cdot B''U} \quad (12)$$

Если мы для сокращенія положимъ:

$$\frac{PU}{PI} : \frac{QU}{QI} = \{PQ\}, \quad (13)$$

то

$$\{A'B'\} = \{A''B''\}; \{A'B'\} = \{\mathcal{A}'\mathcal{A}''\}; \{A''B''\} = \{\mathcal{B}''\mathcal{A}''\}; \quad (14)$$

есть окружность ω ; „концы“ псевдо-прямой AB суть UV . При отраженіи отъ одной изъ псевдо-плоскостей сѣти ортогональная сфера переходитъ въ себя самое; отсюда слѣдуетъ: концы псевдо-прямой при отраженіи переходятъ въ концы псевдо-прямой, служащей изображеніемъ первой. Отразимъ теперь псевдо-прямую AB отъ псевдо-прямой l въ плоскости чертежа, перпендикулярной къ AB въ точкѣ V . Центръ I окруж-

эти равенства мы можем объединить въ одно слѣдующимъ образомъ:

$$\{AB\} = \{B\mathfrak{A}\}. \quad (15)$$

Далѣе:

$$\begin{aligned} \{A'B'\}^2 &= \{A'B'\} \{B'\mathfrak{A}'\} \\ &= \left(\frac{A'U'}{A'I'} : \frac{B'U'}{B'I'} \right) \left(\frac{B'U'}{B'I'} : \frac{\mathfrak{A}'U'}{\mathfrak{A}'I'} \right) = \frac{A'U'}{A'I'} : \frac{\mathfrak{A}'U'}{\mathfrak{A}'I'} = \{A'\mathfrak{A}'\}, \end{aligned}$$

и точно такъ же:

$$\{A''B''\}^2 = \{A''B''\} \{B''\mathfrak{A}''\} = \{A''\mathfrak{A}''\},$$

или короче:

$$\{AB\}^2 = \{AB\} \{B\mathfrak{A}\} = \{A\mathfrak{A}\}. \quad (16)$$

Псевдо-отрѣзокъ $A'\mathfrak{A}'$ представляеть собой сумму псевдо-отрѣзковъ $A'B'$ и $B'\mathfrak{A}'$, которые, съ точки зрѣнія гиперболической геометріи, равны между собой; иными словами, съ точки зрѣнія этой геометріи отрѣзокъ $A'\mathfrak{A}'$ вдвое больше отрѣзка $A'B'$. Въ равенствѣ (13) суммѣ $A'\mathfrak{A}'$ отрѣзковъ $A'B'$ и $A'\mathfrak{A}'$ соответствуетъ произведение ангармоническихъ отношеній, удвоенному отрѣзку $A'B'$ отвѣчаетъ квадратъ его ангармоническаго отношенія. Вслѣдствіе этого, если геометрическому сложению отрѣзковъ должно гвѣчать арифметическое сложение измѣряющихъ ихъ чисель, то таковыми должны служить не ангармоническія отношенія, а ихъ логариѣмы. Поэтому мы опредѣляемъ длину $\langle AB \rangle$ псевдо-отрѣзка AB , полагая:

$$\langle AB \rangle = k \log \{AB\} = k \log \left(\frac{A'U'}{A'I'} : \frac{B'U'}{B'I'} \right), \quad (17)$$

гдѣ k представляеть собою постоянную, которая еще подлежитъ опредѣленію. Мы принимаемъ здѣсь натуральную систему логариѣмовъ; если бы мы выбрали другое основаніе, то измѣнилось бы только значеніе числа k . Если это число k не зависитъ отъ A' и B' , то въ виду соотношенія (11) эта величина дѣйствительно представляеть собой инвариантъ при инверсіи сѣти, а потому можетъ быть разсматриваема, какъ число, зависящее отъ псевдо-точекъ A и B . Согласно теоремѣ VII выраженіе $\langle AB \rangle$ не мѣняется также и при отраженіи отъ псевдо-плоскости. Равенства (16) можно теперь написать въ такомъ видѣ:

$$\langle AB \rangle + \langle B\mathfrak{A} \rangle = \langle A\mathfrak{A} \rangle, \quad 2\langle AB \rangle = \langle A\mathfrak{A} \rangle, \quad (18)$$

гдѣ B есть псевдо-середина отрѣзка $A\mathfrak{A}$.

Пусть теперь $A_0, A_1, A_2, \dots, A_n$ будетъ рядъ псевдо-точекъ на псевдо-прямой g , при чемъ A_1 есть псевдо-середина отрѣзка A_0A_2 , A_2 —

псевдо-середины отрезка $A_1 A_2, \dots, A_{n-1} A_n$ — отрезка $A_{n-2} A_n$; в таком случае, обозначая через A'_i и A''_i составляющие псевдо-точки A_i , будем иметь:

$$\frac{A'_0 U}{A'_0 V} : \frac{A'_1 U}{A'_1 V} = \frac{A'_1 U}{A'_1 V} : \frac{A'_2 U}{A'_2 V} = \dots = \frac{A'_{n-1} U}{A'_{n-1} V} : \frac{A'_n U}{A'_n V}, \quad (19)$$

ибо A'_{n+1} есть изображение псевдо-точки A'_{n-1} при отражении от псевдо-перпендикуляра, восстановленного к псевдо-прямой g из A'_n . Такое же соотношение имеет место и для точек A''_n . Из равенств (19) путем перемножения можно получить:

$$\left(\frac{A'_0 U}{A'_0 V} : \frac{A'_1 U}{A'_1 V} \right)^n = \frac{A'_0 U}{A'_0 V} : \frac{A'_n U}{A'_n V},$$

так что

$$n \langle A_0 A_1 \rangle = \langle A_0 A_n \rangle, \quad (20)$$

как оно и должно быть. Если $\langle A_0 A_1 \rangle$ содержит m единиц длины ϵ , принятых при измерении псевдо-отрезков, то

$$\langle A_0 A_n \rangle = \frac{n}{m} \epsilon. \quad (21)$$

Формула (21) дает, таким образом, в этом случае результат измерения псевдо-отрезка $A_0 A_n$ при помощи единицы ϵ . Подобно тому, как это делается в Евклидовой геометрии, можно доказать при помощи аксиомы Архимеда, что для каждого псевдо-отрезка $A_0 A_n$ можно с любым приближением найти вспомогательный отрезок $A_0 A_1$ такого рода, что он, с одной стороны, представляет собой n -ую часть отрезка $A_0 A_n$, а с другой стороны m -ую часть единицы ϵ , где m и n суть целые числа. Этим исчерпан вопрос об измерении отрезков.

Мы теперь можем без труда определить постоянную k . Если \mathfrak{E}_1 и \mathfrak{E}_2 суть конечные точки того псевдо-отрезка, который принять за единицу длины, при каком угодно положении его в пространстве, то

$$\langle \mathfrak{E}_1 \mathfrak{E}_2 \rangle = 1,$$

а потому

$$1 = k \log \{ \langle \mathfrak{E}_1 \mathfrak{E}_2 \rangle \}. \quad (22)$$

Результат всего этого исследования мы выразим таким образом:

VIII. Длина отрезка AB в гиперболическом пространстве представляет собой число, которое зависит от положения крайних точек A и B отрезка относительно абсолютной поверхности, т. е. поверхности, на которой расположены бесконечно удаленные точки; именно, длина отрезка

отличается только постоянным множителем от логарифма ангармонического отношения конечных точек A и B отрезка и бесконечно-удаленных точек прямой AB :

$$\langle AB \rangle = k \log \left(\frac{AU}{AI} : \frac{BU}{BI} \right) = k \log \left(\frac{A''U}{A''I} : \frac{B''U}{B''I} \right),$$

$$1 = k \log \{ \mathfrak{C}_1 \mathfrak{C}_2 \}.$$

Если точка B' совпадает с A'' , а, следовательно, точка B'' с точкой A' , то

$$\langle AB \rangle = k \log \left(\frac{AU}{AI} : \frac{A''U}{A''I} \right) = k \log \left(\frac{AU}{AI} : \frac{A'U}{A'I} \right),$$

т. е.

$$\langle AB \rangle = -\langle AB \rangle, \quad \langle AB \rangle = 0,$$

как оно и должно быть, так как в этом случае псевдо-точка B совпадает с A .

Эллиптическое пространство имеет мнимую абсолютную поверхность, но длина отрезка по прежнему зависит от положения крайних точек отрезка относительно абсолютной поверхности. Однако, мы не будем выводить здесь предложения, соответствующаго теоремѣ VII, так как это можетъ быть осуществлено только методами аналитической геометрии. Оба предложения вмѣстѣ даютъ намъ, однако, возможность хотя бы скромно заглянуть въ сущность мѣроопредѣленія Кели, которое приводить къ совершенно тому же результату и относительно угловъ.

§ 12. Евклидова геометрія въ линейномъ численномъ многообразіи третьей степени.

1. Геометрическіе результаты предыдущаго изслѣдованія доказываютъ, что изысканія въ области основъ нашей науки не только имѣютъ интересъ для теоріи познанія, но сохраняютъ и практическое значеніе, такъ какъ они даютъ, можно сказать, безпредѣльные завоеванія въ области мысли, которыя необходимо должны привести къ строго дедуктивному развитію геометріи: всѣ предложенія геометріи, касающіяся относительнаго положенія точекъ, прямыхъ, плоскостей и другихъ образовъ, которые изъ нихъ составляются, могутъ быть перенесены на любое другое многообразіе объектовъ, если послѣдніе въ надлежащей группировкѣ удовлетворяютъ тѣмъ посылкамъ, изъ которыхъ строго дедуктивно выводятся предложенія геометріи. Форма геометрическихъ образовъ, въ которой мы воспринимаемъ ихъ нашими чувствами,—напримѣръ, преобладаніе линейнаго протяженія прямой, совершенная форма сферы,—все это не имѣетъ ни малѣйшаго значенія для геометріи, какъ таковой. Для вывода теоремъ совершенно не нужно насиловать свое воображеніе представленіемъ беско-

нечно убывающей материальной точки; какъ мы видѣли, ту же роль могутъ играть сферы сѣти или окружности въ связкѣ, если мы принимаемъ ихъ за точки. Болѣе того, мы можемъ теперь показать, что нѣтъ необходимости даже въ томъ, чтобы точки представляли собой пространственные объекты: онѣ могутъ даже не находиться ни въ какой связи съ пространствомъ, если мы умѣемъ развить аналитическую геометрію строго формально, какъ геометрію трехмѣрнаго линейнаго численнаго многообразія. Знанія аналитической геометріи мы здѣсь, однако, не предполагаемъ; напротивъ, читатель, не знакомый еще съ этой областью математики, представляетъ для насъ даже нѣкоторое преимущество, такъ какъ онъ будетъ вынужденъ строго придерживаться опредѣлений, между тѣмъ какъ лицо, освѣдомленное въ аналитической геометріи, можетъ безсознательно воспользоваться своими познаніями и сдѣлать выводы, которые изъ нашихъ опредѣлений вовсе не вытекаютъ.

2. Подъ „точкой“ мы будемъ здѣсь разумѣть любую совокупность трехъ вещественныхъ чиселъ, написанныхъ въ опредѣленной послѣдовательности; двѣ точки (a, b, c) и (a', b', c') мы будемъ считать тождественными только въ томъ случаѣ, если $a = a', b = b', c = c'$. Подъ „плоскостью“ мы будемъ разумѣть совокупность всѣхъ „точекъ“, т. е. совокупность всѣхъ возможныхъ числовыхъ комбинацій x, y, z (по три въ каждой), удовлетворяющихъ уравненію первой степени

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

съ численными коэффициентами A, B, C, D , которые совмѣстно не обращаются въ нуль. Рѣшенія этого „уравненія плоскости“ не мѣняются, если мы умножимъ обѣ его части на какое-либо число. Двѣ плоскости, которыя имѣютъ однѣ и тѣ же точки, мы считаемъ тождественными; ихъ уравненія могутъ отличаться другъ отъ друга развѣ только численнымъ множителемъ. Наконецъ, подъ „прямой“ мы будемъ разумѣть совокупность точекъ, принадлежащихъ двумъ плоскостямъ; тройныя комбинаціи чиселъ (x, y, z) , которыя представляютъ эти точки, удовлетворяютъ, слѣдовательно двумъ уравненіямъ первой степени. Пусть

$$\begin{aligned} f_1(x, y, z) &= A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \quad \text{и} \\ f_2(x, y, z) &= A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{aligned} \quad (1)$$

будутъ уравненія прямой g , а (x', y', z') пусть будетъ точка этой прямой. Въ такомъ случаѣ не только $f_1(x', y', z') = 0$ и $f_2(x', y', z') = 0$, но и

$$\mu f_1(x', y', z') + \lambda f_2(x', y', z') = 0 \quad (2)$$

при любыхъ значеніяхъ чиселъ μ и λ . Каждое рѣшеніе системы (1) удовлетворяетъ также уравненію (2); въ виду того, что это также есть

уравнение первой степени, это означает, что каждая прямая принадлежит бесчисленному множеству различных плоскостей⁶⁴). Чтобы плоскость

$$\alpha f_1(x, y, z) + \lambda f_2(x, y, z) = 0 \quad (3)$$

„проходила через определенную точку (a, b, c) “, т. е. содержала эту точку, необходимо, чтобы

$$\alpha f_1(a, b, c) + \lambda f_2(a, b, c) = 0,$$

откуда

$$\alpha = -\omega f_2(a, b, c), \quad \lambda = \omega f_1(a, b, c),$$

где ω есть коэффициент пропорциональности, который остается произвольным. Если мы подставим эти значения в уравнение (3), то получим уравнение плоскости

$$f_1(x, y, z) f_2(a, b, c) - f_2(x, y, z) f_1(a, b, c) = 0, \quad (4)$$

которая не только содержит прямую g , но и точку (a, b, c) . Это уравнение обращается в тождество $0 = 0$, если $f_1(a, b, c) = 0$ и $f_2(a, b, c) = 0$, т. е. если точка (a, b, c) принадлежит прямой g . Мы можем, таким образом, сказать: через прямую и точку, видя ее лежащую, можно „провести плоскость“.

3. При помощи бесчисленного множества плоскостей, проходящих через прямую g , определяющая ее пара уравнений может быть приведена к очень наглядному виду. Если прямая g была первоначально задана уравнениями (1), и (x', y', z') есть одна из ее точек, то каждое решение системы $f_1(x, y, z) = 0$ и $f_2(x, y, z) = 0$ удовлетворяет также уравнениям

$$f_1(x, y, z) - f_1(x', y', z') = 0, \quad f_2(x, y, z) - f_2(x', y', z') = 0$$

и обратно, так что уравнения

$$\begin{aligned} \varphi_1(x, y, z) &= f_1(x, y, z) - f_1(x', y', z') = A_1(x - x') + B_1(y - y') \\ &\quad + C_1(z - z') = 0 \\ \varphi_2(x, y, z) &= f_2(x, y, z) - f_2(x', y', z') = A_2(x - x') + B_2(y - y') \\ &\quad + C_2(z - z') = 0 \end{aligned} \quad (5)$$

также определяют прямую g . Сь другой стороны, прямая g содержится также в плоскостях

$$\begin{aligned} e_1(x, y, z) &= \alpha_1 \varphi_1(x, y, z) + \lambda_2 \varphi_2(x, y, z) = 0, \\ e_2(x, y, z) &= \lambda_1 \varphi_1(x, y, z) + \alpha_2 \varphi_2(x, y, z) = 0, \end{aligned} \quad (6)$$

⁶⁴) Или иначе, каждая плоскость, выражаемая уравнением вида (2), содержит прямую (1).

гдѣ $\kappa_1, \kappa_2, \lambda_1, \lambda_2$ означают произвольныя числа; эти плоскости навѣрное могутъ служить для опредѣленія прямой g , если φ_1 и φ_2 , обратно, также могутъ быть выражены черезъ e_1 и e_2 , т. е. если опредѣлитель $\kappa_1 \lambda_2 - \kappa_2 \lambda_1$, который мы будемъ обозначать символомъ

$$\kappa_1 \lambda_2 - \kappa_2 \lambda_1 = (\kappa, \lambda) = -(\lambda_1 \kappa_2 - \lambda_2 \kappa_1) = -(\lambda, \kappa), \quad (7)$$

не обращается въ нуль⁶⁵⁾.

Теперь возьмемъ частныя значенія:

$$\kappa_1 = -C_2, \kappa_2 = +C_1; \lambda_1 = -B_2, \lambda_2 = +B_1; \mu_1 = -A_2, \mu_2 = +A_1,$$

изъ которыхъ послѣдняя пара отвѣчаетъ третьей плоскости

$$e_3(x, y, z) = \mu_1 \varphi_1(x, y, z) + \mu_2 \varphi_2(x, y, z) = 0.$$

При помощи простаго вычисленія мы получимъ, пользуясь символическимъ обозначеніемъ (7):

$$\begin{aligned} (C, A)(x - x') - (B, C)(y - y') &= 0, \\ (A, B)(x - x') - (B, C)(z - z') &= 0, \\ (A, B)(y - y') - (C, A)(z - z') &= 0. \end{aligned} \quad (8)$$

Эти уравненія попарно опредѣляютъ прямую g , если опредѣлители (κ, λ) , (λ, μ) , (μ, κ) , или $-(B, C)$, $-(A, B)$, $-(C, A)$ отличны отъ нуля. Если бы эти опредѣлители были всѣ три равны нулю, то мы бы имѣли:

$$A_2 = \varepsilon A_1, \quad B_2 = \varepsilon B_1, \quad C_2 = \varepsilon C_1,$$

гдѣ ε есть коэффициентъ пропорціональности, т. е. плоскости (5) были бы тождественны, что не имѣетъ мѣста. Поэтому, по крайней мѣрѣ, одно изъ чиселъ (A, B) , (B, C) , (C, A) отлично отъ нуля; такимъ образомъ, уравненія (8) даютъ, по крайней мѣрѣ, одну пару, опредѣляющую прямую g ; если мы къ этимъ двумъ уравненіямъ присоединимъ третье, то это не можетъ повредить дѣлу, потому что каждое рѣшеніе этихъ двухъ уравненій удовлетворяетъ также третьему. Изъ уравненій (8) прежде всего вытекаетъ

$$\begin{aligned} (x - x') : (y - y') &= (B, C) : (C, A); \quad (x - x') : (z - z') = (B, C) : (A, B); \\ (y - y') : (z - z') &= (C, A) : (A, B). \end{aligned}$$

если ни одинъ изъ опредѣлителей не обращается въ нуль; такимъ образомъ, мы получаемъ для прямой g трехчленную пропорцію:

⁶⁵⁾ Если этотъ опредѣлитель отличенъ отъ нуля, то система уравненій

$$e_1(x, y, z) = 0, \quad e_2(x, y, z) = 0$$

эквивалентна системѣ (2).

$$(x - x') : (y - y') : (z - z') = (B, C) : (C, A) : (A, B), \quad (9)$$

которой мы будемъ. однако, пользоваться и въ томъ случаѣ, когда не всѣ определители въ правой части отличны отъ нуля; именно, въ этомъ случаѣ мы отъ этой пропорціи снова перейдемъ къ опредѣленной системѣ уравнений (8)⁶⁶). Во всѣхъ случаяхъ уравненія (9) опредѣляютъ, такимъ образомъ, нашу прямую, проходящую черезъ точку (x', y', z') ; и обратно, каждой системѣ уравнений

$$(x - x') : (y - y') : (z - z') = a : b : c \quad (10)$$

отвѣчаетъ прямая, если три числа a, b, c не обращаются совмѣстно въ нуль, и прямая эта проходитъ черезъ точку (x', y', z') . Отсюда слѣдуетъ, что черезъ двѣ точки (x', y', z') и (x'', y'', z'') всегда проходитъ одна и только одна прямая. Въ самомъ дѣлѣ, подставляя x'', y'', z'' въ уравненіе (10), мы получаемъ соответствующее нашей прямой трехчленное отношеніе: $a : b : c = (x'' - x') : (y'' - y') : (z'' - z')$, и „уравненіе“ нашей прямой, какъ мы будемъ выражаться короче, приметъ видъ:

$$(x - x') : (y - y') : (z - z') = (x'' - x') : (y'' - y') : (z'' - z'). \quad (11)$$

4. Такъ какъ мы можемъ раздѣлить уравненіе плоскости

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad (12)$$

на одинъ изъ коэффициентовъ, то оно, по существу, содержитъ только 3 постоянныхъ. Эти постоянныя мы можемъ опредѣлить, если даны три точки (x', y', z') , (x'', y'', z'') , (x''', y''', z''') , расположенныя въ этой плоскости. Можно, наиримѣръ, опредѣлить отношенія $A : D, B : D, C : D$ изъ уравненій:

$$\begin{aligned} Ax' + By' + Cz' + D &= 0, \\ Ax'' + By'' + Cz'' + D &= 0, \\ Ax''' + By''' + Cz''' + D &= 0. \end{aligned} \quad (13)$$

Эти уравненія не опредѣляютъ однозначно неизвѣстныхъ отношеній только въ томъ случаѣ, если (извѣстныя) коэффициенты одного изъ этихъ уравненій выражаются одной и той же линейной зависимостью черезъ коэффициенты каждаго изъ двухъ другихъ уравненій:

$$Ax''' = \lambda Ax' + \lambda' Ay', \quad y''' = \lambda y' + \lambda' y'', \quad z''' = \lambda z' + \lambda' z'', \quad 1 = \lambda + \lambda'. \quad (14)$$

Но отсюда $Ax''' - x' = (\lambda - 1)x' + \lambda x'' = \lambda(x'' - x')$, такъ что:

$$(x''' - x') : (y''' - y') : (z''' - z') = (x'' - x') : (y'' - y') : (z'' - z'),$$

⁶⁶) Если бы, наиримѣръ, $(A, B) = 0$, то пропорція

$$(x - x') : (z - z') = (B, C) : (A, B)$$

потеряла бы смыслъ: по мы ее замѣнили бы вторымъ уравненіемъ (8).

т. е. точка (x'', y'', z'') лежит на прямой, проходящей через точки (x', y', z') и (x'', y'', z'') :

$$(x - x') : (y - y') : (z - z') = (x'' - x') : (y'' - y') : (z'' - z').$$

Итак, три точки, не лежащая на одной прямой, всегда определяют плоскость, ибо при этих условиях уравнения (13), служащая для определения отношений $A : D$, $B : D$, $C : D$, друг от друга не зависят.

5. Мы таким образом убеждаемся, что наши основные образы обладают всеми теми свойствами обыкновенных точек, прямых и плоскостей, которые касаются определения этих образов по данным элементам, а также общих элементов двух образов (см. § 8, I). Теперь нужно еще присвоить „точкам“ наших „прямых“ понятие „между“. Как известно, расположение точек на прямой находит полное изображение в ряду вещественных чисел: число z либо лежит „между“ двумя числами a , b — тогда $a \leq z \leq b$ —, либо не лежит между ними; в последнем случае либо $z < a$, либо $z > b$. Соотношение „между“, таким образом, несомненно имеет место на прямой $x = 0$, $y = 0$, ибо точки этой прямой имеют вид $(0, 0, z)$, где z пробегает через все вещественные значения. Эту прямую мы будем называть „осью z -овь“. Точно так же на оси y -овь $x = 0$, $z = 0$ и на оси x -овь $y = 0$, $z = 0$ понятие „между“ определяется „большим“ или „меньшим“ значением соответствующего числа. Точки этих трех осей имеют вид $(x, 0, 0)$, $(0, y, 0)$, $(0, 0, z)$; мы можем поэтому установить соответствие между точками этих трех прямых таким образом, что отнесем друг другу те точки, в которых числа, отличные от нуля, имеют одинаковые значения. Этим устанавливается также соответствие между расположениями точек на трех прямых: то, что в этом отношении можно сказать относительно точек одной прямой, справедливо также относительно соответствующих точек другой прямой. Поэтому, чтобы установить требуемое расположение точек на прямой, отличной от этих трех осей, нам остается только однозначно отобразить ее на одной из трех осей. Это достигается следующим (предварительным) определением: Точка $P = (x, y, z)$ некоторой прямой лежит „между“ двумя другими ее точками $P_1 = (a_1, b_1, c_1)$ и $P_2 = (a_2, b_2, c_2)$, если

$$\begin{array}{l} \text{точка } (x, 0, 0) \text{ лежит между точками } (a_1, 0, 0) \text{ и } (a_2, 0, 0). \\ \text{„ } (0, y, 0) \text{ „ „ „ } (0, b_1, 0) \text{ и } (0, b_2, 0), \\ \text{„ } (0, 0, z) \text{ „ „ „ } (0, 0, c_1) \text{ и } (0, 0, c_2); \end{array}$$

при этом принимается, что относительно точки Q на оси можно сказать, что она лежит между Q и Q . Эти условия не независимы одно от другого. В самом деле, так как уравнение прямой можно представить в двояком виде:

$$(x - a_1) : (y - b_1) : (z - c_1) = (a_2 - a_1) : (b_2 - b_1) : (c_2 - c_1) \quad \text{и}$$

$$(x - a_2) : (y - b_2) : (z - c_2) = (a_1 - a_2) : (b_1 - b_2) : (c_1 - c_2),$$

то

$$\frac{x - a_1}{x - a_2} = \frac{y - b_1}{y - b_2} = \frac{z - c_1}{z - c_2} = \lambda_3, \quad (15)$$

гдѣ „параметръ“ λ_3 можетъ, очевидно, принимать всѣ вещественныя значенія, кромѣ $\lambda_3 = 1$; при $\lambda_3 = 1$ мы бы имѣли $a_1 = a_2$, $b_1 = b_2$, $c_1 = c_2$, что, разумѣется, противорѣчитъ предположенію, что P_1 и P_2 суть двѣ различныя точки. Обратнo, каждому вещественному значенію числа λ_3 (кромѣ $\lambda_3 = 1$) отвѣчаетъ точка прямой P_1P_2 . Въ частности, мы должны допустить также значеніе $\lambda_3 = \infty$.

Если теперь точка P лежитъ между точками P_1 и P_2 въ смыслѣ приведеннаго опредѣленія, то въ каждой изъ трехъ паръ разностей

$$x - a_1 \text{ или } x - a_2; \quad y - b_1 \text{ или } y - b_2; \quad z - c_1 \text{ или } z - c_2$$

одна необходимо имѣетъ положительное, другая отрицательное значеніе; поэтому и λ_3 имѣетъ отрицательное значеніе. Обратнo, если λ_3 имѣетъ отрицательное значеніе, то предыдущія разности имѣютъ попарно противоположныя знаки. Напротивъ, если точка P_3 не лежитъ между точками P_1 и P_2 , то тѣ же разности имѣютъ попарно одинаковыя знаки, такъ что λ_3 имѣетъ положительное значеніе. Итакъ, точка P_3 лежитъ между точками P_1 и P_2 или не лежитъ между ними, смотря по тому, имѣетъ ли параметръ λ_3 отрицательное значеніе или положительное.

Совокупность всѣхъ точекъ прямой, расположенныхъ между точками P_1 и P_2 , называется „отрѣзкомъ“ P_1P_2 ; остальные точки прямой лежатъ на „продолженіяхъ“ отрѣзка P_1P_2 .

Изъ уравненій (15) мы получаемъ такъ называемое „параметрическое“ выраженіе точекъ прямой:

$$x_3 = \frac{a_1 - \lambda_3 a_2}{1 - \lambda_3}, \quad y_3 = \frac{b_1 - \lambda_3 b_2}{1 - \lambda_3}, \quad z_3 = \frac{c_1 - \lambda_3 c_2}{1 - \lambda_3}, \quad (16)$$

изъ котораго вновь легко усмотрѣть, что параметръ λ_3 не можетъ равняться 1. Точно такъ же въ формѣ

$$x_1 = \frac{a_2 - \lambda_1 a_3}{1 - \lambda_1}, \quad y_1 = \frac{b_2 - \lambda_1 b_3}{1 - \lambda_1}, \quad z_1 = \frac{c_2 - \lambda_1 c_3}{1 - \lambda_1} \quad \text{и}$$

$$x_2 = \frac{a_3 - \lambda_2 a_1}{1 - \lambda_2}, \quad y_2 = \frac{b_3 - \lambda_2 b_1}{1 - \lambda_2}, \quad z_2 = \frac{c_3 - \lambda_2 c_1}{1 - \lambda_2} \quad (16')$$

выражаются точки прямыхъ P_2P_3 и P_3P_1 , гдѣ $P_3 = (a_3, b_3, c_3)$ есть точка, не принадлежащая прямой P_1P_2 .

Три точки P_1, P_2, P_3 образуют „треугольник“, отрезки $\overline{P_1P_2}, \overline{P_2P_3}, \overline{P_3P_1}$ его „стороны“.

Пусть S_1, S_2, S_3 будут точки пересечения прямых P_2P_3, P_3P_1, P_1P_2 с некоторой прямой, которая расположена в плоскости треугольника η и служит пересечением последней с другой вспомогательной плоскостью

$$Ax + By + Cz + D = 0.$$

Системы чисел, представляющие собой точки S_1, S_2, S_3 , имеют вид (16) или (16') и должны удовлетворять уравнению вспомогательной плоскости. Мы получаем таким образом по одному линейному уравнению для определения параметров $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ ⁶⁷⁾; мы найдем:

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= \frac{Aa_2 + Bb_2 + Cc_2 + D}{Aa_3 + Bb_3 + Cc_3 + D}, \\ \lambda_2 &= \frac{Aa_3 + Bb_3 + Cc_3 + D}{Aa_1 + Bb_1 + Cc_1 + D}, \\ \lambda_3 &= \frac{Aa_1 + Bb_1 + Cc_1 + D}{Aa_2 + Bb_2 + Cc_2 + D} \end{aligned} \quad (17)$$

и отсюда получим очень важное соотношение:

$$\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 1. \quad (18)$$

Это соотношение представляет собой аналитическое выражение известной теоремы Менелая, но на этом мы не будем останавливаться. Мы воспользуемся этим соотношением только для доказательства „аксиомы расположения в плоскости“ (Гильберт), которую мы приводили выше (§ 8, II₄). Прямая, расположенная в плоскости треугольника, либо встречает две его стороны (не продолжения их), либо не встречает ни одной. В самом деле, в виду соотношения (18) из трех параметров $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ либо два имеют отрицательные значения, либо ни один.

Этим доказано предложение II₄, а вместе с тем все предложения I и II.

6. Мы переходим теперь к конгруэнтности. Два отрезка мы будем называть конгруэнтными, если они имеют одинаковую „длину“,

⁶⁷⁾ Каждая точка прямой P_1P_2 выражается уравнениями (16), в которых λ_3 имеет соответствующее значение. Если мы хотим определить то значение параметра λ_3 , которое отвечает точке пересечения прямой P_1P_2 с прямой s , то мы должны принять во внимание, что соответствующие значения x_3, y_3, z_3 удовлетворяют уравнению вспомогательной плоскости

$$Ax + By + Cz + D = 0;$$

подставляя их сюда, мы получим значение λ_3 . Таким же образом получим значения параметров λ_2 и λ_1 , соответствующую точкам пересечения прямых P_2P_3 и P_3P_1 с прямой s .

а два угла мы будем называть конгруэнтными, если они имѣютъ одинаковое „измѣрѣніе“; то и другое понятіе намъ еще предстоитъ установить. Отрѣзку, имѣющему кончныя точки (x, y, z) и (x', y', z') мы отнесемъ положительное число l , опредѣляемое формулой

$$l = \sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2}, \quad (19)$$

которое мы и будемъ называть его „длиной“. Число это не мѣняется, если мы замѣняемъ его крайнія точки другъ другомъ; „длину“ отрѣзка мы будемъ также называть „разстояніемъ“ его концовъ.

Тригонометрическихъ функцій мы, конечно, не можемъ здѣсь ввести обыкновеннымъ способомъ; напротивъ, мы опредѣлимъ ихъ совершенно независимо отъ какихъ бы то ни было геометрическихъ соображеній показательнымъ рядомъ (т. I, § 118):

$$2 \cos \varphi = e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}, \quad 2i \sin \varphi = e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}, \quad i = \sqrt{-1}.$$

Двумъ отрѣзкамъ $P_1 P_2 = d_2$ и $P_1 P_3 = d_3$, выходящимъ изъ общей точки $P_1 (a_1, b_1, c_1)$ и имѣющимъ кончныя точки $P_2 = (a_2, b_2, c_2)$ и $P_3 = (a_3, b_3, c_3)$, мы при помощи формулы

$$d_2 d_3 \cos \varphi_1 = (a_2 - a_1)(a_3 - a_1) + (b_2 - b_1)(b_3 - b_1) + (c_2 - c_1)(c_3 - c_1) \quad (20)$$

и добавочнаго условія $\varphi_1 \leq \pi$ однозначно отнесемъ уголь или, вѣрнѣе, отвлеченное число φ_1 , которое мы назовемъ „угломъ между этими двумя отрѣзками“; φ_1 называется также числомъ, измѣряющимъ этотъ уголь. Однако, придерживаясь этой терминологіи, не нужно придавать этимъ выраженіямъ никакого содержанія помимо того, которое въ нихъ вложено опредѣленіемъ⁶⁸⁾. Косинусъ угла φ_1 , какъ и въ обыкновенной тригонометріи, представляетъ собой правильную дробь, которая можетъ принимать всѣ значенія отъ -1 до $+1$; въ самомъ дѣлѣ, еѣ числитель Z по абсолютной величинѣ не превышаетъ знаменателя N , ибо, если мы въ тождествѣ

$$\begin{aligned} & (A_1^2 + B_1^2 + C_1^2)(A_2^2 + B_2^2 + C_2^2) - (A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2)^2 \\ & = (A_1 B_2 - A_2 B_1)^2 + (B_1 C_2 - B_2 C_1)^2 + (C_1 A_2 - C_2 A_1)^2 \end{aligned}$$

положимъ

$$\begin{aligned} A_1 &= a_2 - a_1, & B_1 &= b_2 - b_1, & C_1 &= c_2 - c_1, \\ A_2 &= a_3 - a_1, & B_2 &= b_3 - b_1, & C_2 &= c_3 - c_1, \end{aligned}$$

то получимъ для разности $N^2 - Z^2$ сумму трехъ квадратовъ, которая не можетъ имѣть отрицательныхъ значеній, а потому $N^2 - Z^2 \geq 0$, $N \geq Z$.

⁶⁸⁾ Иными словами, при указанномъ въ текстѣ заданіи точекъ P_1, P_2, P_3 мы подъ угломъ φ_1 будемъ разумѣть не что иное, какъ число φ_1 , опредѣляемое уравненіемъ (20).

Если мы напишем уравнения двухъ прямыхъ, на которыхъ лежатъ наши отрѣзки:

$$(x - a_1) : (y - b_1) : (z - c_1) = u_2 : v_2 : w_2,$$

$$(x - a_1) : (y - b_1) : (z - c_1) = u_3 : v_3 : w_3,$$

при чемъ первая прямая проходитъ, скажемъ, черезъ точку (a_2, b_2, c_2) , а вторая черезъ точку (a_3, b_3, c_3) , то

$$u_2 : v_2 : w_2 = (a_2 - a_1) : (b_2 - b_1) : (c_2 - c_1),$$

$$u_3 : v_3 : w_3 = (a_3 - a_1) : (b_3 - b_1) : (c_3 - c_1),$$

такъ что

$$\kappa u_2 = a_2 - a_1, \quad \kappa v_2 = b_2 - b_1, \quad \kappa w_2 = c_2 - c_1,$$

$$\lambda u_3 = a_3 - a_1, \quad \lambda v_3 = b_3 - b_1, \quad \lambda w_3 = c_3 - c_1,$$

гдѣ κ и λ суть коэффициенты пропорциональности. Вставляя эти выраженія въ уравненія (20), получимъ:

$$\cos \varphi_1 = \pm \frac{u_2 u_3 + v_2 v_3 + w_2 w_3}{\sqrt{u_2^2 + v_2^2 + w_2^2} \sqrt{u_3^2 + v_3^2 + w_3^2}}.$$

Хотя коэффициенты κ и λ здѣсь опять исчезли, но двойной знакъ остается въ силѣ, потому что корни должны быть здѣсь взяты съ такими знаками, чтобы длины d_2 и d_3 , фигурирующія въ равенствѣ (20), имѣли положительныя значенія; такъ, напримѣръ, радикалъ

$$\sqrt{(a_2 - a_1)^2 + (b_2 - b_1)^2 + (c_2 - c_1)^2} = \sqrt{\kappa^2(u_2^2 + v_2^2 + w_2^2)}$$

при отрицательномъ κ нужно взять въ такомъ видѣ:

$$- \kappa \sqrt{u_2^2 + v_2^2 + w_2^2}.$$

Итакъ, двѣ прямыя опредѣляютъ два дополнительныхъ угла, а два отрѣзка—только одинъ уголъ, при условіи, что углы считаются не выше π .

Именно, чтобы получить, такимъ образомъ, однозначное опредѣленіе угла, мы ограничили его значеніе въ формулѣ (20).

7. Чтобы вычислить теперь треугольникъ, опредѣляемый тремя точками

$$P_1 = (a_1, b_1, c_1), \quad P_2 = (a_2, b_2, c_2), \quad P_3 = (a_3, b_3, c_3),$$

мы положимъ:

$$P_3 P_1 P_2 = q_1, \quad \therefore P_1 P_2 P_3 = q_2, \quad \therefore P_2 P_3 P_1 = q_3,$$

$$P_2 P_3 = d_1, \quad P_3 P_1 = d_2, \quad P_1 P_2 = d_3.$$

Въ виду соотношения (20):

$$\begin{aligned} d_1 d_2 \cos \varphi_3 &= (a_1 - a_3)(a_2 - a_3) + (b_1 - b_3)(b_2 - b_3) + (c_1 - c_3)(c_2 - c_3), \\ d_2 d_3 \cos \varphi_1 &= (a_2 - a_1)(a_3 - a_1) + (b_2 - b_1)(b_3 - b_1) + (c_2 - c_1)(c_3 - c_1), \\ d_3 d_1 \cos \varphi_2 &= (a_3 - a_2)(a_1 - a_2) + (b_3 - b_2)(b_1 - b_2) + (c_3 - c_2)(c_1 - c_2), \end{aligned} \quad (21)$$

гдѣ

$$\begin{aligned} d_1 &= \sqrt{(a_2 - a_3)^2 + (b_2 - b_3)^2 + (c_2 - c_3)^2}, \\ d_2 &= \sqrt{(a_3 - a_1)^2 + (b_3 - b_1)^2 + (c_3 - c_1)^2}, \\ d_3 &= \sqrt{(a_1 - a_2)^2 + (b_1 - b_2)^2 + (c_1 - c_2)^2}. \end{aligned} \quad (22)$$

Складывая уравненія (21) попарно, мы получимъ:

$$\begin{aligned} d_1 &= d_2 \cos \varphi_3 + d_3 \cos \varphi_2, \\ d_2 &= d_3 \cos \varphi_1 + d_1 \cos \varphi_3, \\ d_3 &= d_1 \cos \varphi_2 + d_2 \cos \varphi_1. \end{aligned} \quad (23)$$

Опредѣляя теперь изъ первыхъ двухъ уравненій (23) $\cos \varphi_2$ и $\cos \varphi_1$ и подставляя въ третье, мы получимъ:

$$d_3^2 = d_1^2 + d_2^2 - 2d_1 d_2 \cos \varphi_3. \quad (24)$$

Это есть такъ называемая „теорема косинусовъ“ элементарной тригонометрии. При $\varphi = \frac{1}{2}\pi$ мы получаемъ отсюда, какъ частный случай, теорему Пифагора; формулы (23) опредѣляютъ въ этомъ случаѣ $\cos \varphi_2$ и $\cos \varphi_1$ по отношеніямъ сторонъ прямоугольнаго треугольника.

Простое слѣдствіе теоремы косинусовъ представляетъ собой теорема синусовъ. Въ самомъ дѣлѣ, такъ какъ $\sin^2 \varphi_3 = 1 - \cos^2 \varphi_3$, то соотношение (24) даетъ:

$$\begin{aligned} 4d_1^2 d_2^2 \sin^2 \varphi_3 &= 4d_1^2 d_2^2 - (d_3^2 - d_1^2 - d_2^2)^2 \\ &= (2d_1 d_2 - d_3^2 + d_1^2 + d_2^2)(2d_1 d_2 + d_3^2 - d_1^2 - d_2^2) \\ &= ((d_1 + d_2)^2 - d_3^2)(d_3^2 - (d_1 - d_2)^2) = 16\Delta^2, \end{aligned}$$

гдѣ мы, для сокращенія, положили

$$d_1 + d_2 + d_3 = 2s \quad (25)$$

и

$$\Delta = \sqrt{s(s-d_1)(s-d_2)(s-d_3)}. \quad (26)$$

Такимъ образомъ,

$$d_1 d_2 \sin \varphi_3 = d_2 d_3 \sin \varphi_1 = d_3 d_1 \sin \varphi_2 = 2\Delta, \quad (27)$$

при чемъ корень долженъ быть здѣсь взять съ положительнымъ знакомъ, такъ какъ уголъ, меньшій π , не можетъ имѣть отрицательнаго синуса.

Соотношение (27) есть не что иное, как теорема синусовъ плоской тригонометрии:

$$\sin \varphi_1 : \sin \varphi_2 : \sin \varphi_3 = d_1 : d_2 : d_3. \quad (28)$$

Если мы раздѣлимъ первое изъ уравненій (23) на одно изъ трехъ чиселъ d и ихъ отношенія, по теоремѣ синусовъ (28), замѣнимъ отношеніями синусовъ соответствующихъ угловъ φ , то получимъ:

$$\sin \varphi_1 = \sin \varphi_2 \cos \varphi_3 \div \cos \varphi_2 \sin \varphi_3,$$

или, согласно теоремѣ сложения,

$$\sin \varphi_1 = \sin(\varphi_2 \div \varphi_3); \quad (29)$$

точно такъ же

$$\sin \varphi_2 = \sin(\varphi_3 \div \varphi_1), \quad \sin \varphi_3 = \sin(\varphi_1 \div \varphi_2). \quad (30)$$

Такимъ образомъ, либо

$$\varphi_1 \div \varphi_2 \div \varphi_3 = \pi, \quad (31)$$

либо

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= \varphi_2 - \varphi_3, \\ \varphi_2 &= \varphi_3 \div \varphi_1, \\ \varphi_3 &= \varphi_1 \div \varphi_2. \end{aligned} \quad (32)$$

т. е. $\varphi_1 \div \varphi_2 \div \varphi_3 = 0$; отсюда мы получили бы, однако, $\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi_3 = 0$, такъ какъ всѣ углы имѣютъ положительныя значенія. Но тогда уравненія (23) дають: $d_1 \div d_2 \div d_3 = 0$, и опять, стало быть, $d_1 = d_2 = d_3 = 0$; это же невозможно, потому что соотношение $d_1 = 0$, напримѣръ, дасть:

$$(a_2 - a_3)^2 \div (b_2 - b_3)^2 \div (c_2 - c_3)^2 = 0;$$

такъ какъ здѣсь всѣ три слагаемыя могутъ имѣть только положительныя значенія, то они всѣ должны обращаться въ нуль, т. е. точки P_2 и P_3 должны совпадать. Итакъ, изъ двухъ исключаяющихъ другъ друга допущеній (31) и (32) послѣднее неправильно, а потому: сумма угловъ въ треугольникѣ составляетъ два прямыхъ.

8. Угловъ треугольника вполне опредѣляется своимъ косинусомъ, между тѣмъ какъ данному синусу всегда отвѣчаютъ два угла, дополняющіе другъ друга до двухъ прямыхъ. Это сказывается при вычисленіи треугольника по даннымъ его сторонамъ или угламъ. Если треугольникъ опредѣляется данными элементами однозначно, то онъ „конгруэнтенъ“ всякому другому треугольнику, въ которомъ эти элементы имѣютъ тѣ же значенія, т. е. треугольники имѣютъ одинаковыя стороны и одинаковыя углы между соответственными сторонами; это мы припомнимъ здѣсь за опредѣленіе конгруэнтности. Этимъ путемъ мы должны,

следовательно, придти къ четыремъ предложеніямъ о конгруэнтности треугольниковъ. Прежде всего, если въ треугольникѣ даны двѣ стороны d_1 и d_2 и уголъ „между ними заключенный“ φ_3 , то мы сначала по теоремѣ косинусовъ опредѣлимъ однозначно положительное число d_3 ; затѣмъ мы опредѣлимъ $\cos\varphi_1$ и $\cos\varphi_2$, следовательно, также φ_1 , φ_2 , однозначно при помощи той же теоремы, хотя этотъ именно способъ вычисления не можетъ считаться наиболее удобнымъ. Первая теорема о конгруэнтности, такимъ образомъ, имѣетъ мѣсто въ нашей геометріи. Если даны сторона d_3 и два „прилежащихъ“ угла φ_1 и φ_2 , то двѣ другія стороны d_1 и d_2 опредѣляются проща всего по теоремѣ синусовъ, такъ какъ третій уголъ $\varphi_3 = \pi - \varphi_1 - \varphi_2$ извѣстенъ. Этимъ доказана вторая теорема о конгруэнтности треугольниковъ. Конгруэнтность двухъ треугольниковъ, имѣющихъ одинаковыя стороны, непосредственно очевидна, такъ какъ углы могутъ быть однозначно опредѣлены по теоремѣ косинусовъ. Для доказательства послѣдней теоремы о конгруэнтности треугольниковъ намъ нужна лемма, что въ треугольникѣ противъ большей стороны лежитъ больший уголъ. Если мы изъ второго уравненія (23) вычтемъ первое, то мы получимъ:

$$d_3(\cos\varphi_1 - \cos\varphi_2) = -(1 + \cos\varphi_3)(d_1 - d_2),$$

такъ что:

$$\frac{\cos\varphi_1 - \cos\varphi_2}{d_1 - d_2} = -\frac{2\cos^2\frac{1}{2}\varphi_3}{d_3}. \quad (33)$$

Правая часть этого равенства во всякомъ случаѣ имѣетъ отрицательное значеніе, такъ какъ въ дробѣ знаменатель d_3 всегда есть положительное число, а числитель представляетъ собой квадратъ. Если поэтому $d_1 > d_2$, то $\cos\varphi_1 - \cos\varphi_2$ есть отрицательное число, а поэтому $\cos\varphi_2 > \cos\varphi_1$, т. е. $\varphi_1 > \varphi_2$, такъ какъ въ интервалѣ отъ 0 до π съ возрастаніемъ угла косинусъ уменьшается. Наша лемма, такимъ образомъ, доказана. Если поэтому по даннымъ d_1 , d_2 и φ_1 мы опредѣлимъ уголъ φ_2 при помощи теоремы синусовъ, то изъ двухъ возможныхъ угловъ, согласно нашей леммѣ, нужно взять острый уголъ, и треугольникъ такимъ образомъ опредѣляется однозначно. Итакъ, два треугольника конгруэнтны, если двѣ стороны и уголъ, противолежащій большей сторонѣ, одного треугольника равны тѣмъ же элементамъ другого треугольника.

9. Этимъ установлено, что въ нашей геометріи остаются въ силѣ всѣ теоремы о конгруэнтности. Намъ недостаетъ еще только характернаго предложенія Евклидовой геометріи, пятого постулата: черезъ данную точку проходить одна и только одна прямая, расположенная съ данной прямой въ одной плоскости и не встрѣчающая ея.

Это предложение легче всего доказать, пользуясь соображениями п. 5-го. Пусть P_1P_2 будет данная прямая, S_1 данная точка и s параллель, которую нам нужно провести. Мы называем две прямые в плоскости параллельными, если они не имеют общих точек. Поэтому, чтобы прямая s была параллельна прямой P_1P_2 , выражение (16) для точки S_3 должно перестать существовать; как мы указали в замечании к уравнениям (15), это наступает только в том случае, если λ_3 принимает недопустимое для него значение 1. Так как точка S_1 дана, то, в виду соотношений (17), $\lambda_1 \geq 1$; далее, вследствие соотношения (18) в этом случае $\lambda_1\lambda_2 = 1$, а потому λ_2 также не равно 1; этим устанавливается действительная точка S_2 . Прямая S_1S_2 представляет собой, таким образом, единственную параллель к прямой P_1P_2 (69). Формулы (16'), в виду соотношения $\lambda_1\lambda_2 = 1$, после простого вычисления дают:

$$x_2 - x_1 = -\frac{a_2 - a_1}{1 - \lambda_1}, \quad y_2 - y_1 = -\frac{b_2 - b_1}{1 - \lambda_1}, \quad z_2 - z_1 = -\frac{c_2 - c_1}{1 - \lambda_1};$$

итак, — прямая, проходящая через точку $S_1 = (x_1, y_1, z_1)$ параллельно прямой

$$(x - a_1) : (y - b_1) : (z - c_1) = (a_2 - a_1) : (b_2 - b_1) : (c_2 - c_1), \quad (34)$$

иметь уравнение

$$(x - x_1) : (y - y_1) : (z - z_1) = (a_2 - a_1) : (b_2 - b_1) : (c_2 - c_1). \quad (35)$$

*) Это рассуждение, кажется, недостаточно ясно. Автор возвращается к обозначениям, принятым в п. 5. Три точки P_1, P_2, P_3 , не расположенные на одной прямой, определяют собой плоскость. Каждая точка (x_3, y_3, z_3) на прямой P_1P_2 может быть выражена уравнениями (16), где λ_3 есть определенное число, отличное от 1; и обратно, при любом значении параметра λ_3 , отличном от 1, уравнения (16) выражают точку на прямой P_1P_2 . Таким же образом уравнения (16') выражают точки прямых P_2P_3 и P_3P_1 . Если мы разъем эти три прямые четвертой прямой s , расположенной в той же плоскости и именно представляющей собой сечение этой плоскости с плоскостью

$$Ax + By + Cz + D = 0, \quad (!)$$

то точки пересечения S_1, S_2, S_3 выразятся теми же уравнениями (16) и (16'), причем параметры $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ будут иметь значения (17), которые дают

$$\lambda_1\lambda_2\lambda_3 = 1. \quad (II)$$

Теперь автор ставит вопрос как: положим, что точка S_1 нам задана; при каких условиях прямая, представляющая собой сечение плоскости $P_1P_2P_3$ с плоскостью (!) и проходящая через точку S_1 , будет параллельна прямой P_1P_2 ?

Чтобы прямая была параллельна прямой P_1P_2 , необходимо и достаточно, чтобы точка S_2 не существовала, т. е. чтобы $\lambda_2 = 1$. С другой стороны, так как точка S_1 дана, то дано значение λ_1 , отличное от 1. Но в каком случае соотношение (!) даст однозначно значение λ_3 , определяющее точку S_3 , и, стало быть, требованию удовлетворить одна и только одна прямая S_1S_3 .

Наша цель, таким образом, достигнута. Дальнейшее развитие элементарной геометрии уже не представляет никаких затруднений, и потому мы этим здесь заниматься не будем. В заключение мы остановимся еще только на аналитических предпосылках предложения о параллельности.

10. Прямая z оказывается параллельной прямой P_1P_2 , потому что при $\lambda_3 = 1$ выражения, определяющая точку S_3 , принимают вид:

$$x_3 = \frac{a_1 - a_2}{0}, \quad y_3 = \frac{b_1 - b_2}{0}, \quad z_3 = \frac{c_1 - c_2}{0}.$$

Если, однако, мы дадим параметру λ_3 значение $\neq 1$ не непосредственно, а будем давать ему значения, постоянно возрастающие от 0 и неограниченно приближающиеся к 1, то числа x_3, y_3, z_3 будут возрастать ⁷⁰⁾ безпредельно. В предельном случае мы получаем, таким образом, бесконечно большие „значения“ $x_\infty, y_\infty, z_\infty$ чисел x_3, y_3, z_3 , которые сохраняют, однако, конечные отношения:

$$x_\infty : y_\infty : z_\infty = (a_1 - a_2) : (b_1 - b_2) : (c_1 - c_2).$$

Если мы теперь расширим определение точки в том смысле, что допустим также бесконечно большие „значения“ чисел x, y, z , с тем, однако, чтобы они сохраняли конечные отношения, и такого рода точки назовем „несобственными“, то мы должны будем каждой прямой

$$(x - a_1) : (y - b_1) : (z - c_1) = (a_2 - a_1) : (b_2 - b_1) : (c_2 - c_1)$$

приписать одну и только одну несобственную точку $(x_\infty, y_\infty, z_\infty)$ и именно так, что

$$x_\infty : y_\infty : z_\infty = (a_2 - a_1) : (b_2 - b_1) : (c_2 - c_1).$$

Как непосредственно обнаруживает заключительное предложение п. 9-го, две прямые будут в этом случае параллельны, если они имеют общую несобственную точку ⁷¹⁾.

Если (x_3', y_3', z_3') и (x_3'', y_3'', z_3'') суть две собственные точки прямой P_1P_2 с параметрами $\lambda_3 = \lambda'$ и $\lambda_3 = \lambda''$, то простое вычисление дает:

$$x_3' - x_3'' = (a_1 - a_2)\lambda, \quad y_3' - y_3'' = (b_1 - b_2)\lambda, \quad z_3' - z_3'' = (c_1 - c_2)\lambda,$$

где

$$\lambda = (\lambda' - \lambda'') (1 - \lambda') (1 - \lambda''),$$

так что

$$V(x_3' - x_3'')^2 + (y_3' - y_3'')^2 + (z_3' - z_3'')^2 = + \lambda d_{12},$$

⁷⁰⁾ По абсолютной величинѣ.

⁷¹⁾ См. дополнение (!) в концѣ книги.

гдѣ d_1 имѣетъ значеніе, выражаемое формулой (22). Поэтому разстояніе точекъ (x_3', y_3', z_3') и (x_3'', y_3'', z_3'') возрастаетъ безпредѣльно, если параметръ x' сохранять постоянное значеніе, отличное отъ 1, а другой параметръ x'' возрастаетъ отъ 0 до 1; это значитъ: несобственная точка прямой имѣетъ безконечно большое разстояніе отъ каждой изъ собственныхъ ея точекъ.

Сущность понятія о несобственной точкѣ лучше всего выясняется, если опредѣляемъ точку не тремя, а четырьмя конечными действительными числами, при томъ, однако, соглашеніи, чтобы при вещественномъ значеніи множителя q , отличномъ отъ 0, системы чиселъ (x_1, x_2, x_3, x_4) и (qx_1, qx_2, qx_3, qx_4) представляли одну и ту же точку x , а числа $(0, 0, 0, 0)$ не представляли бы точки въ этой геометріи \mathfrak{G} . Плоскость и прямая опредѣляются, какъ въ геометріи \mathfrak{M} предельныхъ пунктовъ: плоскость — линейнымъ однороднымъ уравненіемъ

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_4x_4 = 0, \quad (36)$$

которое мы короче будемъ выражать символомъ $a(x) = 0$; коэффициентами этого уравненія служатъ вещественныя числа, которыя не обращаются совмѣстно въ нуль; прямая опредѣляется, какъ совокупность точекъ, общихъ двумъ различнымъ плоскостямъ. Двѣ плоскости $a(x) = 0$ и $b(x) = 0$ считаютъ тождественными, если онѣ содержатъ тѣ же точки, г. е. если можно опредѣлить множитель q такимъ образомъ, что $a_1 = qb_1$, $a_2 = qb_2$, $a_3 = qb_3$, $a_4 = qb_4$. Условіе, чтобы двѣ плоскости не совпадали, можно формулировать такъ, что величины $(a, b)_{11}$, $(a, b)_{22}$, $(a, b)_{33}$ не должны быть равны нулю, гдѣ для краткости полагаемъ:

$$(a, b)_{kk} = a_k b_k - a_k b_k; \quad (37)$$

такъ какъ $(a, b)_{kk}$ равняется нулю тождественно, то мы можемъ сказать вообще: четыре величины $(a, b)_{1k}$, $(a, b)_{2k}$, $(a, b)_{3k}$, $(a, b)_{4k}$ (при произвольномъ k) не должны обращаться въ нуль совмѣстно. Точно такъ же двѣ точки (x_1, x_2, x_3, x_4) и (y_1, y_2, y_3, y_4) различны, если четыре величины $(x, y)_{1k}$, $(x, y)_{2k}$, $(x, y)_{3k}$, $(x, y)_{4k}$ ни при какомъ k не обращаются совмѣстно въ нуль. По двумъ различнымъ точкамъ x и y прямой $a(x) = 0$ и $b(x) = 0$ мы получаемъ безчисленное множество другихъ ея точекъ при помощи формулы:

$$z_k = x_k \lambda + y_k \lambda, \quad h = (1, 2, 3, 4), \quad (38)$$

гдѣ коэффициенты x и λ могутъ принимать всевозможныя конечныя значенія; въ самомъ дѣлѣ, совершенно ясно, что $a(z) = \lambda a(x) + \lambda a(y) = 0$, $b(z) = \lambda b(x) + \lambda b(y) = 0$, такъ какъ въ отдѣльности $a(x) = 0$, $a(y) = 0$, $b(x) = 0$, $b(y) = 0$. Формула (38) замѣнила бы, такимъ образомъ, параметрическое выраженіе прямой (16), если бы можно было обнаружить,

что какдое общее рѣшеніе уравненій $a(\zeta) = 0$ и $b(\zeta) = 0$ при надлежащемъ выборѣ постоянныхъ p и q можетъ быть представлено формулой:

$$\tilde{\zeta}_b = x_b p + y_b q \quad (b = 1, 2, 3, 4). \quad (39)$$

Но возможность рѣшить совмѣстныя уравненія

$$\begin{aligned} \tilde{\zeta}_b &= x_b p + y_b q, \\ \tilde{\zeta}_k &= x_k p + y_k q \end{aligned}$$

относительно p и q зависитъ отъ того, обращается ли опредѣлитель $(x, y)_{h,k}$ въ нуль, или нѣтъ. Такъ какъ точки x, y другъ отъ друга различны, то опредѣлители $(x, y)_{h,k}$ не могутъ обращаться въ нуль при всѣхъ комбинаціяхъ указателей h, k . Положимъ поэтому, что опредѣлитель $(x, y)_{a,\beta}$ отличенъ отъ нуля. Тогда мы можемъ привести $\tilde{\zeta}_a$ и $\tilde{\zeta}_\beta$ къ виду:

$$\tilde{\zeta}_a = x_a p + y_a q, \quad \tilde{\zeta}_\beta = x_\beta p + y_\beta q. \quad (40)$$

Къ индексамъ a, β мы присоединимъ индексы γ, δ такимъ образомъ, чтобы числа a, β, γ, δ представляли некоторую перестановку чиселъ 1, 2, 3, 4. Тогда изъ уравненій $a(\zeta) = 0$ и $b(\zeta) = 0$ вытекаеть:

$$a(\zeta) b_\alpha - b(\zeta) a_\alpha = 0;$$

или подробно:

$$\begin{aligned} (a, b)_{1\beta} \tilde{\zeta}_1 + (a, b)_{2\beta} \tilde{\zeta}_2 + (a, b)_{3\beta} \tilde{\zeta}_3 + (a, b)_{4\beta} \tilde{\zeta}_4 &= 0, \text{ или} \\ (a, b)_{a\alpha} \tilde{\zeta}_a + (a, b)_{\beta\alpha} \tilde{\zeta}_\beta + (a, b)_{\gamma\alpha} \tilde{\zeta}_\gamma + (a, b)_{\delta\alpha} \tilde{\zeta}_\delta &= 0. \end{aligned} \quad (41)$$

Этимъ уравненіямъ удовлетворяютъ также x_1, x_2, x_3, x_4 и y_1, y_2, y_3, y_4 . Изъ нихъ, въ виду соотношеній (40), вытекаеть:

$$\begin{aligned} ((a, b)_{a\mu} x_\mu + (a, b)_{\beta\mu} x_\mu) p + ((a, b)_{a\mu} y_\mu + (a, b)_{\beta\mu} y_\mu) q \\ + (a, b)_{\gamma\mu} \tilde{\zeta}_\gamma + (a, b)_{\delta\mu} \tilde{\zeta}_\delta = 0; \end{aligned}$$

а такъ какъ величины x и y сами также удовлетворяютъ уравненіямъ (41), то:

$$\begin{aligned} -((a, b)_{\gamma\mu} x_\mu + (a, b)_{\delta\mu} x_\mu) p - ((a, b)_{\gamma\mu} y_\mu + (a, b)_{\delta\mu} y_\mu) q \\ + (a, b)_{\gamma\mu} \tilde{\zeta}_\gamma + (a, b)_{\delta\mu} \tilde{\zeta}_\delta = 0, \end{aligned}$$

такъ что

$$(a, b)_{\gamma\mu} \{ \tilde{\zeta}_\gamma - p x_\gamma - q y_\gamma \} + (a, b)_{\delta\mu} \{ \tilde{\zeta}_\delta - p x_\delta - q y_\delta \} = 0.$$

Теперь, если $(a, b)_{\gamma,\delta}$ не равно нулю, то, полагая въ этомъ уравненіи $\mu = \delta$ или $\mu = \gamma$, получимъ:

$$\begin{aligned} \tilde{\zeta}_\gamma &= p x_\gamma + q y_\gamma, \\ \tilde{\zeta}_\delta &= p x_\delta + q y_\delta. \end{aligned} \quad (42)$$

Съ другой стороны, такъ какъ равенство $(a, b)_{\gamma, \delta} = 0$, въ виду уравнений (41) (при $\mu = \delta$), влекло бы за собой уравненіе:

$$(a, b)_{a\delta} \tilde{z}_a + (a, b)_{\delta\delta} \tilde{z}_\delta = 0,$$

которому должны также удовлетворять x_a, x_δ и y_a, y_δ . то мы имѣли бы: $x_a : x_\delta = y_a : y_\delta$; это противорѣчить сдѣланному допущенію, что $(x, y)_{a\delta}$ не равно нулю. Итакъ, соотношеніе $(a, b)_{\gamma, \delta} = 0$ не можетъ имѣть мѣста, и мы такимъ образомъ доказали, что всѣ точки прямой могутъ быть выражены по двумъ изъ нихъ въ формѣ:

$$z_h = x_h p + y_h q. \quad (43)$$

Мы огобразимъ теперь геометрію однородныхъ координатъ \mathfrak{H} въ прежней неоднородной системѣ \mathfrak{B} , полагая:

$$\begin{aligned} \frac{\tilde{z}_1}{\tilde{z}_4} &= x, & \frac{\tilde{z}_2}{\tilde{z}_4} &= y, & \frac{\tilde{z}_3}{\tilde{z}_4} &= \tilde{z}, \\ \frac{x_1}{x_4} &= x', & \frac{x_2}{x_4} &= y', & \frac{x_3}{x_4} &= \tilde{z}', \\ \frac{y_1}{y_4} &= x'', & \frac{y_2}{y_4} &= y'', & \frac{y_3}{y_4} &= \tilde{z}''; \end{aligned} \quad (44)$$

здѣсь слѣва стоятъ координаты пространства \mathfrak{H} , справа — пространства \mathfrak{B} , такъ что смѣшать ихъ съ обозначеніями въ уравненіяхъ (16) и (16') нельзя. Теперь выраженія (43) даютъ:

$$x = \frac{x_1 p + y_1 q}{x_4 p + y_4 q} = \left(\frac{x_1}{x_4} + \frac{y_1}{y_4} \frac{q}{p} \frac{y_4}{x_4} \right) / \left(1 + \frac{q}{p} \frac{y_4}{x_4} \right) = \frac{x' - \lambda y''}{1 - \lambda},$$

гдѣ

$$\lambda = - \frac{q}{p} \frac{y_4}{x_4},$$

и однородное параметрическое выраженіе прямой принимаетъ прежній видъ:

$$x = \frac{x' - \lambda y''}{1 - \lambda}, \quad y = \frac{y' - \lambda y''}{1 - \lambda}, \quad \tilde{z} = \frac{\tilde{z}' - \lambda \tilde{z}''}{1 - \lambda}$$

Значенію параметра $\lambda = 1$, которое мы прежде считали недопустимымъ, соответствуетъ теперь равенство $p x_4 + q y_4 = 0$, т. е. $\tilde{z}_4 = 0$. Иными словами: въ геометріи \mathfrak{B} значенію параметра $\lambda = 1$ не отвѣчала собственная точка прямой; между тѣмъ въ геометріи \mathfrak{H} этому значенію отвѣчаетъ та точка прямой, которая лежитъ въ плоскости $\tilde{z}_4 = 0$. Съ точки зрѣнія геометріи \mathfrak{B} мы можемъ такимъ образомъ сказать: несобственнымъ точкамъ пространства \mathfrak{B} отвѣчаютъ въ пространствѣ \mathfrak{H} точки плоскости $\tilde{z}_4 = 0$; двѣ прямыя

или плоскости въ пространствѣ (§ параллельны, если онѣ пересѣкаются въ точкѣ или, соответственно, по прямой этой плоскости. Можно поэтому сказать, что несобственные точки пространства (§ образуютъ „несобственную“ плоскость, которая съ каждой собственной плоскостью имѣетъ общую прямую — „несобственную“ прямую этой плоскости. Такова современная „проективная“ точка зрѣнія на параллелизмъ ⁷²⁾.

§ 13. Сущность основныхъ понятій.

1. Первымъ и важнѣйшимъ результатомъ изложеннаго изслѣдованія является то, что Евклидова геометрія не содержитъ никакого противорѣчія; въ самомъ дѣлѣ, мы обнаружили существованіе, по крайней мѣрѣ, одного многообразія, или комплекса, составленнаго изъ тройныхъ числовыхъ группъ, элементы котораго, будучи поставлены въ надлежащую другъ отъ друга зависимость, вполне подходятъ подъ основныя опредѣленія и основныя предложенія Евклидовой геометрії. Конечно, эти элементы, а вмѣстѣ съ тѣмъ и вся эта геометрія, не имѣютъ вовсе конкретного существованія; устанавливая понятіе „о длинѣ“ и „объ углѣ“, мы категорически указывали, что здѣсь подъ этими понятіями не нужно разумѣть рѣшительно ничего, кромѣ чиселъ, опредѣленнымъ образомъ отнесенныхъ къ другимъ числамъ. Но именно то обстоятельство, что обыкновенныхъ свойствъ арифметическихъ чиселъ оказалось достаточно, чтобы отобразить систему Евклидовой геометрії такимъ образомъ, что каждое ея предложеніе остается въ силѣ въ этой геометрії чиселъ, и, обратно, каждое предложеніе арифметической геометрії можетъ быть перенесено въ пространство, именно это удостовѣряетъ, что основныя понятія и основныя положенія Евклидовой геометрії другъ съ другомъ вполне совмѣстимы.

Установивъ отсутствіе противорѣчій въ Евклидовой геометрії, мы тѣмъ самымъ устанавливаемъ правильность двухъ неевклидовыхъ геометрій, такъ какъ эти послѣднія только вмѣстѣ съ Евклидовой геометріей остаются правильными или падаютъ: построенная въ сферической сѣти арифметической геометрії предыдущаго параграфа ни эллиптическая ни гиперболическая геометрія никогда не можетъ привести къ логическому противорѣчію. Такъ какъ, съ другой стороны, отсюда вытекаетъ, что постулатъ о параллельныхъ линіяхъ не представляетъ собой логическаго слѣдствія остальныхъ понятій и посылокъ геометрії, то намъ не покажется уже страннымъ, что та точка зрѣнія на параллелизмъ, которая, какъ мы выяснили въ предыдущемъ параграфѣ, установилась въ ученіи о перспективѣ и въ проективной гео-

⁷²⁾ Еще разъ указываемъ, что къ выясненію этихъ идей мы еще возвратимся въ особомъ дополненіи въ концѣ книги.

метрии, также оказывается логически допустимой. Согласно этой теории, параллельные прямые также имеют точку пересечения, которая, однако, как „несобственная“ точка, принадлежит особой плоскости пространства— „несобственной“ плоскости. На это, однако, можно либо смотреть только как на описательное выражение того факта, что точка пересечения в действительности не существует, либо же можно представлять себя „несобственную“ плоскость, как действительно существующую. В строго абстрактной геометрии такое выделение одной плоскости из всех остальных представлять собой, конечно, акт произвольный, но сам по себе вполне допустимый. Так как, с другой стороны, эта особая плоскость, как таковая, от остальных плоскостей ничем не отличается, то мы можем сказать: с точки зрения на параллелизм, установившейся в проективной геометрии, эллиптическая геометрия, в которой все плоскости, а также все прямые одной и той же плоскости всегда пересекаются друг с другом, представляет собой абстрактную основу параболической и гиперболической геометрии; в самом деле, путем введения в гиперболическую геометрию идеальных точек и прямых, мы достигаем, того, что и в этой геометрии все плоскости и все прямые в плоскости взаимно пересекаются.

Евклидова геометрия в параболической сфере дает возможность установить еще четвертую точку зрения на геометрическую бесконечность, также не содержащую внутреннего противоречия: здесь всем прямым и плоскостям отнесена одна общая точка на бесконечности⁷³⁾. Параллелизм здесь определяется, как и в Евклидовой геометрии, тем, что прямые не пересекаются, при чем несобственная точка за точку пересечения не считается. Впрочем, на обыкновенное Евклидово пространство можно также смотреть, как на предельный случай параболической сферы, центр которой уходит в бесконечность. Окружности и сферы при этом переходят в „действительные“ прямые и плоскости.

2. То обстоятельство, что оказываются возможными (по крайней мере) четыре совершенно различных, даже противоречивых точки зрения на бесконечность и на параллелизм, наводит на очень серьезные размышления. В самом деле, кто станет теперь серьезно утверждать, что геометрия исключительно описывает „факты“ пространственного восприятия? Разве, говоря о бесконечно удаленных элементах, мы не имеем перед собой чисто абстрактных построений, которые остаются за пределами не только каждого возможного опыта, но и всякого вообще опыта, какой мы только можем себе представить; не обнаруживается ли здесь ясно, что не только представления оказывают влияние на понятие,

⁷³⁾ Это общая точка, через которую проходят все сферы сферы.

но и обратно: понятие оказывает свое влияние на наше представление? Это вопросы, которые настойчиво приходят в голову каждому мыслящему человеку. Прежде, чем мы рѣшимся дать отвѣты на эти вопросы, будетъ полезно нѣсколько обстоятельнѣе выяснить при помощи тѣхъ средствъ, которыя развиты въ § 12, что здѣсь затронуты также интересы чисто математическаго характера. Въ § 12, I мы показали высокое значеніе логическаго анализа нашихъ пространственныхъ представлений и чисто логическаго построенія геометріи. Оно заключается въ томъ, что предложенія геометріи, построенной строго формально, применимы ко всякому линейному трехмѣрному многообразію, т. е. къ каждой системѣ объектовъ, которые находятся другъ съ другомъ соответственно въ такихъ же соотношеніяхъ, какъ точки, прямыя и плоскости. Выраженіе псевдо-точка, псевдо-прямая, псевдо-плоскость были термины, которыми мы пользовались во избѣжаніе смѣшенія съ обычными понятіями; будемъ ихъ называть генеръ основными образами „нулевой“, „первой“, „второй“ ступени, или, короче, \mathfrak{S}_0 , \mathfrak{S}_1 , \mathfrak{S}_2 ; самое многообразіе пусть будетъ \mathfrak{S}_3 ; слово „ступень“ означаетъ здѣсь то же, что и измѣреніе. Основные образы нулевой ступени мы будемъ также называть элементами, какъ это принято въ ученіи о комплексахъ. Вся эта терминологія находитъ себѣ оправданіе въ томъ, что, помимо сферическихъ сѣтей, существуетъ еще безчисленное множество трехмѣрныхъ многообразій, какъ мы это сейчасъ обнаружимъ, такъ что точки, прямыя и плоскости могутъ быть разсматриваемы, какъ индивидуумы родовыхъ понятій \mathfrak{S}_0 , \mathfrak{S}_1 , \mathfrak{S}_2 .

3. Изъ дидактическихъ соображеній представляется нецѣлесообразнымъ съ самаго начала развивать абстрактную геометрію, какъ геометрію трехмѣрныхъ линейныхъ многообразій, потому что самое понятіе это не дается непосредственнымъ представленіемъ, а предполагаетъ уже обыкновенную геометрію. Лишь тогда, когда обыкновенная геометрія развита уже настолько, что мы имѣемъ въ своемъ распоряженіи достаточно примѣровъ линейныхъ многообразій третьей ступени, мы можемъ освободить наши теоремы отъ обычныхъ точекъ, прямыхъ и плоскостей, которыя служатъ ихъ субстратомъ; мы можемъ показать, что образы \mathfrak{S}_0 , \mathfrak{S}_1 , \mathfrak{S}_2 этихъ многообразій также удовлетворяютъ (Гильбертовымъ) аксіомамъ геометріи и, слѣдовательно, и логическимъ ихъ слѣдствіямъ; но съ этого момента геометрія должна уже разливаться совершенно абстрактно въ примененія ко всѣмъ извѣстнымъ и мыслимымъ многообразіямъ.

Если, напримѣръ, обыкновенная геометрія строго абстрактно развита въ такой мѣрѣ, что мы владѣемъ уже теоріей сферической сѣти, то мы имѣемъ въ параболической сѣти первое переоблаченіе Евклидовой гео-

метріи (не включая сюда лишь ученія о безконечности⁷⁴). Если мы далѣе назовемъ пары точекъ, окружности и сферы гиперболической и эллиптической сѣти псевдо-точками, псевдо-прямыми и псевдо-плоскостями и обнаружимъ, что онѣ удовлетворяютъ всѣмъ аксіомамъ Евклидовой геометріи, кромѣ аксіомы о параллельныхъ линіяхъ, то мы можемъ утверждать, не повторяя вновь никакихъ доказательствъ, что къ нимъ применимы всѣ предложенія Евклидовой геометріи, не зависяція отъ аксіомы о параллельности.

Далѣе, средствами проективной геометріи мы можемъ построить теорію кривыхъ второго порядка совершенно независимо отъ какихъ бы то ни было метрическихъ соображеній; эта теорія непосредственно распространяется на сферическія сѣти, если разсматривать послѣднія опять какъ псевдо-пространства. Изъ кривыхъ и поверхностей второго порядка этой псевдо-геометріи мы разсмотрѣли выше только псевдо-окружности и псевдо-сферы; гораздо интереснѣе, однако, общіе образы второго порядка, теорію которыхъ мы можемъ заимствовать изъ обыкновенной геометріи безъ малѣйшихъ доказательствъ. И, что особенно изыацію, съ точки зрѣнія обыкновенной геометріи это оказываются кривыя и поверхности четвертаго порядка (циклиды), непосредственное изслѣдованіе которыхъ представляетъ большія затрудненія. Между тѣмъ, перенося на нихъ готовый матеріалъ, мы неожиданно приобретаемъ неизсякаемый источникъ геометрическаго познанія. Достаточно указать на ученіе о полюсахъ и полярсахъ.

Такимъ образомъ, геометрію каждаго трехмѣрнаго линейнаго многообразія можно изучать съ двухъ совершенно различныхъ точекъ зрѣнія, постепенно переходя на практикѣ отъ одной къ другой, хотя по существу онѣ совершенно различны: мы можемъ разсматривать основные образы нулевой, первой и второй степени \mathcal{G}_0 , \mathcal{G}_1 , \mathcal{G}_2 многообразія \mathcal{G}_3 то какъ образы обыкновенной геометріи, и тогда они имѣютъ очень сложную природу, то какъ объекты, аналогичные точкамъ, прямымъ и плоскостямъ обыкновенной геометріи, удовлетворяющіе всѣмъ ея аксіомамъ; тогда и слѣдствія этихъ аксіомъ могутъ быть применимы къ \mathcal{G}_0 , \mathcal{G}_1 , \mathcal{G}_2 . Такимъ образомъ, умственная работа, затраченная на построеніе чисто абстрактной геометріи послужитъ неизсякаемымъ источникомъ новыхъ истинъ. Итакъ, не изъ пренебреженія къ творческой силѣ интуиціи, не изъ склонности къ разрушительной критикѣ или педантичной логикѣ, но изъ строго взысканныхъ интересовъ нашей науки надо настаивать на строгой кодификаціи ея предпосылокъ, чтобы ея предло-

⁷⁴ Если въ Евклидову геометрію вводятся „безконечно удаленныя“ точки, то онѣ заполняютъ „безконечно удаленную“ плоскость; въ параболической же сѣти имѣется только одна „безконечно удаленная“ точка (см. прим. 73).

женія сразу приобрѣтали всю ту силу, которая имъ дѣйстви- тельно принадлежитъ. Это—требованіе, которое, по Маху, принято называть „экономіей мышленія“.

4. Еще и по другой причинѣ представляется желательнымъ владѣть, такъ сказать, нѣсколькими геометрическими языками и развитъ нѣкоторую упругость нашего воображенія. Именно, въ геометріи трехмѣрнаго пространства имѣются задачи, которыя, по аналитическому своему характеру, скорѣе падаютъ въ область пространствъ четырехъ и большаго числа измѣреній. При этомъ въ первоначальной своей формѣ онѣ не поддаются синтетическому изслѣдованію, потому что мы не привыкли разсматривать Евклидово про- странство, какъ образъ третьей ступени въ четырехмѣрномъ пространствѣ. Между тѣмъ въ Евклидовомъ пространствѣ имѣется много линейныхъ многообразій четырехъ и болѣе высокаго числа измѣреній. Наиболѣе извѣстно многообразіе всѣхъ сферъ: чтобы установить центръ сферы, должны быть даны его разстоянія отъ трехъ взаимно перпендикулярныхъ плоскостей; радіусъ представляетъ собой четвертое численное заданіе. Итакъ, существуетъ четырехкратно-бесконечное множество сферъ, т. е. элементы многообразія всѣхъ сферъ отличаются одинъ отъ другого четырьмя числовыми заданіями, которыя могутъ принимать всевозможныя вещественныя значенія. Всѣ сферы образуютъ, по этой причинѣ, четырех- мѣрное многообразіе \mathfrak{S}_4 . Это многообразіе линейное, т. е. каждыя два образа \mathfrak{S}_3 (сѣти) опредѣляютъ одинъ образъ \mathfrak{S}_2 (связку); каждыя три \mathfrak{S}_3 опредѣляютъ одно \mathfrak{S}_1 (пучекъ); наконецъ, каждыя четыре \mathfrak{S}_3 одно \mathfrak{S}_0 (сферу). Иначе: каждыя два \mathfrak{S}_0 опредѣляютъ одно \mathfrak{S}_1 ; каждыя три \mathfrak{S}_0 , не принадлежащія одному \mathfrak{S}_1 , устанавливаютъ одно \mathfrak{S}_2 ; наконецъ, четыре элемента, не принадлежащія одному образу \mathfrak{S}_2 , опредѣляютъ одно \mathfrak{S}_3 . Аналогично опредѣляется принципъ линейности для многообразій пяти и болѣе высокаго числа измѣреній. Аналитически линейности много- образія соответствуетъ тотъ фактъ, что основные его образы въ коорди- натахъ выражаются „линейными“ уравненіями, т. е. уравненіями первой степени.

Если мы наткнемся на задачу, которая (съ точки зрѣнія аналити- ческой геометріи) приводитъ къ тому, чтобы разсматривать пространство точекъ, прямыхъ и плоскостей, какъ основной образъ третьей ступени въ четырехмѣрномъ линейномъ многообразіи, то достаточно перенести задачу на многообразіе сферъ—и мы будемъ въ состояніи подойти къ задачѣ чисто синтетически, сдѣлать ее наглядной. Однако, такой переходъ изъ одного многообразія въ другое допустимъ только въ томъ предположеніи, что оба многообразія подчиняются однимъ и тѣмъ же аксіомамъ и ихъ геометріи опираются исключительно на эти аксіомы; какъ только мы въ до- казательствахъ допускаемъ мѣтѣвы, не имѣющіе чисто логическаго харак- тера, то такого рода перенесеніе не можетъ а priori считаться законнымъ.

Что существуют геометрические задачи, которые удовлетворительно разрешаются лишь в том случае, когда мы их переносим в многообразии более высокого числа измерений, в этом мы имеем уже случай убедиться на теореме Дезарга (см. § 10, 1). Это предложение, истинное только для треугольников на плоскости, образует основу синтетической геометрии плоскости. Но в то время, как все остальные предложения этой планиметрии могут быть доказаны средствами плоской геометрии и при том чисто синтетически, т. е. без помощи аксиом конгруэнтности, найти такое доказательство для этого основного предложения не удавалось; наконец, Гильберт в своих „Основаниях геометрии“ (§ 23) обнаружил, что все старания в этом направлении необходимо должны остаться тщетными. Гильберт показал, что это предложение необходимо предполагает либо пространственную геометрию, либо аксиомы конгруэнтности. Но так как аксиомы конгруэнтности противны духу чистого синтеза⁷⁵⁾, то это планиметрическое предложение синтетически может быть доказано только при помощи пространства трех измерений и именно при помощи простых соображений, изложенных нами выше в § 10, 1.

5. Насколько задача может иногда получить неожиданно яркое освещение, когда мы переносим ее в другое многообразие, это мы постараемся выяснить на примере, тесно примыкающем к теореме Дезарга.

Под плоской конфигурацией $Kf.(n_k)$ разумьют систему, состоящую из n точек и n прямых на плоскости, которые расположены таким образом, что через каждую точку системы проходит k ее прямых и на каждой из прямых системы лежит k ее точек. Пространственная конфигурация $Kf.(n_k, g_s)$ есть система, составленная из n точек, n плоскостей и g прямых следующим образом: через каждую точку системы проходит k ее плоскостей и в каждой плоскости системы лежит k ее точек; каждая же прямая проходит через s точек и лежит в s плоскостях.

Определение всех конфигураций, соответствующих данным значениям чисел n, g, k, s , представляет очень интересную, но трудную задачу, которая ждет еще полного решения. В нижеследующем мы дадим два первых члена бесконечного ряда конфигураций, принадлежащих, однако, пространствам возрастающего числа измерений. Очень

⁷⁵⁾ Что идея конгруэнтности чужда духу чисто синтетической геометрии, это, конечно, дело точки зрения и, во всяком случае, зависит от тех предположений, которые мы сами ставим чистой геометрии. Но дело заключается в том, что теорема Дезарга есть основное предложение проективной геометрии, а этой дисциплины идея о конгруэнтности действительно остается совершенно чуждой.

простую плоскую конфигурацию и именно Кф. (10₂) дает фигура теоремы Дезарга, если мы берем перспективные треугольники, расположенные в одной плоскости η . Как показывает фигура 47, мы можем каждую из 10 точек этой конфигурации поместить двумя индексами из ряда чисел 1, 2, 3, 4, 5 таким образом, что каждая из 10 возможных (парных) комбинаций фигурирует только один раз, а пары индексов, принадлежащая точкам одной прямой, составлены только из трех различных цифр, которые таким образом могут служить для обозначения этой прямой. Такое положение дѣла наводит на мысль, что, быть может, в трехмерном пространстве можно взять систему из пяти точек $\mathbb{F}_1, \mathbb{F}_2, \mathbb{F}_3, \mathbb{F}_4, \mathbb{F}_5$ таким образом, что точка



Фиг. 47.

h, k этой конфигурации служить сечением плоскости η сь прямою $\mathbb{F}_h \mathbb{F}_k$, прямая же конфигурации b, k, l служи́т сечением плоскости η сь плоскостью $\mathbb{F}_b \mathbb{F}_k \mathbb{F}_l$ ($b, k, l = 1, 2, 3, 4, 5$). Это действительно оказывается возможным,

и плоская конфигурация Кф. (10₂) оказывается, таким образом, сечением плоскости сь совершенным пятиугольником в пространстве, т. е. сь системой 5 точек, прямых, соединяющих их попарно, и плоскостей, соединяющих их по три.

Это наводит на мысль разсмотреть, восходя къ пространству, два перспективных тетраэдра, т. е. два тетраэдра, вершины ко-

торых вследствие особаго ихъ расположения могутъ быть приведены въ соответствие такимъ образомъ, что прямая, соединяющая соответственныя вершины, проходить черезъ одну точку. Изъ этого задания нетрудно вывести путемъ повторнаго примѣненія теоремы Дезарга, что соответствующія грани и ребра двухъ тетраэдровъ пересѣкаются въ точкахъ и по прямымъ, расположеннымъ въ одной плоскости. Фигура, которую мы такимъ образомъ получаемъ, образуетъ конфигурацію Кф. (15₆, 20₃). Какъ показываетъ фиг. 48, ея точки могутъ быть обозначены индексами 1, 2, 3, 4, 5, 6 (подобно фигурѣ 47) такимъ образомъ, что каждая изъ 15 возможныхъ паръ цифръ фигурируетъ только одинъ разъ, пары же точки одной прямой нашей конфигураціи составлены только изъ трехъ цифръ, пары точекъ одной плоскости — изъ четырехъ; эти тройныя и четверныя комбинаціи могутъ служить для обозначенія соответствующихъ

прямых и плоскостей. По аналогии с Kf. (10₉) мы естественно приходим к мысли о полном шестиугольнике $\Psi_1 \Psi_2 \Psi_3 \Psi_4 \Psi_5 \Psi_6$ в четырехмерном пространстве, сечение которого с трехмерным пространством R_E нашей Евклидовой геометрии давало бы конфигурацию Kf. (15₆, 20₃); точка h, k , прямая h, k, l , плоскость h, k, l, m нашей конфигурации представляли бы тогда сечение пространства R_E с прямой $\Psi_h \Psi_k$, с плоскостью $\Psi_h \Psi_k \Psi_l$, с трехмерным пространством $\Psi_h \Psi_k \Psi_l \Psi_m$ ($h, k, l, m = 1, 2, 3, 4, 5, 6$). Аналитически это предположение очень легко подтверждается^{*)}:

но провести все эти вычисления чисто геометрически очень трудно, потому что мы не можем наглядно представить пространство R_E в виде образа в пространстве R_4 . Но так как мы знаем, что все сферы, пучки, связки, и сеты сфер могут быть рассматриваемы, как основные образы нулевой, первой, второй и третьей степени линейного многообразия \mathcal{G}_4 , то эта трудность легко устраняется, если мы переносим исследование в многообразии всех сфер. Образы $\mathcal{G}_0, \mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2, \mathcal{G}_3$ этого многообразия мы будем называть псевдо-точками, псевдо-прямыми, псевдо-плоскостями шестиугольника с псевдо-пространством R представляет собой конфигурацию Kf. (15₆, 20₃), которая открыта таким образом не только для геометрического исследования, но и для непосредственного созерцания. В дальнейших подробностях мы здесь входить не можем, мы должны были бы



Фиг. 48.

стиами, псевдо-пространствами; мы вообразим здесь шесть произвольных псевдо-точек $\Psi_1, \Psi_2, \Psi_3, \Psi_4, \Psi_5, \Psi_6$ так, что через каждая две псевдо-точки проходить одна псевдо-прямая, через каждая три псевдо-точки одна псевдо-плоскость, через каждая четыре — одно псевдо-пространство. „Сечение“, т. е. совокупность общих элементов этого „совершенного“ четырехмерного

^{*)} См. работы Рихмонда и Функа о конфигурации Kf. (15₆, 20₃): Richmond, Math. Ann. 53, R Funck. (Strassburg, Diss. 1901).

только упомянуть еще об одном обстоятельстве. Къ числу псевдо-пространствъ принадлежит также пространство точекъ, прямыхъ и плоскостей Евклидовой геометріи, какъ предѣльный случай параболической сѣти съ бесконечно удаленнымъ центромъ. Сѣченіе четырехмѣрнаго совершеннаго шестиугольника съ этимъ частнымъ (псевдо-)пространствомъ даетъ конфигурацію Kf. (15₆, 20₃) въ обыкновенныхъ точкахъ, прямыхъ и плоскостяхъ; именно, это не что иное, какъ радикальныя плоскости каждаго двухъ, радикальныя оси каждаго трехъ, радикальные центры каждаго четырехъ изъ шести сферъ, которыя представляютъ собой псевдо-вершины шестиугольника.

Если мы даже оставимъ совершенно въ сторонѣ то случайное, особенно благоприятное для насъ совпаденіе, что изслѣдуемая конфигурація, въ концѣ концовъ, приняла свою первоначальную форму, то отображеніе нашей задачи въ геометріи сферъ, само по себѣ, уже представляетъ значительное завоеваніе, такъ какъ область синтетической геометріи расширяется благодаря этому на цѣлое измѣреніе. То же повторяется во многихъ другихъ случаяхъ. Поэтому представляется желательнымъ познакомиться нѣсколько ближе съ объемомъ понятія о линейномъ многообразіи; для яснаго же пониманія сущности основныхъ геометрическихъ понятій это и само по себѣ необходимо. Мы вынуждены при этомъ предполагать знакомство съ началами аналитической геометріи. Кто ими не владѣетъ, тому придется принять выводы слѣдующаго пункта на вѣру.

6. Мы будемъ пользоваться обыкновенной прямоугольной системой координатъ x, y, z , хотя бы тѣми, которыми мы пользовались въ § 12. Точки поверхности n -го порядка опредѣляются уравненіемъ n -ой степени $f(x, y, z) = 0$, точки алгебраической кривой — общими рѣшеніями s такихъ уравненій. Эти s уравненій $g_1 = 0, g_2 = 0, g_3 = 0, \dots, g_s = 0$ можно соединить въ одно $\varphi = 0$, если мы положимъ

$$\varphi = g_1 u_1 + g_2 u_2 + g_3 u_3 + \dots + g_s u_s,$$

и ограничимся только такими рѣшеніями уравненія $\varphi = 0$, которыя не зависятъ отъ неопредѣленныхъ параметровъ $u_1, u_2, u_3, \dots, u_s$. При такомъ соглашеніи относительно значений, обращающихъ функцію φ въ нуль, ее принято называть функціоналомъ.

Если поверхности $f_1 = 0, f_2 = 0, \dots, f_r = 0$ имѣютъ только систему изолированныхъ общихъ точекъ, въ крайнемъ случаѣ, хотя бы только одну точку, то, приравнивая функціональ $\varphi = f_1 v_1 + f_2 v_2 + \dots + f_r v_r$ съ неопредѣленными коэффициентами нулю, мы выразимъ эту систему точекъ. Если же эти поверхности вовсе не имѣютъ общихъ точекъ, то уравненіе $\varphi = 0$ не выражаетъ никакого геометрическаго мѣста. Итакъ, отмѣтимъ первый результатъ нашихъ соображеній:

Съ помощью функционаловъ можно выразить наиболѣе общій алгебраическій образъ, состоящій изъ отдѣльныхъ системъ точекъ $\phi_1=0, \phi_2=0, \phi_3=0, \dots, \phi_p=0$, отдѣльныхъ кривыхъ $\varphi_1=0, \varphi_2=0, \varphi_3=0, \dots, \varphi_k=0$ и отдѣльныхъ поверхностей $f_1=0, f_2=0, \dots, f_m=0$, выразить при помощи одного уравненія $\Omega=0$, гдѣ

$$\Omega = \phi_1 \phi_2 \phi_3 \dots \phi_p \cdot \varphi_1 \varphi_2 \varphi_3 \dots \varphi_k \cdot f_1 f_2 \dots f_m.$$

Два такихъ алгебраическихъ образа $\Omega=0$ и $\Omega'=0$ опредѣляютъ пучекъ Ω , именно $\alpha\Omega + \lambda\Omega' = 0$; три такихъ образа, не принадлежащие одному пучку, опредѣляютъ связку Ω , именно $\alpha\Omega + \lambda\Omega' + \mu\Omega'' = 0$; наконецъ, четыре образа, не принадлежащие одной связкѣ, опредѣляютъ сѣть Ω , именно $\alpha\Omega + \lambda\Omega' + \mu\Omega'' + \nu\Omega''' = 0$, если во всѣхъ этихъ случаяхъ параметры $\alpha, \lambda, \mu, \nu$ пробѣгаютъ всѣ возможные численные значенія. Дальше этого мы не пойдемъ. Если теперь уравненія $\Omega_1=0, \Omega_2=0, \Omega_3=0, \Omega_4=0$ суть уравненія въ координатахъ x, y, z четырехъ алгебраическихъ образовъ, не принадлежащихъ одной связкѣ, и отдѣльные образы (индивидуумы) сѣти

$$\xi\Omega_1 + \eta\Omega_2 + \zeta\Omega_3 + \Omega_4 = 0$$

мы будемъ называть псевдо-точками, а параметры ξ, η, ζ координатами соответствующей псевдо-точки, то мы можемъ применить къ нимъ понятія, выясненные въ § 12, и такимъ образомъ составимъ псевдо-прямая и псевдо-плоскости. Координаты псевдо-точки ξ, η, ζ , принадлежащей прямой, которая проходитъ черезъ двѣ псевдо-точки (ξ, η, ζ) и (ξ'', η'', ζ'') , согласно § 12, 5, могутъ быть выражены при помощи одного параметра λ формулами:

$$\xi\xi'' - \xi''\xi = \frac{\xi\xi'' - \lambda\xi\xi''}{1 - \lambda}, \quad \eta = \frac{\eta'}{1 - \lambda}, \quad \frac{\lambda\eta''}{\lambda}, \quad \xi\xi'' - \xi''\xi = \frac{\xi\xi'' - \lambda\xi\xi''}{1 - \lambda}$$

Такъ какъ

$$\xi\Omega_1 + \eta\Omega_2 + \zeta\Omega_3 + \Omega_4 = 0,$$

то мы поэтому имѣемъ:

$$\Omega' - \lambda\Omega'' = 0,$$

гдѣ

$$\begin{aligned} \Omega' &= \Omega_1 \xi'' & \Omega_2 \eta' & \Omega_3 \zeta' & \Omega_4, \\ \Omega'' &= \Omega_1 \xi'' & \Omega_2 \eta'' & \Omega_3 \zeta'' & \Omega_4. \end{aligned}$$

Псевдо-точки псевдо-прямой составляютъ, такимъ образомъ, пучекъ Ω , индивидуумы котораго принадлежать сѣти; легко также показать, что псевдо-точки псевдо-плоскости образуютъ связку Ω , элементы которой также принадлежать сѣти.

Мы пришли, таким образомъ, къ трехмѣрному линейному многообразію, весьма многообъемлющему по составу элементовъ, которые являются его псевдо-точками. Каждый образъ типа Ω , — въ частности, каждая кривая или поверхность, — можетъ быть принята за „точку“ новой „геометріи“, построенной по образцу Евклидовой и удовлетворяющей всѣмъ теоремамъ послѣдней.

7. Однако, этимъ еще отнюдь не исчерпанъ объемъ понятія о линейномъ многообразіи, да врядъ ли это и возможно сдѣлать. Можно было бы взять функціи Ω въ линейныхъ и плоскостныхъ координатахъ, исходя отъ системы матриць, можно было бы принять за элементы многообразія линейныя преобразованія пространства и т. д. Мы хотимъ еще остановиться только на одномъ способѣ построения; именно: мы рассмотримъ примѣръ, который охватываетъ обѣ геометрическія системы, изложенныя въ § 10, 2, какъ частные случаи, и который легко допускаетъ обобщеніе. Съ этою сѣтью мы будемъ исходить отъ сѣти поверхностей второго порядка (сѣть F^2)

$$F_1(x, y, z, \zeta) + F_2(x, y, z, \eta) + F_3(x, y, z, \xi) + F_4(x, y, z) = 0.$$

Если поверхность этой сѣти проходитъ черезъ точку (x', y', z') , то

$$F_1(x', y', z') + F_2(x', y', z')\eta + F_3(x', y', z')\xi + F_4(x', y', z') = 0,$$

а потому также

$$(F_1F_4' - F_1'F_4)\xi + (F_2F_4' - F_2'F_4)\eta + (F_3F_4' - F_3'F_4)\xi = 0,$$

гдѣ для сокращенія F_h и F_h' замѣняютъ $F_h(x, y, z)$ и $F_h(x', y', z')$. Поверхности, проходящія черезъ точку (x', y', z') , образуютъ, такимъ образомъ, связку и всѣ проходятъ черезъ восемь точекъ пересѣченія трехъ поверхностей второго порядка

$$F_1F_4' - F_1'F_4 = 0, \quad F_2F_4' - F_2'F_4 = 0, \quad F_3F_4' - F_3'F_4 = 0;$$

(x', y', z') есть одна изъ этихъ точекъ.

Поверхности сѣти F^2 , проходящія черезъ точку (x', y', z') , имѣютъ, такимъ образомъ, еще семь другихъ общихъ точекъ, которыя называются сопряженными съ первой; каждая поверхность сѣти, проходящая черезъ одну изъ этихъ точекъ, необходимо проходитъ черезъ остальные семь.

Такимъ образомъ, группа 8 сопряженныхъ точекъ опредѣляетъ въ сѣти F^2 только одну связку F^2 , двѣ такія группы опредѣляютъ только одинъ пучекъ, наконецъ, три группы сопряженныхъ точекъ опредѣляютъ только одну поверхность второго порядка, проходящую черезъ эти точки, между тѣмъ какъ 9 точекъ общаго положенія уже опредѣляютъ поверхность

второго порядка въ пространствѣ. Такъ какъ поверхности пучка пересѣкаютъ другъ друга по кривой 4-го порядка, то мы можемъ сказать: двѣ группы сопряженныхъ точекъ опредѣляютъ въ пространствѣ одну и только одну кривую 4-го порядка, проходящую черезъ ихъ точки. Мы видимъ, что группы сопряженныхъ точекъ играютъ для опредѣленія кривыхъ 4-го порядка въ пространствѣ и поверхностей 2-го порядка такую же роль, какую пары взаимно-обратныхъ точекъ играютъ для опредѣленія сферъ и окружностей сферической сѣти. Итакъ, мы приходимъ къ выводу: Если примемъ группы сопряженныхъ точекъ сѣти I^2 за псевдо-точки, ея кривыя 4-го порядка въ пространствѣ за псевдо-прямыя, ея поверхности второго порядка за псевдо-плоскости, то эти псевдо-точки, псевдо-прямыя, псевдо-плоскости образуютъ трехмѣрное линейное многообразіе, удовлетворяющее аксіомамъ Евклидовой геометріи, — естественно, также и аксіомамъ двухъ неевклидовыхъ геометрій, смотря по тому, выдѣлимъ ли мы одну изъ поверхностей системы въ качествѣ несобственной или нѣтъ *). Мы считаемъ необходимымъ подчеркнуть, что теорема эта имѣетъ мѣсто только въ томъ предположеніи, что вся группа изъ восьми сопряженныхъ точекъ принимается за одну псевдо-точку; нельзя, напримѣръ, выразиться такъ: если A и B суть сопряженныя точки, то A есть та же псевдо-точка, что и B . Въ высшей степени интересно рассмотреть съ этой точки зрѣнія ученіе о сѣтяхъ F^2 и уяснить себѣ въ этомъ освѣщеніи предложенія, приведенныя въ III томѣ книги Рейэ „Геометрія положенія“ **). Въмѣсто кривыхъ и поверхностей второго порядка обыкновенной геометріи мы получаемъ здѣсь важныя кривыя и поверхности болѣе высокихъ порядковъ, которыя въ этой постановкѣ получаютъ самое яркое освѣщеніе. Къ этому остается только прибавить, что сѣть сферъ представляетъ собой частный случай сѣти F^2 ; роль сопряженныхъ точекъ здѣсь играютъ взаимно-обратныя точки.

8. Если мы въ предыдущихъ формулахъ дадимъ переменнѣйшей z постоянное значеніе и соотвѣтственно измѣнимъ какъ самыя формулы, такъ и терминологію, то мы получимъ соотвѣтствующія предложенія, относящіяся къ плоскости; изъ нихъ мы приведемъ только слѣдующее: коническія сѣченія, ихъ пучки и связки образуютъ трехмѣрное линейное многообразіе, въ которомъ выполняются послышки Евклидовой геометріи; исключеніе представляютъ лишь немногіе частные случаи кривыхъ второго порядка и ихъ вырожденія. Эти предложенія относительно коническихъ сѣченій и сѣтей F^2 сравнительно нетрудно получить и чисто аналитически. Если мы примемъ коническія сѣченія сѣти за

*) При этомъ мы не касаемся, конечно, вопроса о дѣйствительности.

**) Reye, „Geometrie der Lage“.

псевдо-точки, пучки и связки за псевдо-прямыя и псевдо-плоскости, то к ним примѣнны всѣ аксіомы расположенія и сопряженія.

По существу эти предложенія, — правда, не въ этомъ сопоставленіи, — были уже извѣстны аналитамъ прошлаго столѣтія; Яковъ Штейнеръ не безъ большого труда получилъ ихъ чисто синтетически. Въ письмѣ къ Якоби отъ 31 Декабря 1833 г., которое Янке (Jahnke) опубликовалъ въ журналѣ „Archiv der Mathematik und Physik (3), Bd. 4, S. 274, Штейнеръ даетъ предложеніе, которое переноситъ теорему о совершенномъ четырехсторонникѣ въ геометрію сѣти коническихъ сѣченій. Судя по той гордости, съ которой онъ говоритъ объ этомъ открытіи, которое все же представляется довольно доступнымъ, совершенно очевидно, что логическія основанія этого поразительнаго совпаденія не были ему ясны. Это вновь обнаруживаетъ, что критическое направленіе въ математикѣ, стремящееся провести всѣ доказательства такимъ образомъ, чтобы они сохраняли свою силу въ каждомъ линейномъ трехмѣрномъ многообразіи, не представляетъ собой бесплоднаго начинанія. По существу ту же цѣль преслѣдовалъ и Грассманъ (Grassmann) въ своемъ *Ausdehnungslehre*; то признаніе, которое это сочиненіе въ настоящее время все больше и больше встрѣчаетъ какъ въ чистой, такъ и въ прикладной математикѣ, особенно ясно говоритъ въ пользу того, что чрезвычайно цѣлесообразно перенести и метрическія свойства на всѣ многообразія. Что касается тѣхъ свойствъ, которыя вытекаютъ изъ аксіомъ расположенія (проективныя свойства), то относительно нихъ обыкновенно охотно признаютъ возможность и цѣлесообразность ихъ распространенія на всѣ линейныя многообразія.

9. До сихъ поръ мы старались доказать, что логическое расчлененіе и точное опредѣленіе пространственныхъ представленій полезно и необходимо съ чисто геометрической точки зрѣнія. Теперь мы обратимся къ точкѣ зрѣнія теоріи познанія и рассмотримъ задачу съ этой стороны, насколько это возможно сдѣлать простыми математическими методами. Нужно, конечно, прежде всего отмѣтить, что при этомъ мы оставляемъ почву строго математической дедукціи и переходимъ въ область, въ которой между математиками царить столь же мало согласія, какъ и между философами; но именно поэтому мы не должны обходить трудностей вопроса, не должны предоставлять ихъ, какъ нѣчто безплодное для математиковъ, исключительно философамъ. Задача теоріи познанія въ области точныхъ наукъ, повидимому, все больше занимаетъ философовъ; но задача математика, который, по словамъ Платона*), въ своей наукѣ имѣетъ „рукоятку философіи“ („*λαβὰς φιλοσοφίας*“), — отстоять свои интересы и доставить матеріалъ, который представляется ему особенно заслуживающимъ вниманія. Здѣсь рѣчь идетъ о вопросахъ, которые

*) Diogenes Laertius, IV, 10 (M. Cantor. Vorl., B. I., 1880, S. 185).


и мы можем существенно подвинуть впередъ, если мы подвергнемъ ихъ безпристрастному изслѣдованію и выскажемъ, что мы собственно имѣемъ въ виду, культивируя нашу науку. Къ этому присоединяется еще другое основаніе: приложеніе математики къ естествознанію можетъ быть въ полной мѣрѣ плодотворнымъ только въ томъ случаѣ, если мы впередъ себя не обманываемъ относительно того, что наша наука можетъ и чего не можетъ дать. Въ этомъ отношеніи было бы очень поучительно ретроспективно обозрѣть исторію математики въ теченіе послѣднихъ двухъ столѣтій и уяснить себѣ, почему значеніе математики, какъ вспомогательнаго средства въ естествознаніи, столь же часто перецѣнивалось, какъ и недоцѣнивалось, и съ другой стороны, отчего аппаратъ физическихъ формулъ сравнительно мало былъ затронутъ при постоянныхъ измѣненіяхъ господствующихъ въ этой наукѣ воззрѣній.

10. Вотъ что, во всякомъ случаѣ, опредѣленно вытекаетъ изъ предыдущаго изслѣдованія: относительно основныхъ образовъ „точка“, „прямая“, „плоскость“, „пространство“ и основныхъ понятій „между“, „отрѣзокъ“, „уголъ“, „конгруэнтность“ нужно строго различать тѣ ихъ свойства, которыя изъ обыкновеннаго пространства могутъ быть перенесены на всякое линейное многообразіе, отъ тѣхъ свойствъ, которыя индивидуально принадлежатъ этимъ понятіямъ. Такому перенесенію подлежатъ свойства сопряженія и расположенія, непрерывности и конгруэнтности, какъ они сопоставлены въ (Гильбертовыхъ) аксіомахъ. Не поддается такому перенесенію, напримѣръ, малость (матеріальной) точки, изящное, равномерное закругленіе сферы, вообще все, что относится къ внѣшнему виду пространственныхъ образовъ, если мы ихъ рассматриваемъ, какъ они есть, сами по себѣ, не сопоставляя ихъ съ другими. Эти индивидуальныя особенности съ особенной ясностью отпадаютъ при строго формальномъ развитіи аналитической геометріи, которое мы дали въ § 12. Когда рѣчь идетъ о совокупности трехъ чиселъ (a, b, c), которая въ этой системѣ опредѣляетъ точку, то мы вообще не рисуемъ себѣ чего-либо большого или малаго; тутъ можно было бы развѣ говорить о размѣрѣ самыхъ трехъ чиселъ, но вѣдь это здѣсь не имѣетъ никакого значенія. Безконечно удаленные образы въ „однородной“ геометріи § 12-го совершенно теряютъ то особенное положеніе, которое они занимаютъ въ нашихъ пространственныхъ представленіяхъ. Геометрическая фигура въ нашемъ обычномъ представленіи всегда имѣетъ верхнія и нижнія части, болѣе и менѣе удаленныя части; въ ариѳметической геометріи все то, что субъективно рисуется нашему воображенію, совершенно отпадаетъ. Тѣ свойства, которыя могутъ быть перенесены, касаются взаимоотношенія основныхъ понятій; индивидуальныя же свойства выражаютъ ихъ отношенія къ нашимъ внѣшнимъ чувствамъ.

11. Каждое из основных геометрических понятий расщепляется, таким образом, на слагающую, переходящую и в другие многообразия, и на слагающую индивидуальную; однако, провести точную грань между этими слагающими, вообще говоря, очень трудно. Еще Кант в своих „Prolegomena“ неоднократно указывал, что различие между понятиями „справа“ и „слева“, между телом и его изображением в зеркале и т. п. не поддается абстрактному определению; это признает и Гаусс, хотя он и оспаривает выводы, которые Кант отсюда делает (сообщение о мемуаре „Theoria residuorum biquadraticorum“, Gauss' Werke, Bd. 2, S. 177). При всем том Пашу удалось в своих лекциях по Новой геометрии, которая мы уже неоднократно цитировали, провести в аксиомах всю теорию расположений. Вышеуказанное различие не только поддается, таким образом, отвлеченному определению, но может быть логически проведено. Этим мы отнюдь не хотим сказать, что понятие о расположении совершенно исчерпывается аксиомами расположения: речь идет только о „переносной“ слагающей, к которой только и находят применение чисто логическая геометрия. Евклидовы определения понятий „точка“, „прямая“, „плоскость“ (о понятии „между“ он вовсе не упоминает) содержат исключительно индивидуальную, можно даже сказать, материальную сторону этого понятия, — именно поэтому из этих определений нельзя сделать никакого геометрического вывода. Аксиомы расположения, сопряжения, конгруэнтности, параллелизма и непрерывности (в Гильбертовой формулировке) также устанавливают исключительно логические соотношения между этими понятиями; как Гильберт и сам указывает, эти аксиомы выполняются в линейном численном многообразии трех измерений. Если Гильберту делали упреки в родъ того, что его аксиомы не дают возможности ответить на вопрос, представляют ли карманные часы собою точку или нет, то это обнаруживает только полное непонимание задач, которые Гильберт себе ставит. На такой вопрос эти аксиомы не могут и не имеют в виду дать ответ. Ибо, если геометрия и была изобретена и развита с тою целью, чтобы изучить свойства наших пространственных образов (мы их воспринимаем нашими чувствами), то истины ее все-таки совершенно не зависят от той формы, в которой мы себе эти образы обычно представляем; наша обыкновенная геометрия, как мы выяснили на многочисленных примѣрахъ, представляет собой лишь одно из многих осуществлений ее логического содержания. Итак, имѣлось ли это в виду или нет, все равно, — геометрия, построенная в смыслѣ Гильбертовыхъ „оснований“, должна сохранить свою силу в каждомъ трехмѣрномъ линейномъ многообразии. Кто, как мы, на этой именно возможности перенесения геометрическихъ предложений в другое многообразіе твердо настаиваетъ, тотъ не можетъ сомнѣваться, каково истинное значеніе аксиомъ, которыя другимъ кажутся то ненужными, то

тривиальными вследствие полной их очевидности, как, например, аксиомы расположения. Уже древние математики в Греции расходились во взглядах на такого рода аксиомы. Но для геометрии, справедливой для всякого линейного трехмерного многообразия, ни одно из этих предположений, конечно, не может быть признано настолько маловажным, чтобы его не приходилось явно отнести к основным посылкам. В этом мы немедленно убеждаемся при первой попытке необычного осуществления геометрии; попробуйте надѣлать группы сопряженных точек сѣти F^2 , принятыя нами в п. 8 за псевдо-точки, свойством, которое выражается понятием „между“; без аксиомы расположения вы будете совершенно беспомощны.

12. Своей достоверностью геометрия не может быть обязана индивидуальным свойствам основных образов, которая мѣняется от многообразия к многообразию, а исключительно тѣмъ свойствам, которыя мы назвали переносными, которыя, как таковыя, сохраняются во всякомъ многообразии. Какъ показываетъ очеркъ оснований геометрии Гильберта, аксиомы образуютъ единственную недоказуемую предпосылку, единственный источникъ познания для всей его системы. На основныхъ понятіяхъ покоятся опредѣленія производныхъ понятій: окружности, коническихъ сѣченій и т. д. Но геометрія работаетъ не исключительно основными и производными понятіями, число которыхъ, во всякомъ случаѣ, ограничено; иначе ея матеріалъ, въ концѣ концовъ, долженъ былъ бы исчерпаться, потому что изъ этихъ основныхъ понятій нельзя выжать больше того, что въ нихъ вложено опредѣленіемъ. Характерная особенность геометрическаго метода изслѣдованія въ томъ именно и заключается,



Фиг. 49.

что мы постоянно вводимъ новыя послылки. Однако, эти послылки существенно отличаются отъ основныхъ; именно относительно нихъ мы всегда можемъ предварительно доказать, что онѣ совместны съ основными послылками, что онѣ выполняются вмѣстѣ съ послѣдними. Такъ, напримеръ, теорема Дезарга предполагаетъ два треугольника $A'B'C'$ и $A''B''C''$, расположенныхъ такимъ образомъ, что прямыя $A'B'$ и $A''B''$, $B'C'$ и $B''C''$, $C'A'$ и $C''A''$ попарно пересѣкаются въ трехъ точкахъ C , A , B , расположенныхъ на одной прямой u . Чтобы убѣдиться въ допустимости такого предположенія (такой послылки), возьмемъ на прямой u (фиг. 49) произвольно три точки A , B , C (аксиома Π_2); присоединимъ сюда точку A' , не лежащую на прямой u и соединимъ ее съ точками B и C (аксиома I_1). Три точки A' , B и C опре-

дѣляютъ прямую u на отрезки CA , AB , BC . Проведемъ изъ точки A' прямую $A'B''$ параллельную $A'B'$, изъ точки B прямую $B''C''$ параллельную $B'C'$, изъ точки C прямую $C''A''$ параллельную $C'A'$. Прямая $A'B''$ пересѣчетъ $B''C''$ въ A , $B''C''$ пересѣчетъ $C''A''$ въ B , $C''A''$ пересѣчетъ $A'B''$ въ C . Такимъ образомъ, мы имеемъ два треугольника $A'B'C'$ и $A''B''C''$, удовлетворяющіе условиямъ теоремы Дезарга.

дѣляютъ плоскость η (I_6), въ которой лежатъ прямыя $A'B$, BC , CA' (I_6). Возьмемъ теперь точку B' на продолженіи отрѣзка CA' (II_2). Въ такомъ случаѣ прямая $B'A$, которая, согласно аксіомѣ I_6 , лежитъ въ плоскости η , должна встрѣтить сторону BA' треугольника $A'CB$ въ нѣкоторой точкѣ C' между A' и B (III_4). Этимъ доказано вспомогательное предположеніе: мы всегда можемъ построить треугольникъ такъ, чтобы каждая изъ трехъ его сторонъ проходила черезъ ея предписанную точку на прямой. Примѣняя это предположеніе двукратно, мы получаемъ фигуру, которую предполагаетъ теорема Дезарга.

Аналогичными соображеніями можетъ быть доказана допустимость предположенія, изъ котораго мы въ п. 5 вывели конфигурацію K_1 (15_6 , 20_3). Уже изъ этихъ примѣровъ видно, что доказательства возможности, основанныя на аксіомахъ, могутъ быть очень тяжеловѣсны.

Первымъ опредѣленно указалъ на этотъ характерный методъ геометріи Кантъ въ своей „Критикѣ чистаго разума“. Но онъ выдвигаетъ на передній планъ построеніе, которое дается самымъ доказательствомъ возможности и вмѣстѣ съ этимъ доказательствомъ. Между тѣмъ построеніе имѣетъ здѣсь второстепенное значеніе; напротивъ, всегда необходимо предварительно доказать, что оно вообще возможно *).

Геометрія оказывается, такимъ образомъ, совокупностью логическихъ выводовъ изъ неограниченнаго ряда посылокъ, которыя не только совмѣстимы съ системою аксіомъ, но всегда выполняются, коль скоро аксіомы имѣютъ мѣсто ⁷⁶⁾.

*) См. Кант, „Kritik der reinen Vernunft“, Transzendente Methodenlehre. Кантъ слишкомъ исключительно занятъ вспомогательными линіями, которыя должны быть построены, чтобы теоремы можно было примѣнять. Но старая, косная и неподвижная элементарная геометрія даетъ слишкомъ одностороннюю картину геометрическаго метода; Канту же этого нельзя поставить въ упрекъ, такъ какъ въ его время геометрія положенія еще не была открыта.

⁷⁶⁾ Идея, развиваемая здѣсь авторомъ, въ высшей степени важна, хотя рѣдко кто ясно ее понимаетъ. Когда мы доказываемъ, что въ треугольникѣ ABC противъ равныхъ сторонъ AC и BC лежатъ равные углы A и B , то послылками для этого доказательства служатъ:

1) Основныя опредѣленія и аксіомы; мы будемъ называть ихъ основными послылками.

2) Весь геометрический матеріалъ, уже построенный, уже выведенный раньше, до доказательства интересующаго насъ предположенія. Эти послылки мы будемъ называть выводными послылками.

3) Условіе данной теоремы: въ треугольникѣ ABC сторона AC равна сторонѣ BC .

Изъ совокупности посылокъ этихъ трехъ категорій выводится, что уголь A равенъ углу B .

О томъ, что условіе нашей теоремы есть также послылка, при помощи которой дѣлается выводъ, объ этомъ часто забываютъ. Между тѣмъ никакого вывода

Далеко не во всякомъ научномъ изложеніи геометріи проводится эта строго логическая форма; въ особенности относительныя свойства расположенія мы обыкновенно охотно полагаемся на интуицію, потому что точное доказательство здѣсь слишкомъ кропотливо. Вообще, въ геометрическихъ доказательствахъ часто ограничиваются однимъ только указаніемъ важнѣйшихъ моментовъ и общаго хода разсужденій, предоставляя читателю, по собственной склонности или по присущей ему потребности, разложить его на силлогизмы. Существуютъ, однако, такіе отдѣлы геометріи, гдѣ, не имѣя возможности пользоваться воззрѣніемъ, мы должны строго держаться принятыхъ или доказанныхъ фактовъ и почти вынуждены придавать доказательствамъ силлогистическую форму, чтобы не проскользнули ошибки. Сюда принадлежатъ, напримѣръ, доказательства о связи и пересѣченіи Римановыхъ поверхностей, о которыхъ мы упоминали въ § 7, предложенія о конструкціи фахверковъ и т. д. Но и въ элементарной геометріи

не было бы, если бы мы къ основнымъ и выводнымъ посылкамъ не присоединили этой новой посылки 3).

Итакъ, геометрія развивается такимъ путемъ, что къ основнымъ и выводнымъ посылкамъ, которыми мы уже располагаемъ, мы постоянно присоединяемъ еще одну посылку — условіе новаго предложенія — и отсюда дѣлаемъ выводъ.

Въ созиданіи этихъ вновь присоединяемыхъ посылокъ и заключается сущность творчества въ геометріи.

Неоднократно говорили, въ томъ числѣ даже Д. С. Милль, что геометрія не можетъ быть строго синтетической наукой, развиваемой изъ небольшого числа постулатовъ, ибо тогда она содержала бы въ себѣ не больше того, что вложено въ основные постулаты. Но при этомъ забываютъ, что построеніе геометріи въ томъ именно и заключается, что мы постоянно присоединяемъ новыя посылки — условія нашихъ теоремъ.

Нужно замѣтить, что посылки, которыя мы назвали выводными, въ свою очередь, получаютъ путемъ присоединенія къ основнымъ посылкамъ этихъ посылокъ типа 3). Мы можемъ поэтому сказать, что геометрія развивается путемъ послѣдовательнаго присоединенія къ основнымъ посылкамъ новыхъ посылокъ — условій доказываемыхъ теоремъ. И въ созиданіи этихъ новыхъ посылокъ и заключается актъ геометрическаго творчества.

На этихъ новыхъ посылкахъ авторъ и останавливается въ текстѣ и старается указать, въ чемъ заключается ихъ отличіе отъ основныхъ посылокъ — аксіомъ.

Это отличіе онъ усматриваетъ въ томъ, что ихъ совмѣстимость съ прежними посылками доказывается до очевидности просто.

Такъ, въ нашемъ примѣрѣ совершенно ясно, что, при наличности остальныхъ посылокъ, стороны AC и BC могутъ быть равны, могутъ быть не равны: присоединяя одну посылку, мы получаемъ одинъ выводъ, присоединяя другую, получаемъ иной выводъ.

Но когда возникъ вопросъ, можетъ ли при предыдущихъ посылкахъ изъ точки на плоскости выходить только одна прямая, не встрѣчающая данной прямой, или нѣсколько, то послѣднее предположеніе казалось несовмѣстнымъ съ остальными положеніями; въ виду отсутствія возможности это доказать (какъ это всегда легко сдѣлать относительно новыхъ посылокъ), это допущеніе приняли въ видѣ новой основной посылки.

мы наталкиваемся на такого рода трудности, какъ только мы добровольно отказываемся отъ интуиціи, чтобы быть увѣреннымъ, что мы дѣйствительно дѣлаемъ логическіе выводы изъ аксіомъ и понятій; мы убѣдимся въ этомъ относительно аксіомъ расположенія въ слѣдующей главѣ. Какую бы форму мы ни придавали геометрическому доказательству изъ стилистическихъ или дидактическихъ соображеній, научно безупречнымъ его можно признать только въ томъ случаѣ, если оно дастъ весь матеріалъ, необходимый для строго логическаго вывода.

13. Возможность наглядно замѣнить при такого рода логическомъ формализмѣ тѣ объекты, на которыхъ онъ былъ первоначально построенъ, совершенно другими, не ограничивается одной геометрией; такая возможность представляется всюду, гдѣ мы аналогично оперируемъ въ области, логически установленной аксіомами. Въ особенности нужно отмѣтить, что и арифметика своими правилами и аксіомами не устанавливаетъ объектовъ, которые имъ подчиняются; при помощи теоріи группъ Галуа (Galois) можно многообразно составить системы символовъ, которые сочетаются по тѣмъ же правиламъ, что и числа^{*)}. Вся теорія дѣлимости, вытекающая изъ сопряженія чиселъ при помощи умноженія, по существу, примѣняется и къ алгебраическимъ числамъ, а теорія алгебраическихъ чиселъ можетъ быть распространена и на алгебраическія функции. Сложеніе комплексныхъ чиселъ въ комплексной числовой плоскости вполнѣ отображаетъ сложеніе и разложеніе силъ, дѣйствующихъ въ плоскости на одну точку. Чрезвычайно замѣчательную интерпретацію сопряженія чиселъ съ помощью сложения и умноженія мы встрѣтимъ въ графической статикѣ, гдѣ числа замѣняются системами силъ на факхверкѣ. Число, какъ и геометрическіе образы, имѣетъ переносныя и индивидуальныя свойства. Послѣднія еще очень нуждаются въ изслѣдованіи.

Физики уже давно знали и даже пользовались тѣмъ, что нѣкоторыя теоріи могутъ быть перенесены изъ одной области въ другую. Здѣсь говорятъ о механическихъ, гидродинамическихъ и статическихъ „отображеніяхъ“. Многія изъ этихъ отображеній представляютъ собой только аналогіи, но многія обусловливаются тождественными логическими послылками. Такъ, напримѣръ, Христоффель (Christoffel^{**}) чисто аксіоматически обосновалъ возможность перенести теорію дифференціальныхъ уравненій теплопроводности на теорію міровой торговли и вывелъ эти уравненія такимъ образомъ, что примѣнимость ихъ къ обѣимъ теоріямъ становится совершенно очевидной.

*) Вообще теорія группъ, какъ принадлежащая Галуа, такъ и построенная Ли (Lie), включаетъ теорію арифметическихъ дѣйствій. Ср., съ одной стороны, Weber, Math. Ann., Bd. 43, S. 521, съ другой стороны—F. Schur, Math. Ann., Bd. 41, S. 509.

**) Въ одной изъ лекцій объ уравненіяхъ въ частныхъ производныхъ, читанныхъ въ зимнемъ семестрѣ 1891/92 уч. года.

Въ химіи такого рода „изображеній“ не знали. Поэтому въ свое время произвело значительное впечатлѣніе открытіе, сдѣланное Сильвестромъ (Sylvester) и Клиффордомъ (Clifford) (1878), что формулы строенія органическихъ соединеній символически отображаются законами составленія инвариантовъ бинарныхъ формъ. Внутренней связи между химіей и теоріей инвариантовъ, повидимому, нѣтъ: это совпаденіе представляетъ только слѣдствіе случайно совпадающихъ законовъ сопряженія*).

14. Во всѣхъ этихъ случаяхъ отображаются не самые объекты, а ихъ переносныя свойства—лучше сказать, соотношенія, связывающія эти объекты. Какъ видно изъ этого сопоставленія, то, что мы назвали выше логическимъ формализмомъ, собственно и составляетъ основу научной геометріи. Въ самомъ дѣлѣ, такъ какъ наше познаніе здѣсь относится не къ самымъ предметамъ, а къ соотношеніямъ между ними, то наиболее цѣнная, абсолютно достовѣрная часть нашей науки содержится въ чисто логической геометріи. Именно поэтому для многихъ продуктивныхъ математиковъ геометрія начинается только тогда, когда она доведена до аксіомъ,—въ аналитической геометріи это косвенно всегда имѣетъ мѣсто; между тѣмъ въ подготовительной части геометріи можетъ сказать свое слово историкъ и философъ. Но если кто и не можетъ принять этой нѣсколько односторонней точки зрѣнія, то онъ все же предоставитъ математику право, если онъ располагаетъ системой аксіомъ, сдѣлать таковую краеугольнымъ камнемъ строго логическаго научнаго зданія. При этомъ происходитъ любопытная смѣна взглядовъ: если прежде аксіомы были для насъ предложеніями, заимствованными изъ опыта или напередъ заданными, которыя въ натуральной геометріи осуществляются лишь въ большей или меньшей мѣрѣ и потому обуславливаютъ часто тягостныя ограниченія во всѣхъ теоремахъ**), то мы ихъ теперь возводимъ на степень строгой достовѣрности, претворяя ихъ въ опредѣленія. Въ этомъ смыслѣ аксіомы Гильберта опредѣляютъ понятіе „инцидентности“ (Inzidenz) (т. е. „на прямой“ или „на плоскости лежить“, „проходить черезъ точку“, „опредѣляютъ“, „пересѣкаютъ“)⁷⁷⁾, расположенія („между“),

*) Случайный характеръ этого совпаденія очень убѣдительно доказалъ Стюди (Study, Beiblätter zu den Annalen der Physik, 1901, Bd. 25, S. 87). Работы Сильвестра и Клиффорда помѣщены въ Am. Journ., I.

**) Двѣ точки опредѣляютъ прямую, если онѣ расположены не слишкомъ близко одна къ другой. Двѣ непараллельныя прямыя въ одной плоскости пересѣкаются въ одной точкѣ, но онѣ не должны составлять при этомъ слишкомъ острого угла и т. д.

⁷⁷⁾ Мы сохраняемъ этотъ терминъ, принадлежащій автору настоящаго сочиненія, безъ измѣненія. Этотъ терминъ оказывается автору полезнымъ, главнымъ образомъ, ниже—въ проективной геометріи. Смыслъ же его таковъ: въ выраженіи „точка инцидентна съ прямой“ авторъ объединяетъ два обычно употребляемыхъ выраженія „точка лежитъ на прямой“ и „прямая проходитъ черезъ точку“; выра-

параллелизма, конгруэнтности и непрерывности. Относительно же того, что такое точки, прямая и плоскости, не дѣлается никакого соглашения, такъ что перечисленные соотношенія, какъ мы знаемъ, переносятся на любое многообразіе. Намъ достаточно знать, что слова точка, прямая и плоскость выражаютъ три системы объектовъ, удовлетворяющихъ требованіямъ аксіомъ. Мы рекомендуемъ теперь вновь внимательно прочитать „опредѣленія“ и „объясненія“, тщательно и строго выраженные въ книгѣ Гильберта.

Итакъ, въ книгѣ Гильберта о трехъ системахъ основныхъ образцовъ не сказано ничего; не дѣлается даже попытки построения прямыхъ и плоскостей изъ точекъ; поэтому будетъ наиболѣе подходящимъ назвать Гильбертову геометрію чистымъ ученіемъ о соотношеніяхъ.

15. Само собою разумѣется, что Гильбертовы аксіомы — мы будемъ по прежнему такъ называть опредѣленія его геометріи соотношеній — устанавливають все же извѣстныя соотношенія между точками прямой или плоскости, хотя этихъ соотношеній и недостаточно, чтобы опредѣлить прямую, какъ образъ, составленный изъ точекъ. Если бы мы даже согласились, выходя за предѣлы его аксіомъ, разумѣть подъ словомъ „точки“ обыкновенныя (очень маленькія матеріальныя) точки (а не, скажемъ, сферы въ сѣти), то подъ прямыми и плоскостями мы все же могли бы разумѣть какъ обыкновенныя прямыя, такъ и окружности или сферы параболической сѣти. Другіе примѣры легко построить аналитически. Примемъ, напримеръ, за точку отправленія однородныя координаты x_1, x_2, x_3, x_4 и произведемъ преобразование

$$x_1 = a_1 y_2 y_3 y_4, \quad x_2 = a_2 y_3 y_4 y_1, \quad x_3 = a_3 y_4 y_1 y_2, \quad x_4 = a_4 y_1 y_2 y_3 \quad (1)$$

пространства x -овъ въ пространство y -овъ⁷⁸⁾; при этомъ плоскости $u_1 x_1 + u_2 x_2 + u_3 x_3 + u_4 x_4 = 0$ пространства x -овъ переходятъ въ поверхности третьяго порядка:

$$a_1 u_1 y_2 y_3 y_4 + a_2 u_2 y_3 y_4 y_1 + a_3 u_3 y_4 y_1 y_2 + a_4 u_4 y_1 y_2 y_3 = 0, \quad (2)$$

каждая же прямая переходитъ въ кривую пересѣченія двухъ такихъ поверхностей. Но это преобразование не только относитъ каждой точкѣ (x_1, x_2, x_3, x_4) одну точку (y_1, y_2, y_3, y_4) , но и обратно относитъ каждой точкѣ (y_1, y_2, y_3, y_4) одну опредѣленную точку (x_1, x_2, x_3, x_4) , потому что изъ уравненій (1) слѣдуетъ:

$$u y_1 = a_1 x_2 x_3 x_4, \quad u y_2 = a_2 x_3 x_4 x_1, \quad u y_3 = a_3 x_4 x_1 x_2, \quad u y_4 = a_4 x_1 x_2 x_3, \quad (3)$$

женіе „прямая инцидентна съ плоскостью“ также объединяетъ выраженія: „прямая лежитъ на плоскости“ и „плоскость проходитъ черезъ прямую“.

⁷⁸⁾ Т. е. аналитическаго пространства, въ которомъ „точками“ служатъ значенія четырехъ переменныхъ x , въ аналитическое пространство, въ которомъ точками служатъ значенія четырехъ переменныхъ y .

гдѣ q есть коэффициентъ пропорціональности, значеніе котораго легко получить, подставляя формулы (3) въ уравненіе (1). Однозначность соответствія пространства x -овъ съ пространствомъ y -овъ нарушается только въ точкахъ $(1, 0, 0, 0)$, $(0, 1, 0, 0)$, $(0, 0, 1, 0)$, $(0, 0, 0, 1)$; это такъ называемыя „основныя точки“ преобразованія. При инверсіи также существуетъ одна вещественная основная точка—центръ инверсіи. Исключительное положеніе, которое занимаютъ основныя точки, ведетъ къ тому, что всѣ поверхности третьяго порядка, соответствующія плоскостямъ пространства x -овъ, проходятъ черезъ эти четыре точки, какъ это видно изъ уравненія (2). Поэтому, если мы хотимъ, чтобы эти поверхности играли въ пространствѣ y -овъ роль плоскостей, а взаимныя ихъ пересѣченія—роль прямыхъ, то мы должны исключить изъ пространства y -овъ эти основныя точки подобно тому, какъ мы съ тою же цѣлью въ параболической сѣти исключили ея центръ (§ 8). Можно показать, — правда, не элементарными средствами, — что Евклидовы псевдо-геометріи, въ которыхъ точками служатъ обыкновенныя точки, между тѣмъ какъ псевдо-прямыми и псевдо-плоскостями не служатъ обыкновенныя прямыя и плоскости, могутъ быть построены только такимъ путемъ, что изъ пространства исключаются нѣкоторыя точки или линіи.

16. Здѣсь умѣстно поставить вопросъ, имѣющей существенное значеніе для теоріи познанія: возможно ли пополнить аксіомы (группы V) такимъ образомъ, чтобы данный комплексъ элементовъ могъ только однимъ единственнымъ способомъ удовлетворять всѣмъ аксіомамъ. Ограничиваясь обыкновеннымъ пространствомъ, этотъ вопросъ можно еще поставить такъ: можно ли пополнить Гильбертовы аксіомы такимъ образомъ, чтобы онѣ исключали всѣ одно-однозначныя преобразованія Евклидовой геометріи? Задача заключается, такимъ образомъ, въ томъ, чтобы сдѣлать линейность нѣкотораго трехмѣрнаго многообразія однозначной, чтобы, какъ выражается Кантъ, было возможно, „исходя отъ точки“, построить прямую.

Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, мы раздѣлимъ всѣ преобразованія, о которыхъ идетъ рѣчь, на коллинеаціи, которыя преобразовываютъ каждую плоскость въ плоскость же, и на высшія преобразованія, которыя этого не производятъ.

а) Однозначность высшихъ преобразованій, какъ мы видимъ на приведенномъ выше примѣрѣ, нарушается въ опредѣленныхъ „основныхъ точкахъ“, которымъ соответствуетъ не одна точка, а безконечное множество ихъ. При инверсіи основной точкой является центръ инверсіи, которому отвѣчаютъ всѣ безконечно удаленныя точки. Существованіе такихъ точекъ можетъ быть устранено подходящими аксіомами, но не такими, конечно, въ справедливости которыхъ можно убѣдиться на образахъ той или иной эмпирической геометріи. Достаточно будетъ выяснитъ это на примѣрѣ параболической сѣти, которая, какъ мы знаемъ, осуществляетъ Евклидову

геометрію, если исключить центр O . Чтобы эта геометрія и эмпирически совпадала съ Евклидовой (въ которой прямыя осуществляются, скажемъ, лучами свѣта или натянутыми нитями), точку O нужно взять на большомъ удаленіи отъ земли, напริมѣръ, на какой-либо неподвижной звѣздѣ. Если это разстояніе составляетъ n радиусовъ земной орбиты e , то наименьшая сфера сѣти, доступная на землѣ, имѣетъ радиусъ $r = 1/2 ne$. Согласно формулѣ (1) § 11, касательное уклоненіе такой сѣти отъ плоскости на разстояніи a отъ точки касанія равняется 0,001 птл., если мы примемъ $a = \sqrt{ne}b - b^2$, т. е. приближенно $a = 0,38 \sqrt{n}$ km. Для ближайшей неподвижной звѣзды (α Centauri) приблизительно $n = 227\ 000$, или, круглымъ счетомъ, $a = 180$ km. Эта сфера осуществляетъ, такимъ образомъ, плоскость съ огромной точностью. Если мы помѣстимъ центръ O еще дальше, то эта сфера могла бы быть разсматриваема, какъ плоскость, въ наиболѣе точныхъ астрономическихъ вычисленіяхъ. Въ этомъ предположеніи псевдо-геометрія § 8-го какъ эмпирически, такъ и въ аксіомахъ совпадаетъ съ Евклидовой; лучше сказать, это есть Евклидова геометрія, ибо таковая вообще не можетъ быть точнѣе осуществлена.

Даже если бы мы чрезвычайно расширили естественныя границы нашихъ наблюденій, то и въ такомъ случаѣ мы никогда не могли бы обнаружить ни малѣйшаго уклоненія этой „псевдо-геометріи“ отъ „дѣйствительной геометріи“. И слѣдовательно, мы никогда не могли бы установить выполнена ли аксіома, относящаяся къ точкѣ O , или нѣтъ. Мы не можемъ этого, конечно, доказать, но, мы полагаемъ, мы можемъ утверждать, что никакія аксіомы, которыхъ справедливость могла бы быть констатирована на конечныхъ, доступныхъ намъ разстояніяхъ, не могли бы отдѣлить эту псевдо-геометрію отъ осуществленій Евклидовой геометріи.

До сихъ поръ мы принимали, что центръ O сѣти чрезвычайно удаленъ, но съ тѣмъ же правомъ, съ какимъ мы говоримъ въ Евклидовой геометріи о безконечно удаленныхъ точкахъ вообще, мы можемъ представить себѣ и точку O въ безконечности; но въ такомъ случаѣ требованіе, которое какая-либо аксіома относила бы къ точкѣ O , эмпирически вообще не могло бы быть провѣрено.

Итакъ, если бы намъ даже удалось при помощи подходящихъ аксіомъ исключить высшія преобразованія Евклидовой геометріи, т. е. охарактеризовать ихъ, какъ принадлежащія другому, неевклидову типу, то это были бы аксіомы такой же природы, какъ и аксіома о параллельности; это были бы аксіомы, быть можетъ, допустимыя абстрактно, но недоступныя никакому практическому контролю. Мы здѣсь неявно допустили, что рѣчь идетъ только объ алгебраическихъ преобразованіяхъ съ дѣйствительными основными точками; но мы сдѣлали это только потому, что въ наиболѣе общемъ случаѣ мы еще менѣе могли бы справиться при нашихъ ограниченныхъ элементарныхъ средствахъ съ трудностями задачи.

б) Изъ коллинеаций для насъ имѣютъ значеніе только тѣ, которыя преобразовываютъ всѣ бесконечно удаленныя точки также въ бесконечно удаленныя точки, т. е. которыя преобразовываютъ бесконечно удаленную плоскость въ себя самое. Такого рода преобразования называются аффинными (ср. § 11). Если (x, y, z) и (ξ, η, ζ) суть соответствующія точки аффинной коллинеации въ координатахъ § 12-го, то всегда имѣютъ мѣсто соотношенія вида:

$$x = a_1\xi + b_1\eta + c_1\zeta + d_1,$$

$$y = a_2\xi + b_2\eta + c_2\zeta + d_2,$$

$$z = a_3\xi + b_3\eta + c_3\zeta + d_3,$$

съ постоянными коэффициентами; вмѣстѣ съ тѣмъ имѣютъ мѣсто три такихъ же уравненія съ постоянными коэффициентами, которыя выражаютъ координаты ξ, η, ζ черезъ x, y, z . Обосновываемъ ли мы эти преобразования, какъ здѣсь, чисто аналитически или, какъ въ § 11, чисто геометрически, во всякомъ случаѣ легко убѣдиться, что эта коллинеация преобразовываетъ каждую точку безъ исключенія въ точку же, каждую прямую—въ прямую, каждую плоскость—въ плоскость же. Изъ этой полной однозначности, не имѣющей никакого исключенія, а также изъ возможности однозначнаго же обращенія этихъ соотношеній слѣдуетъ: если мы будемъ называть изображенія конгруэнтныхъ фигуръ также конгруэнтными, а также сообщимъ этимъ изображеніямъ всѣ остальные соотношенія, связывающія оригиналы, то въ этомъ отображеніи Евклидова пространства всѣ аксіомы Евклидовой геометріи будутъ имѣть мѣсто.

Итакъ, существуетъ безчисленное множество совершенныхъ осуществленій Евклидовой геометріи съ обыкновенными точками, прямыми и плоскостями, хотя фигуры, которыя мы при этомъ называемъ конгруэнтными, отнюдь не конгруэнтны въ обычномъ (Евклидовомъ) смыслѣ этого слова. Между тѣмъ ни одна изъ этихъ системъ не можетъ быть выдѣлена въ качествѣ „дѣйствительно“ Евклидовой геометріи при помощи аксіомъ, устанавливающихъ только соотношенія.

17. Итакъ, на вопросъ, который мы поставили въ п. 16, приходится отвѣтить отрицательно. Если даже устранить извѣстныя особыя точки и линіи при помощи аксіомъ, которыя, какъ аксіома о параллельныхъ линіяхъ и о полнотѣ системы, никогда не могутъ служить критеріями примѣнимости абстрактной геометріи къ образамъ нашего чувственнаго воспріятія, то существуетъ еще бесконечное множество (приближенныхъ) способовъ осуществленія аксіомъ Евклидовой геометріи съ „дѣйствительными“ точками, прямыми и плоскостями. Но вина этой многозначности, какъ

мы видим, лежит также в идеѣ конгруэнтности. Аксиомы конгруэнтности у Гильберта не устанавливают конгруэнтности однозначно. Мы сейчас формулируем это предложение точнѣ; предварительно, однако, замѣтим въ противовѣст нѣкоторымъ философскимъ иллюзіямъ: аксіомы геометріи не содержатъ никакихъ законовъ образованія основныхъ образовъ. Прежде всего, что этого не даютъ аксіомы Гильберта, что онѣ не строятъ прямой, „исходя отъ точки“, объ этомъ мы уже сказали выше. Но этого не могутъ дать и другія аксіомы; въ самомъ дѣлѣ, если бы мы имѣли такого рода чисто абстрактный законъ образованія прямой линіи (который, конечно, не можетъ пользоваться никакими физическими средствами), то намъ достаточно было бы присоединить сюда инверсію съ весьма удаленнымъ центромъ, и мы тотчасъ получили бы образъ, который во всѣхъ отношеніяхъ могъ бы сойти за прямую и лишь въ огромномъ удаленіи чисто абстрактно (не матеріально, ибо матеріальная прямая *eo ipso* ограничена) отличался бы отъ обыкновенной прямой. Помимо этого рода неопредѣленности задачи, здѣсь есть еще неопредѣленность другого рода, болѣе глубокая. Какъ мы сейчасъ сказали, аксіомы Гильберта о конгруэнтности не даютъ опредѣленнаго приема для построенія отрѣзковъ и угловъ, конгруэнтныхъ даннымъ въ любомъ положеніи; напротивъ, можно было бы предложить безчисленное множество такихъ приемовъ, оставаясь въ полномъ согласіи съ аксіомами Гильберта. Однако, отсюда отнюдь нельзя сдѣлать вывода, что эта многозначность относится исключительно къ конгруэнтности и отпадаетъ, если мы оставляемъ конгруэнтность въ сторонѣ; напротивъ, понятіе объ инцидентности, о расположеніи, о конгруэнтности, о параллелизмѣ и непрерывности въ аксіомахъ Гильберта въ такой мѣрѣ другъ съ другомъ переплетены, что представляется абсолютно невозможнымъ выдѣлнить, обособить ихъ отъ этой тѣсной зависимости и опредѣлить каждое изъ этихъ понятій независимо отъ остальныхъ. Въ эту неопредѣленность вносятъ, такимъ образомъ, свою долю всѣ понятія, въ томъ числѣ и линейность, если смотрѣть на это понятіе, какъ на отсутствіе въ пространствѣ пробѣловъ, просвѣтовъ *).

18. Итакъ, аксіомы не даютъ синтеза, созиданія геометрическихъ образовъ; онѣ указываютъ только выборъ соответственныхъ многообразій и сопряженій изъ всей совокупности мыслимыхъ. Если по этому мы опустимъ ту или иную аксіому, то выборъ становится шире: тогда могутъ проскользнуть системы, удовлетворяющія остальнымъ аксіомамъ, хотя онѣ должны были бы быть исключены, если бы мы возстановили пропущенную аксіому. Это можно ясно видѣть

*) Есть ли это вообще понятіе допустимое, это вопросъ, который мы здѣсь оставимъ въ сторонѣ.

у Гильберта и его послѣдователей на его „патологических“ геометріяхъ, если можно такъ выразиться; это геометріи, которымъ не хватаетъ тѣхъ или иныхъ аксіомъ; тогда остальные аксіомы получаютъ, кромѣ прежнихъ осуществленій, еще новыя, необычныя. До сихъ поръ еще не сдѣлано опыта осуществленія понятія объ инцидентности, отличнаго отъ обыкновеннаго, нагляднаго его пониманія. Такого рода quasi инцидентность можно, между прочимъ, установить слѣдующимъ образомъ. Каждой точкѣ пространства P при помощи общей (или аффинной) коллинеаціи отнесемъ „изображеніе“ P' ; относительно каждой прямой мы будемъ говорить, что она quasi инцидентна съ точкой P , если она дѣйствительно инцидентна съ ея изображеніемъ P' . Точки, съ которыми такимъ образомъ quasi инцидентна нѣкоторая плоскость, принадлежатъ не самой плоскости, а ея изображенію; плоскость опредѣляется тремя точками, но эти точки лежатъ—въ обычномъ смыслѣ этого слова—на изображеніи этой плоскости.

При такомъ положеніи дѣлать дать опредѣленіе прямой или плоскости самой по себѣ представляется совершенно безнадежнымъ; къ тому же свойства отдѣльной прямой, какъ носительницы точекъ, столь мало характерны, что они принадлежатъ также каждой кривой („нулевого типа“⁷⁹⁾, которая взаимно однозначно отображается на прямой.

19. Игакъ, одна возможность отобразить пространство въ себѣ самомъ при помощи коллинеаціи уже заранѣе обрекаеть на неудачу всякую попытку, имѣющую цѣлью однозначно опредѣлить пространственные образы и допущенныя ихъ соотношенія, не прибѣгая къ физическимъ законамъ⁸⁰⁾. Каждая коллинеація (и, въ частности, аффинная) одно-однозначно⁸⁰⁾ относитъ каждой точкѣ точку же, каждой прямой—прямую, каждой плоскости—плоскость въ качествѣ изображенія; и въ этомъ соотвѣтствіи нѣтъ ни малѣйшаго исключенія, между тѣмъ какъ при высшихъ преобразованіяхъ, какъ мы видѣли, всегда появляются основныя точки. Если поэтому мы будемъ относительно изображеній точекъ, прямыхъ и плоскостей употреблять выраженія „quasi инцидентны“, „quasi параллельны“,

⁷⁹⁾ Русскій терминъ не установился; по-французски „une courbe du genre 0“, по-нѣмски „eine Curve vom Geschlecht 0“. Такъ какъ этотъ терминъ встрѣчается здѣсь лишь попутно, то мы не считаемъ нужнымъ входить въ объясненіе этого сложнаго понятія.

⁸⁰⁾ Если, напримѣръ, мы строимъ прямую помощью визировація, то мы пользуемся закономъ прямолинейнаго распространенія свѣта.

⁸⁰⁾ Одно-однозначное (или совершенное) сопряженіе пространства съ самимъ собой—это такое сопряженіе, при которомъ не только каждой точкѣ соотвѣтствуетъ одна и только одна точка пространства, но и каждая точка является соотвѣтствующей одной и только одной точкѣ. Это есть однозначное сопряженіе, однозначно-обратимое.

quasi конгруэнтны и т. д., когда соответствующие этимъ изображениямъ оригиналы действительно находятся въ соотношеніи инцидентности, параллелизма, конгруэнтности и т. д., то этотъ способъ выраженія можно провести съ совершенно безукоризненной правильностью, даже, наприимѣръ, въ томъ случаѣ, когда изображеніе η' бесконечно удаленной плоскости оказывается конечнымъ, такъ что двѣ прямыя a' , b' , проходящія черезъ одну и ту же точку η' и представляющія собою изображенія прямыхъ a и b , придется называть quasi параллельными. Для большей наглядности, однако, мы займемся аффиннымъ преобразованиемъ пространства, при которомъ бесконечно удаленная плоскость переходитъ въ себя самое, и рассмотримъ, какое вліяніе оно оказываетъ на конгруэнтность.

Мы напомнимъ прежде всего Штейнеровы построенія при помощи линейки, изложенныя нами въ § 5-омъ, правда, частью нѣсколько нагляднѣе, но за то и менѣе просто, чѣмъ у Штейнера. Такъ какъ quasi параллелизмъ нашей псевдо-геометріи представляетъ собой также действительный параллелизмъ⁸¹⁾, то мы можемъ безъ вспомогательной окружности, одной линейкой откладывать отрѣзки, quasi конгруэнтныя данному на той же или на параллельной прямой. Для того же, чтобы откладывать quasi конгруэнтныя отрѣзки на пересѣкающихся прямыхъ, линейки не достаточно; въ первоначальномъ пространствѣ R , согласно § 5-му, для этого нужна сфера; въ преобразованномъ пространствѣ R' этой сферѣ отвѣчаетъ поверхность эллипсоида, которую мы будемъ называть quasi сферой и будемъ посредствомъ нея выполнять построенія § 5-го, какъ если бы это была действительно сфера. Эти построенія никогда не могутъ привести къ противорѣчію, хотя „конгруэнтность“, которую они воспроизводятъ, отлична отъ эмпирической. При помощи одной линейки можно построить безчисленное множество точекъ действительной сферы (пользуясь, однако, плоскостями), если даны три взаимно-перпендикулярныхъ діаметра. Ихъ изображенія называютъ взаимно-сопряженными діаметрами эллипсоида. Такъ какъ всѣ построенія при помощи линейки аффиннымъ преобразованиемъ переносятся со сферы на эллипсоидъ, а, съ другой стороны, эллипсоидъ вполне опредѣляется любыми тремя попарно сопряженными діаметрами, то мы можемъ дополнить сдѣланное въ п. 17 замѣчаніе о конгруэнтности сдѣлующимъ образомъ: Изъ cadaго осуществленія аксіомъ конгруэнтности можно получить при помощи аффиннаго преобразования пространство безчисленное множество другихъ; чтобы фиксировать одно изъ нихъ, можно любые три отрѣзка x , y , z , входящіе изъ одной точки O , принять за „взаимно перпендику-

⁸¹⁾ Такъ какъ quasi параллельныя прямыя имѣютъ общую бесконечно удаленную точку, которая остается бесконечно удаленной при аффинномъ преобразованіи, то онѣ являются и действительно параллельными.

Веберъ. Энциклоп. элемент. геометріи.

лярные" и „конгруэнтные“. Они опредѣляютъ тогда „сферу“, которая устанавливаетъ „конгруэнтность“ помощью построеній § 5-го. Если мы хотимъ, чтобы эта „конгруэнтность“ совпадала съ эмпирической, которую мы собственно привыкли называть этимъ словомъ, то для этого нѣтъ иного средства, какъ подобать эти отрѣзки x , y , z (пользуясь, скажемъ, циркулемъ) по возможности конгруэнтными и перпендикулярными въ эмпирическомъ смыслѣ слова.

20. Этимъ мы не желаемъ сказать, что, основываясь на этихъ допущеніяхъ, можно практически выполнять построенія; мы хотѣли только дать минимумъ операций, опирающихся на физическіе законы (ибо безъ нихъ мы не могли бы осуществить эмпирическую конгруэнтность и ортогональность отрѣзковъ x , y , z), при помощи которыхъ дальше мы могли бы уже строить остальные образы геометріи на основаніи совершенно абстрактныхъ построеній и однозначно установить основныя соотношенія, которыя требуются аксіомами. При этомъ категорически обнаруживается, что въ „геометрической“ геометріи извѣстные объекты необходимо нужно принимать, какъ напередъ данныя, именно, точки, прямая и плоскости,—что сюда должны быть еще присоединены и другія эмпирическія данныя, какъ, напримѣръ, у насъ здѣсь „равные и взаимно перпендикулярные“ отрѣзки x , y , z , если мы хотимъ, чтобы логически построенная геометрія въ нашемъ представленіи совпадала съ обычной. Эта точка зрѣнія уже не разъ высказывалась; первымъ ее, повидимому, высказалъ Гауссъ въ памятномъ письмѣ къ Бесселю (Bessel, 1829), въ которомъ онъ такъ выражаетъ свою математическую вѣру: „по глубочайшему моему убѣжденію, ученіе о пространствѣ занимаетъ по отношенію къ нашему знанію очевидныхъ истинъ совершенно иное положеніе, чѣмъ чистая наука о величинахъ; здѣсь наше познаніе совершенно не имѣетъ того полнаго убѣжденія въ ихъ необходимости (а слѣдовательно, и въ абсолютной ихъ истинности), которая свойственна послѣдней. Мы должны смиренно признать, что въ то время, какъ число представляетъ собой исключительно продуктъ нашего духа, пространство имѣетъ реальное существованіе помимо нашего духа, которому мы, такимъ образомъ, а priori не можемъ вполнѣ предписывать законы“.

Слово „вполнѣ“ здѣсь слѣдуетъ подчеркнуть, слово „пространство“ было бы точнѣ замѣнить выраженіемъ „пространственное расположеніе“. Въ правильности логическаго формализма геометріи Гауссъ, конечно, не сомнѣвался; но необходимость тѣхъ именно аксіомъ, на которыя этотъ формализмъ опирается, могла казаться ему проблематичной, такъ какъ онъ уже убѣдился, что помимо Евклидовой геометріи логически допустима также гиперболическая. Можно ли поддерживать въ настоящее время болѣе высокую оцѣнку ариѳметики — этотъ вопросъ мы оставимъ въ сторонѣ.

21. Это изреченіе Гаусса обнаруживает замѣчательное различіе, даже противоположность взглядовъ Гаусса и Ньютона. Послѣдній пытается построить свою механику въ абсолютномъ пространствѣ и въ абсолютномъ времени; именно онъ принимаетъ:

„Абсолютное, истинное математическое время протекаетъ само по себѣ, по своей природѣ, равномерно и безъ отношенія къ чему бы то ни было“.

„Абсолютное пространство остается по своей природѣ и безъ отношенія къ какому бы то ни было внѣшнему объекту всегда одинаковымъ и неподвижнымъ“. (*Philosophiae naturalis principia mathematica*).

Мысль Ньютона ясна: элементарная механика ориентируетъ всѣ процессы движенія относительно земли, какъ неподвижнаго тѣла, но, если мы сравнимъ землю съ солнечной системой, то окажется, что земля сама имѣетъ вращеніе, или, по крайности, что математически-механическое изображеніе движенія солнечной системы оказывается необычайно простымъ если мы принимаемъ солнце за „неподвижное“ тѣло и относимъ къ нему остальные движенія. Въ механикѣ солнечной системы для установленія системы координатъ пришлось бы уже воспользоваться, скажемъ, плоскостью эклиптики. Но по отношенію къ неподвижнымъ звѣздамъ солнце, какъ оказывается, само имѣетъ поступательное движеніе; для изслѣдованія этого движенія мы должны были бы приковать наши координаты къ своду неподвижныхъ звѣздъ. Но и это тщетно! Спектральный анализъ обнаружилъ также существованіе собственнаго движенія неподвижныхъ звѣздъ, и въ качествѣ послѣдняго убѣжища въ поискахъ за твердой опорой, быть можетъ, еще остается развѣ только млечный путь. Такимъ образомъ, астрономъ-практикъ теряетъ одну точку опоры за другой между тѣмъ какъ теоретикъ, который отнюдь не озабоченъ осуществленіемъ своихъ притязаній, исходитъ отъ абсолютнаго пространства, какъ отъ наиболѣе достовѣрнаго факта въ его сознаніи. Абсолютное пространство и абсолютное время ему совершенно необходимы при построеніи механики и физики; но они не представляютъ собою чего-либо такого, чѣмъ мы вполне владѣемъ; они составляютъ скорѣе конечную цѣль, къ которой мы стремимся тяжкимъ трудомъ и безконечными усиліями и которой никогда не достигнемъ. Эта точка зрѣнія, въ особенности относительно времени, вполне соотвѣтствуетъ также современному состоянію физики и механики, гдѣ фиксированіе времени представляетъ совершенно своеобразныя трудности *).

*) H. Poincaré. „La valeur de la science“.

§ 14. Интуиція.

1. Если мы пробѣжимъ въ обратномъ порядкѣ цѣльную, строго дедуктивную цѣль геометрическихъ теоремъ, то мы необходимо придемъ къ предложеніямъ, которыя дальнѣйшаго доказательства уже не допускаютъ и въ качествѣ „аксіомъ“ составляютъ основные законы въ области геометрической мысли; при такихъ условіяхъ законѣрное построение пространственныхъ образовъ, интуитивно соответствующихъ геометрическимъ понятіямъ, возможно только въ томъ предположеніи, что основные образы намъ даны. Такъ какъ плоскость можетъ быть образована при помощи пучка лучей, пересѣкающихъ данную прямую, то въ послѣдней инстанціи мы должны, такъ сказать, имѣть готовыми только прямыя линіи; изъ этого, конечно, не слѣдуетъ, что прямая можетъ быть опредѣлена сама по себѣ. Но опредѣленія плоскости при помощи аксіомъ (аксіомы I_4 , I_5 , I_6) можно избѣгать, если мы будемъ строить плоскость указаннымъ сейчасъ способомъ и примемъ въ качествѣ аксіомы, что прямая, встрѣчающая двѣ стороны треугольника, необходимо встрѣчаетъ и третью (при чемъ подъ сторонами мы разумѣемъ неограниченныя прямыя, образующія своимъ пересѣченіемъ треугольник⁸²⁾); только ученіе о параллелизмѣ въ Евклидовой геометріи требуетъ при такомъ изложеніи другой разработки.

Кромѣ того, нужно еще указать, какъ однозначно осуществить соотношенія, требуемыя аксіомами конгруэнтности. При осуществленіи конгруэнтности при помощи Штейнеровыхъ построеній, которыя мы съ этой именно цѣлью и предпослали въ § 5-омъ, въ каждой плоскости принимается еще существованіе окружности съ ея центромъ. Эти окружности могутъ дать одна сфера, которая, въ свою очередь, какъ указано въ § 13-омъ, можетъ быть построена по точкамъ, безъ дальнѣйшаго пособія аксіомъ конгруэнтности, по даннымъ тремъ конгруэнтнымъ и взаимно перпендикулярнымъ діаметрамъ; но равенство и ортогональность этихъ трехъ діаметровъ необходимы только для того, чтобы достигнуть совпаденія чисто абстрактной конгруэнтности съ эмпирической; помимо этого, какъ указано въ § 13-омъ, эти отрѣзки могутъ быть выбраны совершенно произвольно. Тогда то же построеніе по точкамъ даетъ уже, правда, не сферу, а эллипсоидъ, но quasi конгруэнтность, которую мы получаемъ при посредствѣ этого эллипсоида съ помощью Штейнеровыхъ построеній, удовлетворяетъ всѣмъ аксіомамъ (сѣченія діаметральными плоскостями теперь будутъ уже, конечно, эллипсами; но мы будемъ ихъ трактовать, какъ будто бы это

⁸²⁾ Это построеніе, собственно, и выполнено авторомъ ниже (гл. III, 4) при изложеніи проективной геометріи.

были окружности⁸³⁾. Если мы примем (согласно устанавливаемому нами определению) за „бесконечно удаленные“ точки те, которых мы не можем достичь, исходя от любой другой точки, конечным числом равных (с точки зрения аксиом конгруэнтности) шагов, то мы получаем еще более широкую геометрическую систему, которая удовлетворяет всем аксиомам Гильберта, не совпадая с нашей обычной интуитивной геометрией. Более того, мы не только можем совершенно произвольно выбрать три „диаметра“, не считаясь с их равенством и ортогональностью, но точка их пересечения O может даже не служить серединой каждого диаметра в эмпирическом смысле этого слова. И если мы при таких условиях будем вновь производить те же „сферические построения“, то мы получим эллипсоид, который в качестве (псевдо-)сферы определяет Евклидову (псевдо-)геометрию с Евклидовой конгруэнтностью. Некоторая плоскость η , „конечная“—с точки зрения наших обычных представлений, становится „бесконечно удаленной“ плоскостью этой псевдо-геометрии в смысле законов конгруэнтности, в ней царящих. В себе самой эта Евклидова псевдо-геометрия не содержит никакого противоречия. Когда выбрана „серединая“ O диаметральная прямая xx и проходящая через нее диаметрально плоскость xu , то диаметрально прямая yu может занять еще ∞^1 положений, а третья диаметрально прямая $z\bar{z}$ может занять еще ∞^2 положений; если, далее, мы на прямой xx фиксируем одну точку нашей „сферы“, то остальные пять точек наших диаметральных прямых, принадлежащих сферам, могут еще иметь ∞^3 различных положений⁸⁴⁾.

Итак, существует ∞^6 геометрий, которые оперируют с обыкновенными точками, прямыми и плоскостями и удовлетворяют всем аксиомам Евклидовой геометрии. Путем чисто геометрических определений ни одна из них не может быть выделена из всего комплекса. Напротив, для этого необходимо прибегнуть к движению твердого тела в эмпирическом смысле этого слова⁸⁵⁾.

⁸³⁾ Это значит, мы будем пользоваться эллипсом в соответствующей плоскости совершенно так же, как мы пользовались основной окружностью для производства Штейнеровых построений.

⁸⁴⁾ Под символом ∞^k разумют мощность многообразия (см. т. I, § 1), в котором каждый элемент определяется системой значений k независимых параметров (координат). Так, например, на плоскости имеется ∞^2 точек, ибо каждая точка определяется двумя координатами; в трехмерном пространстве имеется ∞^3 точек; в плоскости имеется ∞^3 прямых, ибо каждая прямая определяется двумя параметрами, а в пространстве имеется ∞^4 прямых.

Нужно сказать, что приведенное выше определение вызывает возражения, входящих в которые мы здесь не имеем возможности.

⁸⁵⁾ Независимо от понятия о конгруэнтности нельзя точно определить понятие о твердом теле; можно разве только сказать, что это—тело, которое

Этихъ важныхъ предложеній мы не имѣемъ возможности доказать элементарными средствами; тѣмъ не менѣе мы не хотѣли опустить ихъ вовсе, потому что они содержатъ указаніе на 8 постоянныхъ Евклидовой геометріи, которая чисто геометрическими методами не могутъ быть установлены. Противъ двухъ неевклидовыхъ геометрій съ идеалистической точки зрѣнія Канта часто указывали на ту единственную постоянную (параметръ) пространства, которая въ нашемъ осуществленіи этой геометріи фигурируетъ въ видѣ радіуса соответственно ортогональной или діаметральной сферы; существованіе такой постоянной именно и дѣлаетъ невозможнымъ признать образы нашего эмпирическаго созерцанія исключительно продуктомъ дѣятельности нашего духа. Именно, въ геометріи есть нѣчто, надъ чѣмъ наша мысль (еще?) не властвуетъ. Если же мы построимъ ту или другую неевклидову геометрію, не пользуясь движеніемъ, какъ мы это сдѣлали относительно Евклидовой, то она будетъ зависѣть отъ девяти произвольныхъ постоянныхъ.

2. При посредствѣ образовъ, которые мы предполагаемъ данными, можно образовать всѣ остальные съ помощью приѣмовъ, которые будутъ тѣмъ точнѣе, чѣмъ лучше наши исходные образы удовлетворяютъ требованіямъ аксіомъ. Такъ какъ это всегда можетъ быть осуществлено лишь съ большимъ или меньшимъ приближеніемъ, то чистая геометрія, свободная отъ всякихъ изъяновъ, существуетъ только идеально; ея образы не имѣютъ интуитивнаго существованія, они выливаются лишь въ схематизмъ Канта, въ законъ ихъ образованія.

Съ точки зрѣнія этой идеальной геометріи, система интуитивныхъ пространственныхъ образовъ должна быть признана весьма нагляднымъ, но несовершеннымъ осуществленіемъ чистыхъ идей. Къ тому же это не единственное возможное осуществленіе ихъ; точки, прямыя и плоскости являются только представителями родовыхъ понятій, именно пространственныхъ образовъ нулевой, первой и второй ступени въ трехмѣрномъ линейномъ многообразіи, и эти общіе образы также удовлетворяютъ аксіомамъ геометріи; поэтому обыкновенные пространственные образы осуществляютъ идеальную геометрію весьма многообразно: каждому изъ пространственныхъ образовъ можно присвоить роль идеальной точки. Такимъ образомъ, матеріальная точки, прямыя и плоскости обыкновенной геометріи являются только однимъ изъ безчисленнаго множества осуществлений, наглядной иллюстраціей идеальной геометріи, *paradeigma* (примѣръ), по выраженію Платона. Отдѣлить эти различныя интерпретаціи идеальной геометріи абстрактно одну отъ другой а priori, а не по отношенію къ одной изъ нихъ, составляетъ новую задачу геометріи, разрѣшеніе которой оказываетъ большое сопротивленіе усиліямъ нашихъ мускуловъ, когда мы его сжимаемъ.

рой, если оно вообще возможно, во всякомъ случаѣ потребуетъ введенія въ геометрію новыхъ понятій.

3. Итакъ, всѣ старанія, которыя прилагаютъ авторы популярных сочиненій по геометріи, интуитивно достигнуть при помощи предѣльных процессовъ точныхъ точекъ, прямыхъ и плоскостей, вполне соответствующихъ аксіомамъ, всегда относятся къ нашей интерпретаціи, къ этой одной иллюстраціи чистой геометріи; въ частности, опредѣленія основныхъ образовъ у Евклида можно признать развѣ только описаніемъ этихъ иллюстрацій. Въ обезпеченіе правильности геометрическихъ истинъ это не вноситъ ничего. Геометрія есть точная наука, потому что она сама строитъ свои основныя понятія; правда, она опирается при этомъ на опытъ и ставитъ опытыя задачи своею цѣлью; но первымъ источникомъ познанія,—по крайней мѣрѣ, для научной геометріи,—опытъ не служитъ. Для развивающейся системы геометріи опытъ имѣетъ исключительно то значеніе, что онъ приводитъ къ основной ея задачѣ—дать совмѣстно съ физикой и механикой координированную картину мірозданія. Безъ этой конечной своей задачи геометрія была бы отрѣзана отъ притока извнѣ новыхъ, плодотворныхъ идей; въ дѣлѣ познанія она играла бы не бѣольшую роль, чѣмъ остроумная игра,—напримѣръ, чѣмъ шахматная игра, которая тоже сама созидаетъ свои основныя понятія и аксіомы и могла бы быть названа точной наукой, если бы было установлено понятіе о самомъ правильномъ ходѣ (хотя бы путемъ дальнѣйшаго ограниченія аксіомъ игры). Но чтобы извѣстная логическая область была пригодна для абстрактнаго опредѣленія пространственныхъ образовъ, она должна почерпнуть въ нашихъ эмпирическихъ представленіяхъ уже готовые зачатки координирующей мысли и дать имъ свободное развитіе. Отсюда необходимость при преподаваніи исходить изъ опыта. Но такъ какъ начатки, взятые изъ эмпирическихъ представленій, еще не могутъ быть разносторонне между собой связаны, то мы не можемъ быть напередъ увѣрены, что при свободномъ развитіи они вообще окажутся совмѣстными. Такъ, напримѣръ, еще до того, какъ мы начинаемъ заниматься геометріей, мы уже находимъ въ себѣ сильно развитое понятіе о сходствѣ, или о подобіи, а также и представленія, что прямая въ каждомъ изъ двухъ своихъ направленій уходитъ въ бесконечность. Соединить эти двѣ бесконечно удаленныя точки въ одну, какъ это дѣлаетъ параболическая геометрія, значить впасть въ противорѣчіе съ нашимъ непосредственнымъ представленіемъ. Только при помощи псевдо-геометрическихъ доказательствъ (при помощи пучка лучей) можно убѣдиться, что эти точки „дѣйствительно“ совпадаютъ. Если мы теперь введемъ въ геометрическую систему понятіе о подобіи и о двухъ бесконечно удаленныхъ точкахъ на прямой, то не должны ли мы ожидать, что эти понятія совмѣстны? Между тѣмъ фактически оказывается, что это не имѣетъ мѣста: въ гиперболической

геометрии⁸⁵⁾ подобия не существует,—по крайней мере, в Евклидовом определении этого термина. Этот пример достаточно ясно обнаруживает, что распылчатая понятия, почерпнутая из опыта, не имеют достаточно определенного содержания; иначе между понятиями, приобретенными таким образом, не могло бы быть противоречия, если только мы не склонны подвергнуть сомнению возможность самого опыта. Опыта нельзя определить законами, которые каждый, так сказать, может ощущать собственными руками. То закономерное, что можно „почерпнуть интуицией“, в самом благоприятном случае есть лишь приближение, коренящееся в первых попытках нашей мысли координировать окружающее. Отсюда возникает обязанность геометрии доказать совместность основных ее посылок, как это впервые было сделано, в „Основаниях геометрии“ Гильберта.

4. Таким образом, если идеальная геометрия может гордиться творческой деятельностью человеческого духа, то эта гордость умирится все же сознанием, что идеальная геометрия, которую можно построить современными научными средствами, еще далеко не настоящая геометрия. Если задача геометрии заключается в том, чтобы при содействии механики и физики координировать все содержание наших ощущений и объединить их в одном цельном мирозерцании, то определение наших эмпирических пространственных представлений составляет как точку отправления, так и отдаленную, быть может, даже недостижимую цель всякой геометрии. Геометрическая система Паша, которую мы старались охарактеризовать в § 10-ом, как „натуральную геометрию“, знаменует, таким образом, в этом процессе эволюции геометрии не достигнутую цель, а только начало; ведь и эта геометрия счастливо прокладывает себе путь только благодаря тому, что она, в конце концов, все-таки работает отвлеченными понятиями, которая лишь приближенно определяет ее содержание. Только из этих абстрактных понятий она выводит свои теоремы и лишь потом ограничивает их силу различного рода дополнениями (на основании непрерывности пространства), как то: „на примере“, „вообще говоря“, „если части расположены не слишком неблагоприятно“ и т. п. Если бы некоторая геометрия хотела устанавливать свойства прямых и других линий на плоскости, начерченных карандашом и линейкой, то она должна была бы считаться с тем обстоятельством, что действительные точки всегда имеют протяжение, что прямая имеет толщину. Чтобы и здесь получить законы, можно было бы разсматривать точку, как маленький круг, прямую — как узкую полосу между двумя параллелями. Если мы будем двигать такую полосу в плоскости таким образом, чтобы она хоть частью покрывала две ее кругообразные точки

⁸⁵⁾ В которой прямая имеет две бесконечно удаленные точки.

A и B и въ предѣлѣ касалась ихъ, то она опишетъ область q (A, B) — „поле“, въ предѣлахъ котораго полосообразная прямая опредѣляется точками A и B ; два такихъ поля q (A, B) и q (C, D) имѣютъ тогда общую область ψ — „поле“ точки пересѣченія прямыхъ AB и CD . Задача такой геометріи заключалась бы въ томъ, чтобы установить зависимость поля q (A, B) отъ A и B и области ψ отъ q (A, B) и q (C, D). Быть можетъ, чтобы получить простые законы, пришлось бы приближенно замѣнить область q гиперболой, область ψ надлежащимъ образомъ подобраннымъ эллипсомъ; но это составляетъ одну изъ главныхъ задачъ „приближенной геометріи“, о чемъ мы уже говорили въ § 10-омъ. Врядъ ли нужно говорить, что и эта геометрія должна дѣлать упрощающія допущенія, — которыя, въ свою очередь, не были бы возможны, если бы за ними не стояла чистая геометрія, въ которой понятія о точкахъ, прямыхъ и плоскостяхъ строго опредѣлены. Если бы мы захотѣли избѣгать этой необходимости, скажемъ, соображеніями такого рода, что границы полосъ, въ свою очередь, представляютъ собой болѣе тонкія полоски, то этимъ болѣе тонкимъ полоскамъ вновь пришлось бы приписать границы и т. д. Такимъ образомъ, приближенная геометрія становится основой приближенной втораго порядка, на которая, въ свою очередь, опираются приближенія третьяго порядка и т. д. Но ни одна изъ этихъ системъ не могла бы сдѣлаться объектомъ научной обработки безъ допущеній, которыя предполагаютъ закономерность, согласную съ нашими теперешними понятіями, и это возможно только на почвѣ геометріи, располагающей опредѣленными понятіями о точкахъ, прямыхъ и плоскостяхъ. Отсюда съ безусловной необходимостью вытекаетъ, что мы поступаемъ совершенно целесообразно, если сознательно строимъ идеальную геометрію. Всякая геометрія, въ концѣ концовъ, есть геометрія идеальная, даже если она не ставитъ себѣ такихъ задачъ, — если это не обнаруживается ясно въ ея изложеніи *).

5. Однако, идеальная геометрія должна остерегаться постоянно повторяющейся ошибки, выражающейся въ стремленіи искусственно провести эмпирическія представленія въ согласіе съ чистыми, отвлеченными понятіями. Это есть, очевидно, обратное воздѣйствіе абстрактно совершенной геометріи на ея чувственный субстратъ, поскольку дѣло не сводится просто къ тому, чтобы пренебрегать уклоненіями реальныхъ образовъ отъ соответствующихъ понятій. Обыкновенно полагаютъ, что эти уклоненія могутъ быть искусственно устранены процессомъ предѣльнаго перехода. Исходя изъ той точки зрѣнія, что начерченные образы тѣмъ точнѣе соответствуютъ аксіомамъ, чѣмъ тоньше и тщательнѣе выполнены чертежи,

*) Геометрія, которая отклоняла бы такого рода идеальную постановку, необходимо должна была бы искать опору въ номинализмѣ.

дѣлають обыкновенно заключеніе, что эти (реальныя) фигуры достигнуть полной точности, если мы сведемъ точку совершенно къ нулю, совершенно лишимъ прямая ширины и толщины, а въ плоскости сохранимъ только длину и ширину, уничтоживъ ея толщину. На недопустимость такого вывода мы уже указали въ первой главѣ. Правильно проведенный процессъ предѣльнаго перехода можетъ имѣть только одну разумную цѣль: вызывая въ нашемъ представленіи безконечный рядъ точекъ, прямыхъ и плоскостей, которыя становятся все тоньше и тоньше, съ одной стороны, доказать возможность и необходимость идеи совершенно точныхъ основныхъ образовъ, а съ другой стороны,—дать процессъ, который обратно переносилъ бы эту идею на эмпирическіе объекты. Предѣльный процессъ представляетъ собой такимъ образомъ схематизмъ этихъ чистыхъ понятій, какъ его понимаетъ Кантъ, т. е. пріемъ, дающій возможность отнести эти понятія къ объектамъ. Что касается чистыхъ понятій о точкѣ, прямой и плоскости, то къ нимъ процессы предѣльнаго перехода не относятся, потому что роль точекъ могутъ взять на себя также сферы, окружности, числовыя группы и т. д.

6. Совершенно инымъ путемъ старается привести наши представленія въ согласіе съ чистыми понятіями Кантъ; онъ допускаетъ источникъ познанія геометрическихъ истинъ, отличный отъ чистаго мышленія и чувственного воспріятія, — чистое воззрѣніе а priori. Чтобы занять опредѣленную позицію относительно этого труднаго вопроса, оставаясь на почвѣ математическихъ соображеній, мы будемъ исходить отъ замѣчанія философа Наторпа (Natorp): „математики въ такой мѣрѣ всосали въ плоть и кровь общее понятіе о пространствахъ любого числа измѣреній и любой характеристики, что они часто перестаютъ понимать Евклидово, Ньютоново, Кангово понятіе о нашемъ пространствѣ, къ существеннымъ признакамъ котораго принадлежитъ его единственность. Это и не трудно себѣ уяснить: въ самомъ дѣлѣ, этотъ признакъ единственности коренится не въ математической сторонѣ дѣла, а предполагается уже самымъ понятіемъ существованія, которое вообще ничего иного не выражаетъ, какъ опредѣленность въ единственномъ видѣ, въ отличіе отъ безчисленнаго множества представляющихся возможностей; а это понятіе дѣйствительно и безусловно предполагаетъ единственность. Ни одно мѣсто существующаго не опредѣлено однозначно, если однозначно не опредѣлено само пространство, которое только и представляетъ собой систему условий опредѣленія мѣста. Хотя это требованіе само по себѣ отнюдь не математическое, отсюда вытекаетъ все же для математика задача показать, при какихъ предположеніяхъ эта система опредѣленія мѣста дѣйствительно будетъ замкнута въ самой себѣ, а слѣдовательно, будетъ единственной“. (Unterrichtsblätter für Math. u. Naturw., 1902, Heft 1.). Существованіе пространства (въ этомъ порядкѣ идей это означаетъ: геометрической системы, какъ одной един-

ственной, абсолютно определенной) есть основная предпосылка абстрактной механики; именно, послѣдняя предполагаетъ геометрію, въ которой конгруэнтность опредѣлена независимо отъ понятій о движеніи, чтобы обратное понятіе о движеніи и о твердомъ тѣлѣ можно было чисто абстрактно построить на конгруэнтности. Мы оказались бы въ ложисмѣ кругѣ, если бы мы захотѣли опредѣлить конгруэнтность при помощи движенія, а понятіе о твердомъ тѣлѣ при помощи конгруэнтности. Если мы предполагаемъ конгруэнтность, то движеніе представляетъ собой прежде всего, совершенно независимо отъ времени, процессъ образованія непрерывнаго ряда конгруэнтныхъ фигуръ, такъ что соответствующія точки непрерывно заполняютъ опредѣленныя кривыя—ихъ „пути“. Эти различныя фигуры называются „положеніями“ одной изъ нихъ, „движущейся“ фигуры; каждая изъ конгруэнтныхъ фигуръ можетъ быть принята за „движущуюся“. Разстояніе движущейся точки въ различныхъ ея положеніяхъ, измѣряемое по ея пути, называется пробѣгомъ, или пройденнымъ разстояніемъ до соответствующаго положенія. Подъ понятіемъ же времени мы разумѣемъ опредѣленіе, содержащее характеръ величины, которое должно быть присоединено, чтобы мы могли отличать различныя положенія движущейся точки; съ этой величиной должны быть однозначно и непрерывно сопряжены разстоянія, проходимыя движущейся точкой. Согласно этому опредѣленію время имѣетъ только одно измѣреніе и можетъ, такимъ образомъ, быть измѣрено и отображено при помощи одной переменнѣй t . Движеніе точки по прямолинейному пути называется „равномернымъ“, если проходимыя ею разстоянія пропорціональны времени; на этомъ, извѣстномъ способомъ, основываютъ опредѣленія скорости и ускоренія. Точки прямой могутъ быть безчисленнымъ множествомъ способовъ опредѣлены при помощи одной переменнѣй t ; это значитъ — точка можетъ двигаться по прямой безчисленнымъ множествомъ различныхъ способовъ. Тѣла, которыя попарно такъ опредѣлены*), что мы должны представлять себѣ ихъ въ движеніи, называются матеріальными тѣлами, если, при этомъ, при достаточномъ удаленіи всѣхъ остальныхъ тѣлъ каждая два тѣла движутся по направленію другъ къ другу⁸⁶⁾. Если при этомъ ихъ ускоренія равны (но прогивоположны по направленію), то мы говоримъ, что тѣла взаимно эквивалентны; если два матеріальныхъ тѣла эквивалентны съ третьимъ, то они эквивалентны другъ съ другомъ. Если изъ трехъ матеріальныхъ тѣлъ A_1, A_2, A_3 послѣднее въ присутствіи тѣла A_2 получаетъ болѣе сильное ускореніе, чѣмъ тѣло A_2 , и если, далѣе,

*) Указать, какъ это осуществляется,—задача будущаго.

86) Законъ всемірнаго тяготѣнія, который въ обыкновенной формулировкѣ уже предполагаетъ понятіе о матеріальномъ тѣлѣ, здѣсь принимается за точку отправленія и служитъ для опредѣленія матеріальнаго тѣла. Очень трудно сказать, въ какой мѣрѣ дѣйствительно возможно провести эту точку зрѣнія черезъ всю механику.

тѣло A_2 въ присутствіи A_1 ускоряется сильнѣе, нежели тѣло A_1 , то тѣло A_3 въ присутствіи тѣла A_1 ускоряется сильнѣе, нежели послѣднее; въ каждой комбинаціи третье тѣло предполагается достаточно удаленнымъ. Благодаря этимъ аксіомамъ эквивалентность подходитъ подъ понятіе величины; эта величина называется массой. Время и масса суть основныя понятія механики; предыдущія опредѣленія, по трудности предмета, должны только считаться предварительными попытками опредѣлить время и массу постольку, поскольку это необходимо для чистой механики. Для примѣненія этихъ понятій къ дѣйствительности долженъ быть еще данъ ихъ схематизмъ, законоположеніе, которымъ они вводятся. Схематизмъ измѣренія времени представляетъ чрезвычайныя трудности, которыя коренятся въ одномѣрности времени. Какъ мы на прямой не можемъ откладывать равныхъ отрѣзковъ безъ пособія другихъ пространственныхъ образовъ, такъ и равныя промежутки времени не могутъ быть эмпирически устанавливаемы конструктивно, а только при помощи какого-нибудь ритмическаго движенія, напримѣръ, біенія пульса или колебанія маятника. Относительно времени мы имѣемъ только общее воззрѣніе величины и чувство ритма, если отдѣльные такты слѣдуютъ другъ за другомъ не слишкомъ быстро и не слишкомъ медленно *).

При нашемъ изложеніи основныя понятія мы пытались разсматривать движеніе, какъ понятіе болѣе раннее, на которое опирается понятіе времени. Съ другой стороны, движеніе есть источникъ понятія о силѣ. Естественнымъ состояніемъ движенія матеріальной системы, „безъ посторонняго вліянія“, является только движеніе ея точекъ по прямымъ линіямъ. Происхожденіе другихъ путей извѣстнымъ способомъ объясняется силами, которыя „сообщаютъ“ тѣлу ускоренія въ различныхъ направленіяхъ; тѣло воспринимаетъ эти ускоренія, согласно закону параллелограмма силъ. Въ какой мѣрѣ срослась механика съ геометрией, съ особенной очевидностью явствуетъ изъ основнаго принципа, на которомъ великій физикъ Герцъ (Hertz построилъ всю механику: *Systema omne liberum perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directissimam* (Mechanik, p. 162).

7. Если Кантъ въ частностяхъ комбинируетъ всѣ эти вещи иначе, то чтеніе книги Ньютона „*Philosophiae naturalis Principia Mathematica*“ (London, 1687) все же должно было привести его къ соображеніямъ такого же рода, изъ которыхъ онъ почерпнулъ убѣжденіе необходимости одной геометріи, однимъ единственнымъ способомъ опредѣленной, такъ сказать, міровой геометріи. Что эту роль могла играть только Евклидова геометрія, было для Канта одной изъ неопровержи-

*) О современномъ состояніи механики см. подробный обзоръ Фосса (A. Voss, въ „Энциклопедіи математическихъ наукъ“—„*Encyklopädie der Math. Wissenschaften*“) Bd. IV.

мѣйшихъ научныхъ истинъ. Если бы эта точка зрѣнія была обоснована, то въ этомъ заключалось бы познаніе необычайной глубины и важности. Такое познаніе не могло бы быть почерпнуто изъ опыта, потому что при своей однозначности оно тогда необходимо обуславливало бы единообразіе и въ построеніи координированной системы міра; но оно не могло быть получено также и путемъ расчлененія понятій, потому что основныя понятія математики и механики образуются только при помощи аксіомъ⁸⁷⁾; въ качествѣ міровой геометріи, геометрія Евклида можетъ быть познана только въ своихъ аксіомахъ, которыя, однако, какъ таковыя, предшествуютъ основнымъ понятіямъ,—въ аксіомахъ, которыя только и дѣлаютъ возможными (формальныя) опредѣленія основныхъ понятій. Въ этомъ характерѣ всего этого познанія, въ основномъ его значеніи, которое только и дѣлаетъ возможнымъ единую строго логическую науку, и заключается то, что Кантъ хотѣлъ выразить словомъ а priori*).

Къ этому именно пункту примыкаетъ „Критика чистаго разума“ Канта и поясненія къ ней въ „Прологоменахъ“. Здѣсь считается установленнымъ, что математика и физика покоятся на познаніяхъ а priori. Но гдѣ же ихъ источникъ, если они не могутъ быть ни почерпнуты изъ опыта, ни получены расчлененіемъ понятій. Этотъ особенный источникъ познанія, изъ котораго должны были проистечь эти истины, Кантъ называетъ чистой интуиціей а priori. Но какъ же это возможно? Если бы интуиція давала намъ представленіе о вещахъ, какъ онѣ есть, сами по себѣ, то интуиція а priori была бы совершенно невозможна, ибо такія свойства объектовъ, которыя имъ принадлежатъ совершенно независимо отъ меня, я могу познать только путемъ созерцанія. „Правда и тогда остается непонятнымъ, какимъ образомъ созерцаніе наличной вещи можетъ дать мнѣ понятіе о томъ, какова она сама по себѣ, такъ какъ свойства ея не могутъ перейти въ мое воображеніе“ (**). Во всякомъ же случаѣ это не можетъ быть интуиціей а priori. До тѣхъ поръ, пока интуиція согласуется съ объ-

⁸⁷⁾ Это значитъ, что тѣ признаки, которые устанавливаются аксіомами, только и составляютъ все содержаніе понятія.

*) Опредѣленіе понятія а priori въ примѣненіи къ аналитическимъ и синтетическимъ сужденіямъ, которое Кантъ пытается дать въ своей „Эстетикѣ“, нельзя признать удачнымъ, потому что самое слово „сужденіе“ наводитъ на точку зрѣнія старой формальной логики; „сужденія“ въ старой логикѣ устанавливали соотношенія между понятіями, которыя она принимала, какъ готовыя, не интересуясь ихъ происхожденіемъ. Далѣе, всѣ „сужденія“ геометріи являются „аналитическими“, даже тѣ, которыя выражаются аксіомами, потому что, съ нашей точки зрѣнія, основныя понятія формально опредѣляются аксіомами. Синтетическими эти сужденія были лишь тогда, когда основныя понятія при ихъ посредствѣ были только пріобрѣтены, т. е. на той предварительной ступени познанія, которую старая логика считаетъ законченной раньше, чѣмъ она приступаетъ къ дѣлу, (или вовсе игнорируетъ).

**) „Prolegomena“, § 9.

ектами, мы не въ состояніи vybrаться изъ этого затрудненія. Но, быть можетъ, обратно, самыя вещи согласованы съ нашей внутренней интуиціей; быть можетъ, время и пространство представляютъ собой своеобразные координирующие принципы, свойственные нашему духу, при помощи которыхъ онъ распутываетъ хаосъ нашихъ ощущеній и созидаетъ общую картину нашего міровоззрѣнія? Только въ такомъ видѣ мы и можемъ представить себѣ познаніе а ріогі, „если оно представляетъ собою не что иное, какъ форму психической дѣятельности моего субъекта, которая предшествуетъ всѣмъ моимъ дѣйствительнымъ впечатлѣніямъ, вызваннымъ виѣшними предметами“ *). Строго говоря, субъектъ здѣсь могъ бы остаться въ сторонѣ, такъ какъ съ этой точки зрѣнія собственное „я“ въ такой же мѣрѣ представляетъ собой результатъ познанія, какъ и виѣшніе объекты. Последнія познаются, такимъ образомъ, не сами по себѣ, а въ томъ видѣ, въ какомъ они намъ представляются, прошедши черезъ горнило принциповъ нашего сознанія.

Къ этому приводится ученіе Канта о пространствѣ, его трансцендентальный идеализмъ, поскольку это ученіе вообще можетъ быть передано въ немногихъ словахъ. Мы преднамѣренно не дѣлали попытки передавать это ученіе въ полной чистотѣ, въ которой, можетъ быть, развита его математическая часть **), ибо и самъ Кантъ лишь въ отдѣльных мѣстахъ доходитъ до совершеннаго идеализма, преодолюющаго всякій сенсуализмъ. Въ частности, примѣры, которые Кантъ заимствуетъ изъ математики, часто совершенно непригодны для тѣхъ цѣлей, ради которыхъ онъ ихъ приводитъ, а иногда они даже не вполнѣ безупречны съ точки зрѣнія научной ***).

8. Въ виду стремленія современной геометріи развиться въ строго абстрактную науку, мы не можемъ относиться безразлично къ тому, приходится ли считаться помимо отвлеченнаго мышленія еще съ какимъ-либо инымъ источникомъ геометрическаго познанія и при томъ съ такимъ, который играетъ не одну только наводящую роль, но и претендуетъ на абсолютную достовѣрность. Мы не можемъ вслѣдствіе этого уклониться

*) „Prolegomena“, § 9.

***) Въ томъ направленіи, какъ это дѣлаютъ Когенъ (Cohen), Наторгъ (Natorp); см., напримѣръ: Natorp, „Social Pädagogik“, §§ 1—5. Все то, что пишутъ объ основахъ математики философы, требуетъ крайне серьезной критики; въ общемъ получается впечатлѣніе, что трудность задачи недостаточно оцѣнивается; это непріятное слѣдствіе (Нео-)Кантова идеализма, который питаетъ надежду вывести основные законы математики и механики изъ общихъ логическихъ принциповъ. Борьба съ грубымъ эмпиризмомъ не должна вести къ полному отрицанію опыта; идеализмъ (ученіе, къ которому мы и сами близко примыкаемъ) несомнѣнно долженъ былъ бы отвести больше мѣста эмпиризму.

***) См., напримѣръ, „Prolegomena“, § 12 и § 13, которые содержатъ совершенно недопустимыя опредѣленія конгруэнтности.

отъ того, чтобы занять определенную позицію по отношению къ гносеологическимъ взглядамъ Канта; именно, мы попытаемся разобрать доказательства и математическія разсужденія Канта съ точки зрѣнія математической критики, сдѣлавшей уже послѣ Канта значительные успѣхи.

Того сознанія совершенно исключительнаго значенія Евклидовой геометріи, какъ системы, съ необходимостью обусловливаемой единствомъ точнаго естествознанія, — научнаго убѣжденія въ необходимости ея аксіомъ для объясненія мірозданія въ такомъ видѣ, какъ это предполагаетъ Кантъ, мы въ настоящее время не имѣемъ и пока имѣть не можемъ: наши познанія объ основахъ математики и физики имѣють еще столько пробѣловъ, что обоснованный взглядъ на ихъ необходимость еще не могъ сложиться. Между физикой эѳира и физикой вѣсомой матеріи зияетъ бездна, которая постоянно углубляется по мѣрѣ того, какъ мы пытаемся развивать эти науки строго абстрактно на подобіе геометріи, исходя изъ строго формулированныхъ аксіомъ; даже опредѣлить строго абстрактно эти двѣ области міра явленій представляется уже необычайно труднымъ; такъ, напримеръ, сдѣланная нами выше въ п. 6 попытка опредѣлить матерію, оказалась бы непригодной, если бы помимо силы тяготѣнія дѣйствовала еще какая-либо другая основная сила притяженія безъ отталкиванія. Такъ какъ, слѣдовательно, большія отрасли физики, можно сказать, еще вовсе не связаны внутреннимъ единствомъ, то представляется совершенно невозможнымъ съ абсолютной увѣренностью рѣшить, можетъ ли Евклидова геометрія, или какая-либо иная, лечь въ основу этихъ наукъ, не приводя къ противорѣчію.

9. Замѣчательно, что Кантъ и его послѣдователи признавали недопустимымъ разрѣшать при помощи опыта *)), есть ли Евклидова геометрія „наша реальная“ геометрія или нѣтъ. Цѣль и предпосылки опытнаго изслѣдованія, конечно, не всегда строго опредѣляются. Посредствомъ провѣрочнаго измѣренія нѣтъ, конечно, возможности даже пытаться рѣшить, правильна ли Евклидова (или какая бы то ни была другая геометрическая система), т. е. свободна ли она отъ логическаго противорѣчія. Это неосуществимо ни въ какой геометріи, потому что основные образы никакой геометріи мы не можемъ реально изобразить, исходя изъ аксіомъ. Но въ этомъ нѣтъ необходимости, потому что правильность Евклидовой (равно какъ и обѣихъ неевклидовыхъ геометрій) можно доказать строго логически, на основаніи ея аксіомъ. Но за то мы можемъ себя спросить, соответствуютъ ли дѣйствительно (приближенно) всѣ тѣ образы, многообразные по своему происхожденію, которые мы въ повседневной жизни именуемъ прямыми, аксіомамъ Евклидовой геометріи. Можемъ ли мы, на-

*) Къ этой мысли пришелъ ужь, между прочимъ, и Іоаннъ Больэ (J. Bolyai). Ср. P. Stäckel, De ea Mechanica analyticae parte, quae ad varietates complurium Dimensionum spectat.

примѣръ, построивъ циркулемъ и линейкой „треугольникъ“, измѣривъ его углы транспортиромъ, дѣйствительно знать а priori, что сумма угловъ съ достаточнымъ приближеніемъ составитъ два прямыхъ. Конечно, это было бы возможно, если бы мы могли придать линейкѣ (приближенно) ту закономерность, которую требуютъ аксіомы. Но это не имѣетъ мѣста. Для изготовленія линейки мы пользуемся не той закономерностью, которой требуютъ аксіомы, а движеніемъ свѣта: мы стараемся, чтобы ея ребра при визированіи сводились въ точку; можетъ также быть, что ребро сдѣлано „прямымъ“ чисто механическими средствами. Но, съ другой стороны, мы можемъ, конечно, изъ опыта познать, что линія, воспроизводимая линейкой, въ достаточной мѣрѣ удовлетворяютъ требованіямъ аксіомъ расположенія и сопряженія, конгруэнтности и непрерывности; но остается ли также въ силѣ аксіома о параллельности, этого мы съ полной увѣренностью сказать не можемъ, такъ какъ она не зависитъ отъ остальныхъ аксіомъ.

Итакъ, задача эксперимента заключается не въ томъ, чтобы рѣшить, правильны ли предложенія одной или другой геометріи; онъ можетъ только указать, примѣняется ли она къ эмпирическимъ пространственнымъ образамъ, построеннымъ тѣмъ или инымъ способомъ. При этомъ способъ ихъ построения долженъ быть точно указанъ, иначе вся задача теряетъ содержаніе. Чѣмъ больше треугольникъ, тѣмъ больше могло бы оказаться отклоненіе суммы угловъ отъ двухъ прямыхъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ становится труднѣе и самый опытъ. Если при небольшихъ треугольникахъ возможно еще обойтись средствами механики, то при измѣреніи большихъ треугольниковъ на земной поверхности или въ небесномъ пространствѣ приходится пользоваться законами оптики. Въ самомъ дѣлѣ, углы здѣсь измѣряются теодолитомъ, а потому стороны треугольника представляютъ собой свѣтовые лучи; съ другой стороны, раздѣленный кругъ теодолита изготовленъ на токарномъ станкѣ; его круглая форма воспроизведена. слѣдовательно, путемъ вращенія твердаго тѣла. При осуществленіи этого измѣренія оказываются, такимъ образомъ, совмѣстное дѣйствіе два совершенно раздѣльныхъ міра—этеръ и матерія. Конечно, свѣтовые лучи, натянутыя нити, оси вращенія и т. д.—суть прямая линія въ ходячемъ значеніи этого слова, но не представляютъ ли они только приближеній, этого мы знать не можемъ; въ частности, будетъ ли направленіе распространенія свѣта тождественно съ траекторіями твердыхъ тѣлъ, движущихся по инерціи, каковыя въ теоретической механикѣ, по опредѣленію, представляютъ собой (Евклидовы) прямыя линіи,—это еще теоретически не доказано. Мыслимо и то, что свѣтовые лучи осуществляютъ неевклидову геометрію, траекторіи инерціи—Евклидову, т. е. что лишь въ этомъ предположеніи они могутъ найти себѣ объясненіе въ общей научной системѣ. Даже когда мы чисто механически дѣлаемъ треугольникъ и измѣряемъ его, то и тутъ остается мѣсто сомнѣнію. Дѣло въ томъ, что при

обычномъ построении механики мы предполагаемъ, безъ особаго обоснованія, Евклидову геометрію и опредѣляемъ траекторіи тѣлъ, движущихся по инерціи, какъ прямыя линіи. Но въ такомъ случаѣ, по меньшей мѣрѣ, было бы необходимо доказать, что эта геометрія совмѣстима съ тѣми аксіомами, которыя вносятъ традиціонная механика. Что въ этомъ отношеніи возможны коллизіи, обнаруживаеы слѣдующій примѣръ. Четвертую вершину D параллелограмма $ABCD$ можно построить по тремъ остальнымъ, соединяя середину M діагонали AC съ вершиной B и откладывая на продолженіи отрѣзокъ $MD=MB$. Отсюда ясно, что такъ называемый параллелограммъ силъ въ механикѣ совершенно безъ нужды прибѣгаетъ къ понятію о параллельности, ибо точку D , къ которой собственно сводится вся суть дѣла, можно опредѣлить и построить, пользуясь исключительно аксіомами конгруэнтности; въѣдъ этотъ законъ имѣеть въ виду установить только равнодѣйствующую слагающихъ BA и BC по величинѣ и направленію, все же остальное представляетъ собой придатки геометрическаго характера. Собразно этому могло бы казаться, что и въ двухъ неевклидовыхъ геометріяхъ сложение силъ и скоростей могло бы производиться при помощи этого построения. Между тѣмъ въ дѣйствительности это далеко не такъ! Въ самомъ дѣлѣ, если мы построимъ для трехъ силъ x, y, z , расположенныхъ въ одной плоскости и имѣющихъ общую точку приложенія O , равнодѣйствующія ξ, η, ζ трехъ паръ $(y, z), (z, x)$ и (x, y) , а затѣмъ построимъ равнодѣйствующія a, b, c трехъ паръ $(\xi, x), (\eta, y), (\zeta, z)$, то эти послѣднія (т. е. a, b, c) должны всѣ совпасть по самому понятію о равнодѣйствующей, въ силу той аксіомы механики, что силы, имѣющія общую точку приложенія, имѣють опредѣленную равнодѣйствующую. Эта аксіома механики предъявляетъ, такимъ образомъ, къ геометріи весьма существенныя требованія. Совпаденіе отрѣзковъ a, b, c при этомъ построении⁸⁹⁾ имѣеть мѣсто только въ Евклидовой геометріи, т. е. существенно предполагаетъ аксіому о параллельности: въ обѣихъ неевклидовыхъ геометріяхъ эти отрѣзки не совпадаютъ. Кстати замѣтимъ, что отсюда отнюдь не слѣдуетъ, будто Евклидова геометрія есть единственно возможная въ механикѣ; отсюда вытекаетъ только, что приведенное выше построение равнодѣйствующей двухъ силъ ни въ одной изъ неевклидовыхъ геометрій не можетъ служить основой опредѣленія равнодѣйствующей; здѣсь необходимо установить другое построение, которое удовлетворяло бы поставленному выше требованію, т. е. при которомъ отрѣзки a, b, c всегда бы совпадали *). Если это построение по своему результату со значительнымъ

⁸⁹⁾ Т. е. при томъ способѣ построения, который былъ указанъ выше.

*) Такое построение далъ Дависъ (E. Davis, „Die geometrische Addition in der hyperbolischen Geometrie“, Diss. Greifswald, 1904). Представляется ли это построение единственно возможнымъ, этого съ увѣренностью сказать нельзя.

Веберъ. Энциклоп. элемент. геометріи.

приближеніемъ согласуется съ обычнымъ (такъ какъ о полномъ совпаденіи не можетъ быть рѣчи), то по отношенію къ этому приему опасеніи, что онъ приведетъ къ противорѣчію съ остальными аксіомами механики, умѣстно лишь въ той же мѣрѣ, какъ и по отношенію къ Евклидовой геометріи и къ обычному въ ней построенію равнодѣйствующей.

10. Нерѣдко высказывалось мнѣніе, что взгляды Канта опровергнуты уже самымъ созданіемъ неевклидовыхъ геометрій. Но Кантъ, съ своей точки зрѣнія, могъ допустить эти новыя геометрическія системы, какъ области чистаго мышленія, совершенно такъ же, какъ это и сейчасъ дѣлаютъ многіе математики, когда рѣчь идетъ о геометріи многихъ измѣреній. Онъ только отказалъ бы этимъ дисциплинамъ въ „реальности“. Мы полагаемъ, однако, что намъ выше удалось доказать, что обѣ неевклидовы геометріи допускаютъ реализацію именно на почвѣ Евклидовой геометріи; онѣ не представляютъ собой, слѣдовательно, фантастическихъ сплетеній ума, какъ это часто утверждали. Врядъ ли съ точки зрѣнія Канта можно противъ этого возразить, что при такой реализаціи точки не представляютъ собой дѣйствительныхъ точекъ; задача, которая здѣсь возникаетъ, разрѣшена тѣмъ построеніемъ обѣихъ неевклидовыхъ геометрій, которое дано Кели и Клейномъ, и сущность котораго мы имѣемъ въ виду указать въ третьей главѣ. Это осуществленіе неевклидовой геометріи находится приблизительно въ такомъ же отношеніи къ нашей интерпретаціи, какъ обыкновенная геометрія къ параболической сѣти; въ основѣ его лежатъ точки, прямыя и плоскости Евклидовой геометріи, сохраняющія свои наименованія. Благодаря этому, думается намъ, вопросъ принимаетъ рѣшающій оборотъ; ибо, если пространственная координація, устанавливаемая Евклидовой геометріей, даетъ возможность осуществлять неевклидову геометрію, то оспаривать реальность неевклидовой геометріи, какъ это дѣлаютъ многіе послѣдователи Канта, представляется уже невозможнымъ. Уже въ виду нашихъ элементарныхъ осуществленій неевклидовыхъ геометрій послѣднія являются лишь особыми главами Евклидовой геометріи, только выраженными своеобразнымъ искусственнымъ языкомъ. Мы не сомнѣваемся и въ томъ, что возможно обратно воспроизвести Евклидову геометрію при помощи неевклидовой; безконечно удаленная область Евклидовой геометріи можетъ быть также отображена на конечномъ протяженіи, ибо безконечно удаленное означаетъ только то, „что не можетъ быть достигнуто конечнымъ числомъ шаговъ при движеніи, какъ оно понимается въ этой геометріи“, т. е. „не можетъ быть измѣрено послѣдовательнымъ рядомъ точекъ, равно удаленныхъ, въ смыслѣ принятой въ этой геометріи конгруэнтности“. Предложеніе о единственности Евклидовой геометріи въ той мѣрѣ, въ какой оно нужно Канту, на нашъ взглядъ, отнюдь не уничтожается признаніемъ неевклидовой геометріи; оно должно лишь быть иначе формулиро-

вано (ср. § 11).—Исходя отъ какой-либо геометрии A ,—скажемъ, отъ Евклидовой,—можно построить множество многообразій и изслѣдовать въ нихъ законы сопряженія. Если затѣмъ, исходя отъ этихъ законовъ сопряженія, мы независимо опредѣляемъ многообразіе B , при чемъ совокупность законовъ сопряженія, необходимыхъ и достаточныхъ для его построения, принимается за систему аксіомъ, то такимъ образомъ получается „геометрія B , содержащаяся въ системѣ A “, или, общѣе, область мышленія B , содержащаяся въ другой области мышленія A . Двѣ такіа геометрическіа области мысли, изъ которыхъ каждая содержится въ другой, мы будемъ называть эквивалентными; тогда предложеніе о реальности, какъ его понимаетъ Кантъ, сводится къ слѣдующему: геометрія можетъ быть признана реальной въ томъ случаѣ, если она эквивалентна Евклидовой геометріи. Выдвигаемая такимъ образомъ задача—найти критерій эквивалентности двухъ такихъ областей нашей мысли—очень трудна; достаточно сообразить, что въ Евклидовой геометріи содержатся многообразія какого угодно числа измѣреній и при томъ какъ линейныя, такъ и нелінейныя. Разрѣшеніе этой проблемы было бы не менѣе важно для геометріи, какъ и для оцѣнки теоріи познанія Канта. Ибо такіе критеріи должны были бы дать глубочайшіа основы, свободныя отъ всѣхъ частныхъ и отъ всѣхъ особенностей случайно избранной точки зрѣнія,—а въ то же время необходимы и достаточныя для построения Евклидовой системы; но по Канту это были бы познанія *a priori*. Аксіома о параллельности не могла бы принадлежать къ числу этихъ критеріевъ, ибо она не имѣетъ мѣста ни въ одной ни въ другой неевклидовой геометріи; напротивъ, непрерывность должна была бы войти въ составъ этихъ критеріевъ.

11. Когда уже исчерпанъ вопросъ о реальности обѣихъ неевклидовыхъ геометрій, задача о единственности Евклидовой координаціи пространства можетъ быть выражена точнѣе. При чисто абстрактномъ и строго геометрическомъ построеніи какъ Евклидовой системы, такъ и неевклидовыхъ геометрій, конгруэнтность опредѣляется и доказывается не такъ, какъ это дѣлается обычно,—наложеніемъ при помощи движенія,—а рядомъ построений; эти построения опираются только на тѣ аксіомы, которыя остаются по выключеніи аксіомъ о параллельности и конгруэнтности, матеріально же они предполагаютъ лишь основные образы, которые признаются существующими. На этомъ опредѣленіи конгруэнтности мы уже, въ обратномъ порядкѣ, какъ это было намѣчено въ п. 6, строимъ понятіе о движеніи, которое совершенно свободно отъ понятія о времени; напротивъ, выведенное уже отсюда понятіе о времени даетъ лишь возможность ближе опредѣлить движеніе. Каждой изъ трехъ геометрій соответствуетъ при этомъ свое „движеніе“ и свое „время“. вмѣстѣ съ тѣмъ взглядъ Канта на единственное, исключительное положеніе Евклидовой геометріи нужно понимать такъ, что только „движеніе“ и „время“ Евкли-

довой геометрии имѣютъ дѣйствительное существованіе. Отрицается, такимъ образомъ, не реальность эллиптической и гиперболической геометрій, а только дѣйствительность свойственныхъ имъ „движеній“ и „времени“; то, что, съ точки зрѣнія этихъ двухъ геометрій, въ силу извѣстныхъ аналогій, именуется „движеніемъ“, „временемъ“, „твердымъ тѣломъ“, это въ логически правильной научной системѣ механики и физики не можетъ служить для опредѣленія процессовъ движенія. Евклидово движеніе есть единственное движеніе; Евклидовы твердыя тѣла суть единственныя твердыя тѣла; Евклидово время есть единственное время; короче говоря, это суть тѣ великія познанія а priori, которыя дѣлаютъ Евклидову геометрію единственно возможной въ механикѣ.

Мы менѣе всего желали бы оспаривать, что Евклидова геометрія по сіе время наилучшимъ образомъ выполняла свою задачу въ механикѣ, въ физикѣ и въ астрономіи; мы полагаемъ также, что она будетъ выполнять ее и впредь; но необходимость этой геометрій, какъ единственно возможной основы естествознанія, никогда и ни въ какомъ-случаѣ не была познаніемъ а priori, которымъ мы уже располагаемъ; въ лучшемъ случаѣ, это есть познаніе, которое мы надѣемся приобрести въ ходѣ прогрессивнаго развитія всего нашего знанія. У Канта единственную логическую опору всего нашего знанія составляютъ, такъ сказать, нѣсколько мощныхъ столповъ, которые несутъ на себѣ все зданіе науки; было бы правильнѣе представить себѣ фахверкъ, въ которомъ перекладины многообразно скрещиваются, взаимно укрѣпляя другъ друга. Такъ и аксіомы геометрій и механики сплетаются другъ съ другомъ, и ни одна изъ нихъ не можетъ быть опущена безъ того, чтобы это не отразилось на прочности всего остального. Мы приводили уже примѣры въ н. 9-мъ, ихъ можно было бы очень легко умножить. Весь этотъ вопросъ можно будетъ рѣшить лишь тогда, когда передъ нами будетъ строго абстрактная система чистой механики, когда мы будемъ въ состояніи обзрѣть, возможно ли ее провести въ физикѣ эфира. Единственность опредѣленной геометрій представляетъ собой, такимъ образомъ, не основу, а проблему познанія, и при томъ проблему чрезвычайно трудную, ибо вопросъ о томъ, въ состояніи ли абстрактная, но логически правильная система механики служить для опредѣленія дѣйствительныхъ процессовъ естествознанія, можетъ быть, за отсутствіемъ другихъ критеріевъ, рѣшенъ только тогда, когда она будетъ осуществлена. То же знаніе, которымъ мы располагаемъ въ настоящее время, можетъ быть съ одинаковой точностью охвачено различными системами механики, различіе которыхъ можетъ обнаружиться лишь въ весьма удаленныя времена на весьма удаленныхъ образахъ; и только тогда окажется возможнымъ избрать наиболѣе подходящую систему. Всѣ попытки доказать, что „неевклидовы системы механики“, т. е. системы механики, основанныя на неевклидовыхъ геометріяхъ, несовмѣстны съ опытомъ, сводятся къ тому, что выдвигаютъ нѣкоторые законы

такой механики, находящиеся въ противорѣчїи съ тѣмъ опытомъ, которымъ мы по настоящее время располагаемъ. Но вмѣстѣ съ этимъ оказывается, что нужно только приписать тѣмъ константамъ неевклидовыхъ геометрій, которыя въ нашемъ осуществленїи послѣднихъ представляютъ собою радиусы ортогональной или діаметральной сферы, достаточно большія значенія^{*)} и уклоненія, о которыхъ идетъ рѣчь, становятся столь ничтожными, что они падаютъ совершенно за предѣлы опыта, по сіе время намъ доступнаго. Это не приводитъ насъ, однако, къ коллизїи съ основнымъ требованїемъ естествознанія установить законы, дѣйствующіе повсемѣстно въ пространствѣ. Существуютъ вѣдь такіе законы природы, какъ, напримѣръ, аберація свѣта, которые становятся доступными наблюденїю только при весьма большихъ разстоянїяхъ; слѣдовательно, и тѣ „противорѣчїя“ съ наблюдаемыми въ дѣйствительности законами природы, о которыхъ была рѣчь, могутъ объясняться сравнительно небольшими размѣрами доступнаго намъ опыта въ пространствѣ и во времени. Съ другой стороны, положить одну или другую неевклидову геометрію въ основу механики и физики могло бы быть цѣлесообразнымъ лишь въ томъ случаѣ, если бы обнаружилось, что это приведетъ къ болѣе простой законмѣрности въ эмпирической дѣйствительности, нежели при старыхъ методахъ. Однако, необходимымъ для этого опытомъ мы еще не располагаемъ.

12. Къ этому мы хотимъ еще прибавить, что всѣ аргументы, которые приводятся въ пользу Евклидовой геометріи на конечномъ протяженїи, пригодны также для параболической сѣти сферъ, даже болѣе того, для любой сѣти поверхностей второго порядка, имѣющихъ такую же структуру, какъ названная сѣть сферъ. Но эти сѣти F^2 могутъ быть построены независимо отъ аксіомы о параллельности. Ниже, въ отдѣлѣ графической статики, мы увидимъ, что именно параболическая сѣть сферъ является наиболѣе естественной основой ученія объ астатическомъ равновѣсїи; мы построимъ тамъ на этой основѣ систему однородныхъ координатъ, въ которыхъ окружности сѣти выражаются линейными уравненїями. Хотя это уже подробно изложено въ § 13-мъ, мы считаемъ нелишнимъ по поводу этого примѣра еще разъ указать, что формальная сторона Декартовой координаціи далеко еще не опредѣляетъ Евклидова пространства, а развѣ только область Евклидовыхъ разсужденій. Другой примѣръ, когда задачу механики можно было—правда, косвеннымъ образомъ,—перенести въ неевклидову геометрію, и именно въ геометрію сферической сѣти, удалось дать Клейну и Зомерфельду (Sommerfeld). Эти геометры нашли, что движеніе тяжелаго шарового волчка можно изучать по движенію точки въ „сферическомъ“

^{*)} Съ точки зрѣнїя неевклидовыхъ геометрій, эта константа называется кривизной соответствующаго пространства. Понятїе это, однако, трудно выяснитъ въ элементарномъ сочиненїи.

пространствѣ трехъ измѣреній, которое совпадаетъ съ нѣкоторой непараболической сѣтью сферѣ. Вообще механика неевклидовыхъ и многомѣрныхъ пространствѣхъ пріобрѣтаетъ все большее и большее значеніе. На этомъ въ высшей степени интересномъ вопросѣ мы не имѣемъ возможности остановиться здѣсь подробно и отсылаемъ читателя къ (предварительной) статьѣ Штеккеля „Рефератъ о механикѣ многомѣрныхъ многообразій“^{*)}, а также къ упомянутой уже выше его юбилейной статьѣ, помѣщенной въ сборникѣ въ память Больэ. Въ виду элементарнаго характера настоящаго сочиненія, мы были бы вполнѣ удовлетворены, если бы намъ удалось обратить вниманіе читателя на эти проблемы, равно интересныя для естествоиспытателей и философовъ, если бы намъ удалось вызвать интересъ къ болѣе глубокому изученію этихъ вопросовъ. Но для этого необходимо познакомиться съ оригинальными работами, которыя указаны ниже, въ литературномъ обзорѣ.

13. Прежде, чѣмъ сдѣлать окончательные выводы по вопросу объ апріорности пространства, мы должны упомянуть еще объ одномъ соображеніи, которое часто приводится въ пользу Евклидовой геометріи; именно, что возможность переноснаго движенія (параллельнаго перенесенія) связана только съ Евклидовой геометріей. Здѣсь дѣло обстоитъ совершенно такъ же, какъ съ параллелограммомъ силъ. Именно, если мы опредѣлимъ переносное движеніе, какъ такое движеніе неизмѣняемой системы, при которомъ всѣ точки описываютъ параллельныя прямая, или, по крайней мѣрѣ, прямая, образующія связку, то такое движеніе можетъ въ Евклидовой геометріи осуществляться точно; въ обѣихъ же неевклидовыхъ геометріяхъ только приближенно: здѣсь, при безпредѣльно продолжающемся движеніи, система необходимо должна была бы измѣнить свою форму. Напротивъ, въ параболической сѣти сферѣ это движеніе можетъ быть произведено съ полною точностью. Однако, это ничего не говоритъ противъ неевклидовыхъ геометрій. Въ самомъ дѣлѣ, абсолютно точныхъ переносныхъ движеній, во всей строгости этого понятія, какимъ его предполагаетъ идеальная геометрія, конечно, не существуетъ, какъ не существуетъ абсолютно твердыхъ тѣлъ. Все это суть „только“ идеи, посредствомъ которыхъ мы стараемся ориентироваться въ изобиліи явленій природы. Всѣ наши измѣренія опредѣляютъ соответствующій объектъ лишь неточно, частью вслѣдствіе неточностей метода (которыя подлежатъ еще устраненію), а частью вслѣдствіе того, что ни одно явленіе не можетъ быть изолировано во всей своей чистотѣ, которая необходима для совершенно точнаго производства наблюденія и измѣренія. Такъ, напри- мѣръ, равноплечій рычагъ съ двумя равными грузами справа и слѣва, на

^{*)} P. Stäckel. „Bericht über die Mechanik mehrfachen Mannigfaltigkeiten“ Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung. 12 (1903).

который помимо этого абсолютно ничто не влияет, есть „только“ идея. Земной магнетизмъ, сила тяжести, изменяющаяся съ широтой мѣста, притяженіе небесныхъ тѣлъ, каждый лучъ свѣта, многіе миллионы точчайшихъ пылиннокъ, словомъ, все необозримое множество вліяній дѣлають совершенно невозможной чистоту явленій природы. Такимъ образомъ, законъ рычага не представляетъ собой факта, наблюдаемаго въ его абсолютной точности, а, напротивъ, представляетъ собой одно изъ абсолютно точныхъ допущеній, которое мы въ правѣ принять (если оно совмѣстимо съ остальными точными допущеніями), чтобы вообще опредѣлить физическіе факты. Аналогичную гипотезу представляетъ собой свободное паденіе тѣла. Кромѣ притяженія земли, которое, строго говоря, возрастаетъ съ приближеніемъ къ центру земли, на падающее тѣло вліяетъ сопротивленіе воздуха, центробѣжная сила земли, горныя массы, которыя могутъ находиться по близости, притяженіе небесныхъ тѣлъ, а также многія другія обстоятельства, перечислять которыя было бы утомительно. Естествознаніе такимъ образомъ не наблюдаетъ явленій въ чистомъ видѣ, а допускаетъ ихъ, чтобы имѣть возможность оформить наблюденія въ законы; оно не исходитъ изъ точныхъ фактовъ; напротивъ, констатировать дѣйствительность, въ абсолютно точномъ значеніи слова,—представляетъ его отдаленную цѣль, достиць которой никогда не будетъ возможно. Формулы естествознанія отнюдь не представляютъ собой сокращенныхъ таблицъ наблюденій, математическія формулы далеко не столь объективны; онѣ содержатъ законы для получения не только наблюденныхъ чиселъ, но и промежуточныхъ. Но исключительно при помощи наблюденія и измѣренія никогда не можетъ быть установлена зависимость между переменной x и ея функцией y , если въ нашемъ распоряженіи заранѣе не было этой функции, созданной нашей собственной властной мыслью. Такимъ образомъ, явленія въ чистомъ видѣ, какъ и точные законы, всегда останутся идеями. Объяснить явленія природы—значитъ воспроизвести ихъ, исходя отъ чистыхъ явленій при помощи точныхъ законовъ; значить, по словамъ Клопштока, „еще разъ продумать великую мысль творенія“ („den grossen Gedanken der Schöpfung noch ein Mal denken“). Послѣ всего сказаннаго нѣтъ основаній дѣлать неевклидовой механикѣ упрекъ, что тотъ или иной процессъ въ ея системѣ въ точности невозможенъ; нужно только спросить, возможно ли безъ переноснаго движенія, безъ понятія о точномъ рычагѣ и т. д. выразить закономѣрно явленія природы. Теперь мы рѣшительно уже не скажемъ, что въ неевклидовой механикѣ все неточно, все приближенно; напротивъ, ея идеи столь же чисты и строги, какъ и въ Евклидовой механикѣ. Это только другія идеи, и вопросъ можетъ заключаться лишь въ томъ, сохраняють ли онѣ за собой право на существованіе въ смыслѣ ихъ примѣненія. Но по настоящее время это имѣетъ мѣсто и останется въ силѣ до тѣхъ поръ, пока мы не

сможем распространить наш опыт на безпредѣльные времена и на неизмѣримо удаленныя разстоянія. Съ другой стороны, никогда еще не было основательнаго повода отказаться отъ Евклидовой геометріи, какъ отъ основы механики,—отъ геометріи, имѣющей за собой столь цѣнное, исторически испытанное прошлое. Но ея принципиально е единовластіе надломлено; ея преимущества имѣютъ только историческій, психо-физиологическій характеръ; они находятъ себѣ оправданіе въ экономіи мышленія.

14. вмѣстѣ съ тѣмъ апіорность Евклидовой координаціи пространства въ томъ существенно особомъ смыслѣ слова, въ какомъ его постоянно приходится понимать у Канта, падаетъ; ибо, кромѣ абстрактнаго заданія, Кантъ признаетъ еще другого рода заданіе точныхъ фактовъ, именно—чистое воззрѣніе а priori. Эта скованность нашего духа, вслѣдствіе которой онъ долженъ принять аксіомы геометріи, какъ нѣчто непосредственно данное, можетъ быть объяснена только остатками сенсуализма, которые все еще коренятся въ идеализмѣ Канта: въ своихъ геометрическихъ изслѣдованіяхъ Кантъ въ такой мѣрѣ пользуется (эмпирическимъ) воззрѣніемъ, что подъ влияніемъ Шопенгауэра могло даже составиться представленіе, что у Канта геометрія и ариѳметика основаны на воззрѣніи; между тѣмъ, ничто не можетъ быть въ такой мѣрѣ противно дѣйствительности. Координирующая роль мышленія у Канта всегда занимала первое мѣсто; разумъ какъ бы даже опредѣляетъ дѣятельность чувствъ. Если, тѣмъ не менѣе, Кантъ приписываетъ чувственному воспріятію роль, которую мѣстами очень трудно себѣ уяснить, то причина этого коренилась въ недостатокъ его геометрическихъ и физическихъ познаній. Онъ судитъ о геометріи всецѣло въ перспективѣ геометріи элементарной. Понятіями „въ“ (общѣе — инцидентности) и „между“ (общѣе — расположенія) онъ нигдѣ не пытается овладѣть, а постоянно ссылается на воззрѣніе. Въ наиболѣе неблагоприятномъ свѣтѣ это выступаетъ въ приведенномъ выше примѣрѣ изъ „Prolegomena“, гдѣ онъ сравниваетъ перчатку съ ея зеркальнымъ изображеніемъ: съ точки зрѣнія всѣхъ опредѣляющихъ признаковъ онѣ одинаковы, между тѣмъ онѣ все же не могутъ быть приведены въ совмѣщеніе. Въ дѣйствительности же здѣсь не хватаетъ одного важнаго признака, именно — „направленія“. Въ проективной геометріи противоположеніе тѣла и его зеркальнаго изображенія можетъ быть приведено къ альтернативѣ, лежитъ ли нѣкоторая точка прямой между двумя другими заданными точками, или нѣтъ. Конгруэнтность у Канта, повидимому, опредѣляется то наложеніемъ при помощи движенія, то совпаденіемъ всѣхъ опредѣляющихъ признаковъ; первая точка зрѣнія не представляется чисто геометрической, а вторая совершенно недостаточна. Какъ мало Кантъ умѣлъ обозрѣть внутреннюю связь въ геометріи, видно изъ того, что проведеніе линіи (= прямой) онъ ставитъ на одну ступень съ проведеніемъ эллипса.

Между тѣмъ законъ образованія прямой должно была дать чистое воззрѣнiе, законъ же образованія эллипса, когда всѣ прямыя предполагаются построенными, можетъ быть установленъ съ помощью понятiй. Аксиому о параллельности онъ признавалъ, какъ чистое воззрѣнiе съ сознаниемъ, что такъ оно есть и иначе быть не можетъ. Все это суть недостатки, вина которыхъ коренится не столько въ его системѣ, сколько въ его вѣрѣ въ Евклидову геометрiю. О литературѣ аксиомы о параллельности мы не находимъ упоминанiя ни въ „Критикѣ чистаго разума“ ни въ „Пролегоменахъ“. Совершенно ясно, что это затормозило свободное развитiе здоровой идеи, лежащей въ основѣ его теории познаниа.

15. Однако, устранивъ чистое воззрѣнiе а priori, мы отнюдь не желали бы вовсе удалить изъ геометрии всякое воззрѣнiе; (эмпирическое) воззрѣнiе въ извѣстной области путемъ продолжительнаго упражненiя все же приближается къ идеаламъ чистаго воззрѣнiя. Намъ удается очистить его отъ всѣхъ случайностей нагляднаго представленiя фигуры тѣмъ, что мы строимъ пространственные образы то какъ обыкновенныя точки, прямыя и плоскости, то какъ сферы, пучки и связки въ сферической сѣти, то чисто арифметически и т. д. Въ этой пестрой смѣнѣ формы осуществленiя первоначальной фигуры сохраняется только чистый законъ ея образованiя. Если мы въ этой фигурѣ путемъ воззрѣнiя открываемъ тѣ или инныя свойства, которыя сохраняются при всѣхъ этихъ преобразованiяхъ, то мы можемъ предполагать, что таковыя происходятъ изъ самаго закона образованiя фигуръ. Но удостовѣрить геометрическую истину во всей ея силѣ можетъ только доказательство, исходящее изъ чистыхъ понятiй. Воззрѣнiе само по себѣ даетъ только изолированное и приближенное познание; можетъ ли таковое при сопоставленiи съ воззрѣнiями другого рода возвыситься на степень строгой истины, это можетъ рѣшить только наше мышленiе.

Съ интуици геометрiя должна всегда начинаться, ибо абстрактная переработка эмпирическаго материала составляетъ ея задачу. Въ безпредѣльное обилiе нашихъ воспрятiй можно внести порядокъ только путемъ законовъ, дѣйствующихъ безъ ограниченiя. Мы, на примѣръ, наблюдаемъ, какъ совершается движенiе снаряда, на траекторiи котораго намъ извѣстны три точки, какъ могутъ быть установлены формы движущихся образцовъ, если опредѣлены нѣсколько ихъ точекъ. Вслѣдствiе этихъ и другихъ наблюденiй, которыя мы пытались очертить въ § 7-мъ, наша мысль приходитъ къ необходимости сдѣлать попытку принять нѣкоторыя закономерности, чтобы вывести изъ нихъ другiя. Это осуществляется при помощи понятiй и аксиомъ. Такимъ образомъ, опытнымъ путемъ возникаетъ точная наука; въ тѣ времена исторически отъ насъ очень удаленныя, когда ея основныя понятiя возникли, они казались совершенно адекватными эмпирическимъ объектамъ. По существу же они представляютъ собой не отображенiе эмпири-

ческаго, а чистыя идеи, правда, опирающіяся на эмпиризмъ, но неизмѣримо болѣе простыя, нежели чувственный объектъ. Послѣ всего сказаннаго здѣсь и въ п. 15-мъ мы полагаемъ, что не будемъ дурно поняты, если скажемъ очень коротко: аксіомы геометріи и механики имѣютъ эмпирическое происхожденіе. Этимъ мы далеко не хотимъ отрицать того, что онѣ представляютъ собой свободное твореніе нашей мысли, которая руководится только намѣреніемъ координировать помощью опредѣленныхъ законовъ пріобрѣтенія нашего опыта; мы выступаемъ, однако, вмѣстѣ съ тѣмъ, противъ притязаній идеализма, относящагося презрительно къ опыту, точно мы должны были придти къ нашей геометріи и механикѣ однимъ только размышленіемъ въ силу самихъ законовъ мышленія. Этотъ путь могъ насъ только привести къ убѣжденію, что мы должны стараться сами установить порядокъ, опредѣляемый нѣсколькими основными правилами. Въ этомъ смыслѣ геометрія апіорна, т. е. сама необходима для опыта, но ея основныя положенія тогда не могутъ быть впередъ обезпеченными познаніями; это должны быть только гипотезы, сообразованныя съ опытомъ въ томъ значеніи, какое это слово имѣетъ у Платона*), т. е. исходныя допущенія, принимаемая въ видѣ опыта, чтобы получить какую-либо точку отправленія и на ней стронть относительное познаніе. Чѣмъ болѣе гипотеза оправдывается, тѣмъ выше становится ея цѣнность, какъ познанія; но, какъ учитъ повседневно физика, можетъ оказаться, что та или иная гипотеза не можетъ быть проведена. Однако, и въ этомъ случаѣ затраченная работа обыкновенно не оказывается потерянной, такъ какъ это изслѣдованіе по большей части обнаруживаетъ, въ какихъ пунктахъ сдѣланныя допущенія требуютъ исправленія. Лишь тогда, когда обнаружено, что основныя допущенія не содержатъ внутренняго противорѣчія, и что они достаточны для опредѣленія дѣйствительныхъ явленій, они становятся познаніями въ истинномъ смыслѣ этого слова. Въ этой стадіи находятся въ настоящее время аксіомы нашихъ различныхъ геометрій, если мы оставляемъ въ сторонѣ ихъ введеніе въ физику. Помимо той геометріи, которая можетъ служить наиболѣе подходящей основой механики и, съ этой точки зрѣнія, можетъ быть преимущественно (*κατ' ἐξοχήν*) названа натуральной геометріей, всегда еще допустимы другія искусственныя геометріи. Если же конечная цѣль нашихъ геометрій заключается въ томъ, чтобы онѣ были введены въ цѣпь всего нашего естествознанія, то ихъ аксіомы и по сей день еще остаются гипотезами.

Кто безпристрастно прослѣдитъ за споромъ объ основахъ нашей науки, который велся глубокими учеными съ такимъ ожесточеніемъ, кто будетъ при этомъ руководиться мыслью, что каждый изъ нихъ съ своей точки зрѣнія привнесъ, вѣроятно, нѣчто разумное, тотъ придегъ къ

*) Ср. Н. Cohen, „Platons Ideenlehre und die Mathematik“. Marburg, 1879.

убѣжденію, что истина лежитъ не по серединѣ, а выше спорящихъ сторонъ. Съ той точки зрѣнія, на которую мы старались стать, можно, какъ намъ кажется, сиреведливо оцѣнить все, что есть правильнаго въ любой фило-софской системѣ, которая съ знаніемъ и съ добросовѣстностью изслѣдо-вала основы математики. Въ частности, мы хотимъ еще вкратцѣ выдвинуть одну здравую идею въ ученіи Канта о чистомъ воззрѣніи а priori. Гильбертъ далъ импульсъ къ тому, чтобы точно изслѣдовать логическую силу отдѣльныхъ аксіомъ въ нашей наукѣ. Нѣчто подобное происходитъ въ настоящее время и въ механикѣ; впрочемъ, эти изслѣдованія ведутъ свое начало еще отъ Лагранжа, какъ это можно усмотрѣть изъ приве-денныхъ выше статей Штеккеля и доклада Фосса. Опираясь на эти предварительныя работы, мы будемъ все болѣе и болѣе въ состояніи усмотрѣть, какія аксіомы геометріи и механики нужно принять, чтобы съ той или иной точностью объяснить одно или другое явленіе природы. Такія изслѣдованія о преимуществахъ и недостаткахъ той или иной гипотезы производятся въ настоящее время въ возрастающемъ количествѣ. Но всѣ эти соображенія во истину остаются въ области чистаго воззрѣнія а priori въ томъ болѣе глубокомъ смыслѣ этого слова, что они взвѣшиваютъ самыя предположенія о предѣлахъ возможности нашего опыта. Только вмѣсто термина а priori слѣдовало бы подыскать болѣе опредѣленное выраженіе.

16. Итакъ, отвергая рѣшительно всякое вмѣшательство воззрѣнія въ ту область, гдѣ властвуетъ чистая мысль, мы тѣмъ охотнѣе предоста-вляемъ ему роль наводящей поддержки и спутники нашей мысли. Безъ инди-видуальныхъ особенностей наглядныхъ фигуръ, которыя вовсе не введены въ геометрическія понятія, цѣль многихъ изъ этихъ понятій оставалась бы совершенно непонятной. Мы напомнимъ только понятіе о кривизнѣ. Какъ было указано въ п. 1, мы можемъ любой эллипсъ принять за „окруж-ность“, любую внутреннюю его точку за „центръ“ и послѣдовательно построить Евклидову геометрію, въ которой такъ называемые „радіусы“ такой „окружности“ будутъ равны. Но если мы въ этой или въ обычной Евклидовой геометріи захотимъ притти къ точному понятію о кривизнѣ и съ этой цѣлью будемъ подыскивать кривую, которая (въ неясномъ еще смыслѣ этого слова) имѣетъ всюду равномерную кривизну, то намъ прежде всего придетъ въ голову „настоящая“ окружность, построенная при помощи циркуля. Но, съ точки зрѣнія „псевдо-евклидовой геометріи“, мы должны бы и ея псевдо-окружности приписать равномерную кривизну и мы пришли бы при этомъ къ совершенно тѣмъ же законамъ, которые мы получаемъ въ „настоящей“ Евклидовой геометріи, исходя отъ „настоящей“ окружности. Какъ бы послѣдовательно ни было ученіе о кривизнѣ въ этой псевдо-геометріи, выборъ этой псевдо-окружности, какъ кривой постоянной кривизны, оставался бы непонятнымъ. Но если бы при по-

строения этой псевдо-геометрии мы пожелаем больше считаться с воззрением, то мы должны были бы попытаться определить как-либо тотъ изъ эллипсовъ, который мы называемъ настоящей окружностью. Но, какъ мы видѣли выше, чисто геометрическими опредѣленіями этого достигнуть невозможно. Однако, намъ справедливо возразятъ, что, если кому-нибудь покажутъ настоящую окружность, не сообщая вовсе о томъ, какъ она построена (при помощи циркуля), то онъ несомнѣнно ясно почувствуетъ въ этой кривой закономерность, хотя бы онъ и не умѣлъ ее описать, закономерность, отличающую ее отъ всѣхъ остальныхъ эллипсовъ. Конечно! Но опредѣленіе этой закономерности не есть дѣло геометрии, это задача психологіи и фізіологіи, и при томъ задача величайшей трудности. Для ея выясненія пришлось бы обратиться къ психо-фізіологической основѣ симметріи. Даже тотъ, кто не умѣетъ математически мыслить, имѣетъ явно выраженное чувство „истинной“ симметріи, которая не можетъ быть опредѣлена однимъ только движеніемъ. Если мы двѣ конгруэнтныя фигуры расположимъ справа и слѣва отъ нѣкоторой прямой не вполне симметрично, то мы испытываемъ какъ бы даже физически непріятное ощущеніе. Если нѣкоторая прямая x перпендикулярна къ плоскости симметріи нашего тѣла, а другая прямая, выходящая изъ плоскости, расположена не вполне перпендикулярно къ прямой x , то продолжительное созерцаніе такой фигуры возбуждаетъ и утомляетъ насъ легче, чѣмъ въ томъ случаѣ, когда этотъ уголъ вполне прямой (т. е. съ незамѣтной ошибкой). Очевидно, здѣсь вліяютъ условія аккомодации обоихъ глазъ. Относительно фигуръ, которыя расположены симметрично по отношенію къ плоскости симметріи нашего тѣла, наши глаза устанавливаются одинаково и испытываютъ одинаковое напряженіе. Прямые углы, которые при этой симметріи переходятъ другъ въ друга, мы гораздо легче чертимъ на глазъ, нежели расположенные иначе. Быть можетъ, это именно обстоятельство, въ связи съ образованіемъ окружности путемъ вращенія твердаго тѣла, представляетъ собой путь, которымъ можно объяснить предпочтеніе опредѣленной Евклидовой геометріи всѣмъ другимъ *). Это, однако, дѣло психологіи.

*) Cp. M. Simon, „Zu den Grundlagen der Nichteuclidischen Geometrie“, Strassburg, 1891. Тамъ же указанія дальнѣйшей литературы.

ГЛАВА III.

Обоснованіе проективной геометріи.

§ 15. Аксиомы сопряженія и расположенія.

1. Изложивъ обѣ неевклидовы геометріи при помощи Евклидовой геометріи, мы достигли того преимущества, что судьбы этихъ трехъ геометрическихъ системъ оказались тѣсно связанными одна съ другой: если бы одна изъ нихъ привела къ противорѣчію, то это обнаружило бы также противорѣчіе въ каждой изъ двухъ другихъ. Но, съ другой стороны, это имѣетъ и слабую сторону: можетъ показаться, что Евклидова геометрія все же является первоисточникомъ всѣхъ пространственныхъ построений. Мы уже указывали выше, въ § 13 и въ § 14, что каждую изъ двухъ неевклидовыхъ геометрій можно построить совершенно независимо; и при томъ это можно сдѣлать двояко: можно построить какъ одну, такъ и другую неевклидову геометрію, исходя изъ ея аксіомъ, какъ это дѣлается обычно въ учебникахъ геометріи; можно также исходить отъ мѣроопредѣленія Кели (Sauley), что даетъ возможность сдѣлать обзоръ быстрѣе. Мы рѣшаемся остановиться на послѣднемъ методѣ, хотя мы и вынуждены будемъ ограничиться одними только указаніями. Но метрика Кели опирается на проективную геометрію, а потому мы должны прежде развить эту дисциплину.

2. Проективная геометрія послужитъ намъ также основой для окончательнаго построения системы Евклидовой геометріи. Въ своемъ мѣстѣ (§ 14) мы отказались отъ движенія, какъ критерія конгруэнтности, такъ какъ при этомъ критеріи обыкновенно молчаливо принимается, что движутся твердыя тѣла; понятіе же о твердости тѣла можно установить, только пользуясь неизмѣняемостью мѣръ. Обычное опредѣленіе конгруэнтности впадаетъ, такимъ образомъ, въ ложный кругъ, изъ котораго насъ не можетъ вывести и „чистое воззрѣніе“, какъ это нерѣдко утверждали. Движеніе—не принципъ геометріи, а задача кинематики. По почину Лейбница, Наторпъ *) недавно сдѣлалъ попытку

*) См. цитату на стр. 154; ср. также Natorp. „Logik in Leitsätzen zu akad. Vorlesungen, Marburg, 1904.

развить учение о расположении въ пространствѣ, исходя изъ понятія о движеніи, какъ объ измѣненіи мѣста, или какъ о совокупности всевозможныхъ положеній. Но понятіе объ измѣненіи оказывается слишкомъ общимъ для этой цѣли; можно было бы безъ труда указать „измѣненія“, вызывающія непрерывное преобразование пространственныхъ образовъ, которыя все же не давали бы намъ того, что должно дать движеніе. Необходимо, слѣдовательно, принять во вниманіе тѣ свойства, которыя претворяютъ эти измѣненія, или преобразования, въ движенія. Это суть свойства, принадлежащія группамъ, которыя не поддаются опредѣленію безъ пособія аксіомъ I, II, IV и V. Такъ какъ это, по существу, аксіомы проективной геометріи, то идеи Наторпа,—по крайней мѣрѣ, въ той ихъ части, которой дѣйствительно возможно воспользоваться,—могутъ найти себѣ примѣненіе прежде всего въ проективной геометріи въ томъ приблизительно видѣ, какъ это дѣлаетъ Линдеманъ *). Этотъ путь, однако, становится доступнымъ только при пособіи анализа или всей геометріи положенія. Въ духѣ элементарной геометріи представляется гораздо болѣе подходящимъ дать такое осуществленіе аксіомъ конгруэнтности, которое опирается на надлежащія построенія. Этого мы и имѣли въ виду достигнуть при помощи построеній Штейнера (§ 5). Однако эти построенія предполагаютъ, что въ каждой плоскости дана вспомогательная окружность. Но геометрическія свойства окружности не могутъ быть опредѣлены безъ помощи метрическихъ понятій. Мы оказались бы, такимъ образомъ, со всѣми своими задачами въ ложномъ кругѣ, если бы геометрію, какъ это предполагаетъ наивный эмпиризмъ, заимствовала всѣ свои законы отъ фигуръ, а не вкладывала ихъ сама въ эти фигуры. Съ точки зрѣнія чисто абстрактной геометріи, мы дѣлаемъ обратное заключеніе: такъ какъ идеальная окружность только метрически отличается отъ остальныхъ эллипсовъ, то въ чисто абстрактной системѣ идеальной геометріи должно быть возможно принять за „окружность“ любой эллипсъ; и это не въ томъ смыслѣ, что и съ „неточной“ фигурой можно связать строгіе выводы; напротивъ, построенія, произведенныя при помощи такой окружности будутъ совершенно точны, хотя конгруэнтность, устанавливаемая этимъ путемъ, совершенно отличается отъ эмпирической конгруэнтности. На такую возможность мы уже указывали въ § 14, теперь мы имѣемъ въ виду эту идею осуществить †).

*) См. A. Clebsch. „Vorlesungen über Geometrie, bearbeitet von Lindemann“. Bd. II.

†) Идея автора заключается, такимъ образомъ, въ слѣдующемъ. Построенія Штейнера содержатъ критеріи конгруэнтности двухъ фигуръ; это значитъ, что произведя конечное число Штейнеровыхъ построеній, мы всегда имѣемъ возможность рѣшить, конгруэнтны ли данныя двѣ фигуры, или нѣтъ. Но при производствѣ Штейнеровыхъ построеній мы должны пользоваться вспомогательной окружностью.

3. Такъ какъ въ параболической и эллиптической геометріяхъ, путемъ введенія несобственныхъ или соответственно идеальныхъ элементовъ, чисто абстрактно вводятся законы сопряженія, дѣйствующіе въ эллиптической геометріи, то проективная геометрія, которая имѣетъ служить общей основой всѣхъ этихъ геометрическихъ системъ, должна исходить отъ аксіомъ сопряженія эллиптической геометріи.

Такимъ образомъ, въ проективной плоскости любая двѣ прямая всегда другъ друга пересѣкаютъ; лишь позже мы выдѣлимъ нѣкоторыя точки и прямая въ качествѣ несобственныхъ или идеальныхъ, чтобы такимъ образомъ придти къ тремъ различнымъ геометрическимъ системамъ. Слова „точка, прямая, плоскость“ можно было бы также замѣнить терминами „основные образы нулевой, первой и второй ступени“; впрочемъ, плоскость мы постараемся воспроизвести при помощи пучка лучей.

Сообразно этому мы будемъ исходить отъ двухъ системъ объектовъ, которые мы будемъ называть точками и прямыми. Мы считаемъ также установленнымъ, что нужно разумѣть подъ инцидентностью точки съ прямой линіей ²⁾. Относительно точекъ, инцидентныхъ съ прямой, мы

Возникаетъ вопросъ, что будетъ, если мы замѣнимъ эту окружность эллипсомъ т. е. если мы будемъ пользоваться эллипсомъ, какъ если бы это была наша вспомогательная окружность. Авторъ указываетъ, что мы придемъ такимъ образомъ къ своеобразному опредѣленію конгруэнтности, абстрактно совершенно правильному, т. е. не содержащему логическихъ противорѣчій, хотя эта конгруэнтность и будетъ существенно отличаться отъ обычной.

Но авторъ дѣлаетъ такое замѣчаніе: „Такъ какъ идеальная окружность только метрически отличается отъ остальныхъ эллипсовъ, то въ чисто идеальной системѣ абстрактной геометріи должно быть возможно принять за „окружность“ любой эллипсъ“. Почему же это должно быть возможно? Если окружность дѣйствительно „только метрически отличается отъ остальныхъ эллипсовъ“, то лишь въ томъ смыслѣ, что окружность можно разсматривать, какъ частный случай эллипса. Но окружность можетъ быть разсматриваема также, какъ частный случай различнаго рода оваловъ. Если бы мы, однако, любой такой овалъ положили въ основаніе Штейнеровыхъ построеній, то мы впали бы въ противорѣчіе. Если эллипсъ не даетъ такихъ противорѣчій, то причина этого коренится довольно глубоко въ проективныхъ свойствахъ коническихъ сѣченій, а не въ тѣхъ поверхностныхъ соображеніяхъ, на которыя ссылается авторъ.

²⁾ Эта инцидентность въ различныхъ осуществленіяхъ геометріи различно реализуется. Такъ, напримѣръ, въ геометріи, осуществляемой сѣтью сферъ, прямая инцидентна съ точкой, если соответствующая сфера принадлежитъ пучку. Въ аналитической системѣ, развитой въ § 12, прямая инцидентна съ точкой, если соответствующія числа удовлетворяютъ уравненіямъ прямой и т. д.

Здѣсь авторъ исходитъ изъ допущенія, что опредѣленная совокупность объектовъ принята за точки, другая совокупность объектовъ—за прямая. Онъ принимаетъ также, что установлено, при какихъ условіяхъ прямая инцидентна съ точкой, т. е. данъ критерій, по которому относительно каждой точки и прямой мы можемъ установить, инцидентны ли они другъ съ другомъ или нѣтъ.

будемъ говорить, что „точки лежать на прямой“, что онѣ „принадлежать прямой“; какъ выяснено въ § 13, эти точки не должны непременно лежать „на“ прямой въ обычномъ значеніи этого слова; прямая, инцидентная съ точкой, „проходить черезъ эту точку“. Прямая „соединяетъ“ любыя двѣ „ей“ точки, т. е. двѣ принадлежащія ей точки. Двѣ прямыя, проходящія черезъ одну точку „пересѣкаются въ этой точкѣ“, „имѣютъ эту общую точку“. Всѣ эти способы выраженія служатъ только для облегченія рѣчи; между точками и прямыми мы допускаемъ, опираясь на понятіе объ инцидентности, слѣдующаго рода сопряженія:

- I₁. Черезъ двѣ различныя точки всегда проходитъ одна и только одна прямая.
- I₂. На каждой прямой лежать, по крайней мѣрѣ, двѣ точки.
- I₃. Имѣются, по крайней мѣрѣ, двѣ непересѣкающіяся прямыя.

Такимъ образомъ, имѣются, по крайней мѣрѣ, три точки, не лежащія на одной прямой. Три прямыя, которыя попарно соединяютъ три точки, не лежащія на одной прямой, образуютъ „трехсторонникъ“; эти прямыя называются „сторонами“ трехсторонника, а исходныя три точки — его „вершинами“. Подъ „пучкомъ лучей“ (S, u) съ „вершиной“ S и „направляющей“ u мы будемъ разумѣть совокупность прямыхъ, или „лучей“, которые соединяютъ вершину S съ точками прямой u . Пучекъ лучей можетъ имѣть только одну вершину, такъ какъ иначе его лучи, въ силу положенія I₁, должны были бы всѣ совпасть. Мы требуемъ далѣе:

- I₄. Два пучка лучей ³⁾ съ общей вершиной имѣютъ, по крайней мѣрѣ, одинъ общій лучъ.
- I₅. Прямая, которая пересѣкаетъ двѣ стороны трехсторонника, не проходя черезъ точку пересѣченія послѣднихъ, пересѣкаетъ также третью сторону.

4. Эти двѣ аксіомы имѣютъ, очевидно, цѣлью дать опредѣленіе плоскости. Изъ аксіомы I₅ вытекаютъ, прежде всего, слѣдующія вспомогательныя теоремы:

- A. Прямая, которая пересѣкаетъ два луча пучка, не проходя черезъ его вершину, пересѣкаетъ также 1) направляющую и 2) всѣ остальные лучи пучка; поэтому она можетъ и сама служить направляющей.
- B. Любыя двѣ направляющія одного и того же пучка пересѣкаются ⁴⁾.

³⁾ Мы будемъ въ дальнѣйшемъ для сокращенія называть пучекъ лучей просто „пучкомъ“.

⁴⁾ Докажемъ эти основныя предложенія. Положимъ, что прямая m пересѣкаетъ два луча a и b пучка, и что l есть направляющая этого пучка. Въ такомъ случаѣ прямыя a, b, l образуютъ трехсторонникъ; прямая m , пересѣкающая стороны a и b , согласно постулату I₅, пересѣчетъ также сторону l , т. е. направляющую. Въ этомъ содержится, въ сущности, уже и доказательство предложенія B.

Всю совокупность лучей и направляющих пучка вместе с принадлежащими им точками мы будем называть „плоскостью“ и притом „инцидентной“ с этими прямыми и точками. Эти образы „лежат на этой плоскости“, они „принадлежат ей“, плоскость „проходит через них“. Таким образом, плоскости принадлежат: любая прямая, соединяющая две ее точки, и точка пересечения двух ее прямых. Любые две прямые пересекаются⁵⁾. Каждая точка плоскости может быть принята за вершину, любая прямая, не проходящая через эту точку, за направляющую пучка, „образующего“ плоскость. В виду аксиомы I_3 не все прямые лежат в одной плоскости. Всякая прямая, не лежащая в некоторой плоскости, пересекает эту плоскость в одной и только в одной точке. В самом деле, пусть S будет вершина пучка, образующего плоскость, u его направляющая, v — прямая, не лежащая в плоскости; в таком случае пучки (S, u) и (S, v) , в силу аксиомы I_4 , имеют общий луч w , который пересекает прямую v в точке F ; эта точка принадлежит как прямой v , так и плоскости. Отсюда непосредственно вытекает, что две плоскости всегда пересекаются по прямой линии⁶⁾. Три плоскости, не имеющие общей прямой, пересекаются в одной точке. Через три точки, не лежащие на одной прямой, всегда проходит одна и только одна плоскость, ибо одна из точек может быть принята за вершину, а прямая, соединяющая две другие, за направляющую пучка.

5. Лучи, соединяющие точки плоскости α с точкой S , не лежащей в этой плоскости, образуют „сѣнь“ этой плоскости. Сѣнение этих лучей с плоскостью β , не проходящей через точку S , называется „проекцией“ (точек) плоскости α из точки S на плоскость β . Те свойства фигур плоскости α , которые сохраняются проекциями этих фигур на любую другую плоскость, называются „проективными свойствами“ фигур. Геометрия, обоснованием которой мы имеем в виду сейчас заняться, изучает исключительно проективные свойства геометрических образов. Так, например, то свойство середины M отрезка AB , что она лежит „между“ крайними его точками, не есть проективное свойство,

⁵⁾ Если эти две прямые служат лучами пучка, то они пересекаются в вершине пучка; если одна служит лучем пучка, а другая направляющей, то они пересекаются по самому определению направляющей (см. также предложение A); если же это две направляющие, то они пересекаются в силу предложения B .

⁶⁾ В самом деле, каждая прямая, лежащая на одной плоскости, необходимо должна встретиться другой плоскостью. Эта общая точка может быть принята за вершину образующего пучка как для одной, так и для другой плоскости; эти два пучка имеют, следовательно, общую прямую (I_4), принадлежащую обоим плоскостям. Если бы две плоскости, кроме общей прямой, имели также общую точку, на этой прямой не лежащую, то эта точка и эта прямая могли бы быть приняты за вершину и направляющую пучка, образующего каждую плоскость, — обе плоскости, таким образом, необходимо совпадали бы.

такъ какъ можно легко достигнуть того, чтобы проекція M' точки M изъ точки S на нѣкоторую прямую u' лежала внѣ отрезка $A'B'$, соединяющаго проекціи A' и B' точекъ A и B . Если точка D лежитъ на прямой AB внѣ отрезка AB , и если D' есть ея проекція изъ точки S на прямую u' , то одна изъ двухъ точекъ M' и D' необходимо будетъ лежать между точками A' и B' , а другая внѣ ихъ. Такимъ образомъ, то свойство четырехъ точекъ A, B, M, D , что двѣ изъ нихъ M и D раздѣляютъ двѣ другія A и B , сохраняется при проектировании; это — проективное свойство. Всѣ эти соображенія служатъ для насъ указаніемъ, какъ нужно видоизмѣнить аксіомы расположенія въ цѣляхъ проективной геометріи (ср. § 10,1). Мы постулируемъ:

Двѣ различныя точки A и B на прямой u устанавливають подраздѣленіе всѣхъ остальныхъ точекъ прямой на два класса $(A, B)_I$ и $(A, B)_{II}$, обладающіе слѣдующими свойствами:

- П₁. Это подраздѣленіе не зависитъ отъ послѣдовательности точекъ A, B .
 П₂. Каждая точка прямой, кромѣ A и B , принадлежитъ одному и только одному классу.
 П₃. Въ каждомъ классѣ есть, по крайней мѣрѣ, одна точка.

При этомъ подраздѣленіи, производимомъ точками A и B , двѣ точки Z и W называются „сорасположенными“ (isothetisch) относительно A и B , если онѣ принадлежатъ одному и тому же классу, и „противорасположенными“ (enantiothetisch) въ противоположномъ случаѣ.

- П₄. Въ каждой группѣ четырехъ точекъ, лежащихъ на одной прямой, любой изъ этихъ четырехъ точекъ отвѣчаетъ одна и только одна такая точка, что выдѣленные такимъ образомъ двѣ точки противорасположены относительно двухъ другихъ.

Если, такимъ образомъ, точки Z, W противорасположены относительно точекъ A, B , то ¹⁾

- | | | | | |
|----|--------------|---------------|--------------|----------|
| a) | точки Z, A | сорасположены | относительно | W, B , |
| b) | „ Z, B „ | „ | „ | W, A , |
| c) | „ W, A „ | „ | „ | Z, B , |
| d) | „ W, B „ | „ | „ | Z, A ; |

изъ a) и c), въ силу аксіомы П₄, слѣдуетъ, что

- e) точки A, B также противорасположены относительно точекъ Z, W .

То же вытекаетъ изъ соотношеній b) и d); изъ соотношеній же a) и d), а также b) и c) слѣдуетъ, что и сорасположеніе двухъ паръ точекъ есть свойство взаимное. Мы получаемъ, такимъ образомъ, предложеніе:

¹⁾ Если бы, напримѣръ, точки Z и A были противорасположены относительно точекъ B и W , то оказалось бы, что къ точкѣ Z можно двоякимъ образомъ такъ присоединить вторую точку, чтобы удовлетворить требованію П₄.

Если точки Z, W сорасположены (или противорасположены) относительно точек A, B , то и обратно: точки A, B сорасположены (или противорасположены) относительно точек Z, W .

Чтобы выразить это взаимоотношение двух пар точек, мы будем говорить, в случаѣ противорасположенія, что двѣ пары точек Z, W и A, B „раздѣляют“ друг друга. Въ случаѣ же сорасположенія, — что онѣ „слѣдуютъ“ друг за другомъ. Различныя расположенія, которыя еще возможны въ соотвѣтствіи съ этими требованіями, ближе опредѣляются слѣдующей „плоскостной“ аксіомой:

II₆. Двѣ прямыя u, u' въ плоскости трехсторонника a, b, c , не проходящія ни через одну изъ его вершинъ A, B, C и не пересѣкающіяся на какой либо изъ его сторонъ, даютъ въ сѣченіи со сторонами a, b, c три пары точекъ $X, X', -Y, Y'$ и Z, Z' ; эти три пары точекъ либо не раздѣляютъ ни одной пары вершинъ, либо раздѣляютъ **двѣ** и только **двѣ** пары.

6. Если на нѣкоторой прямой c двѣ пары точекъ Z, W и A, B другъ друга раздѣляютъ, такъ что пары Z, B и A, W слѣдуютъ одна за другой, а пара Z, Z' ⁹⁾ раздѣляетъ пару точекъ A, W , то точка Z' не можетъ совпадать ни съ B , ни, конечно, съ A, W, Z . Поэтому на любой прямой c имѣются, по крайней мѣрѣ, пять точекъ A, B, W, Z, Z' , и можно принять, что точки Z, Z' и A, W другъ друга раздѣляютъ; пусть S будетъ точка, не лежащая на прямой c ; положимъ, наконецъ, что точки S и S' раздѣляютъ пару точекъ C и W' (II₃). Прямая u , соединяющая точки S и Z , и u' , соединяющая S' и Z' (см. фиг. 50), пересѣкаютъ прямыя BC и AC соотвѣтственно въ точкахъ X, X' и Y, Y' .

Согласно заданію:


- 1) Точки Z, Z' раздѣляютъ точки A, W ,
- 2) „ S, S' „ „ W', C .

Отсюда, въ силу аксіомы II₅, трехсторонникъ „ CA “ даетъ:

3) Точки Y, Y' слѣдуютъ за точками A, C .

Въ виду соотношенія 2) мы имѣемъ относительно треугольника WCB альтернативу:

- a) либо точки X, X' раздѣляютъ точки B, C , а точки Z, Z' слѣдуютъ за точками W, B ;
- b) либо точки X, X' слѣдуютъ за точками B, C , а точки Z, Z' раздѣляютъ точки W', B .



Фиг. 50.

⁹⁾ Такая точка Z' всегда существуетъ въ силу постулата II₂.

Съ другой стороны, относительно треугольника ABC , въ виду соотношенія 3, также имѣетъ мѣсто альтернатива:


а) либо точки X, X' раздѣляютъ точки B, C , а точки Z, Z' раздѣляютъ точки A, B ;

β) либо точки X, X' слѣдуютъ за точками B, C , а точки Z, Z' слѣдуютъ за точками A, B .

Такъ какъ случай а) можетъ имѣть мѣсто только совместно съ а), а случай б) только совместно съ β), то точки Z и Z' необходимо раздѣляютъ, кромѣ той пары точекъ, относительно которой это установлено условіемъ, еще вторую пару и не больше. Но всего мы имѣемъ на прямой c три пары точекъ, которыя можно комбинировать съ парой ZZ' , — именно три парныя комбинаціи точекъ A, B, C . Если точки Z, Z' не раздѣляютъ двухъ паръ, то онѣ не могутъ раздѣлять и третьей пары, ибо тогда онѣ необходимо должны были бы дѣлить еще одну пару. Мы, такимъ образомъ, получаемъ:

Предложеніе 1. Изъ пяти точекъ, расположенныхъ на одной прямой, каждая пара либо раздѣляетъ двѣ изъ трехъ паръ образуемыхъ остальными тремя точками, либо не раздѣляетъ ни одной.

Теперь мы имѣемъ возможность освободить аксіому Π_3 отъ того ограниченія, что прямыя u и u' не должны пересѣкаться ни на одной изъ прямыхъ a, b, c . Въ самомъ дѣлѣ, пусть точка Y' совпадаетъ съ Y , пара A, B раздѣляетъ пару Z, Z' , пара Y, Y' раздѣляетъ пару A, C . Если X'' есть точка пересѣченія прямой $u'' = Y''Z''$ съ BC и не совпадаетъ съ X , то, въ силу аксіомы Π_3 , а) пара X, X'' должна слѣдовать за парой BC (фиг. 51). Если теперь пара A, B не дѣлитъ пары Z, Z' , а потому,



Фиг. 51.

въ силу предложенія 1, дѣлитъ пару Z, Z' , то пара $X' X''$, въ силу аксіомы Π_3 , должна слѣдовать за парой B, C , ибо точки Y, Y' раздѣляютъ пару A, C . Отсюда, въ силу предложенія 1, вытекаетъ, что пара X, X' также слѣдуетъ за парой B, C . Если точка X'' случайно совпадаетъ съ X , а точка Z не совпадаетъ съ Z' , такъ что и X не совпадаетъ съ X' , то точка X'' не можетъ совпасть съ X' . Поэтому къ прямымъ u', u'' примѣняется предложеніе Π_3 , которое и даетъ непосредственно, что пара X, X' не раздѣляетъ пары B, C , если точки Z, Z' не дѣлятъ пары A, B . Это соотношеніе между парами X, X' и Z, Z' взаимное; если, поэтому, точки X, X' раздѣляютъ пару B, C , то и точка Z, Z' раздѣляетъ пару A, B . Этимъ устраняется

*) Примѣняя ее къ трехстороннику ABC и прямымъ u и u'' .

упомянутое выше ограничѣніе предположенія II₅. Если мы черезъ точку Y проведемъ еще другія прямыя, встрѣчающія прямую AB (и BC), то путемъ повторнаго примѣненія полученнаго результата мы придемъ къ слѣдующему выводу:

Предложеніе 2. Расположеніе точекъ на прямой, устанавливаемое аксіомами II, есть свойство проективное.

Это значитъ, что оно сохраняется при проектированіи съ одной прямой на другую.

7. Дѣленіе точекъ на прямой, устанавливаемое аксіомами II, допускаетъ существенное обобщеніе. Если A, B, C, Z суть четыре точки на прямой и $(A, B)_C$ есть тотъ изъ двухъ классовъ, опредѣляемыхъ точками A и B , который не содержитъ точки C , то точка Z будетъ принадлежать этому классу или не будетъ принадлежать ему, смотря по тому, раздѣляютъ ли точки Z, C пару A, B или нѣтъ. Если мы обозначимъ точки A, B, C въ какой угодно изъ шести возможныхъ послѣдовательностей цифрами 1, 2, 3, то точка Z , въ силу аксіомы II₄, должна принадлежать одному и только одному изъ классовъ $(1, 2)_3, (2, 3)_1, (3, 1)_2$. Теперь мы докажемъ слѣдующее общее предположеніе:

Предложеніе 3. Если n точекъ лежать на одной прямой, то ихъ можно перенумеровать цифрами 1, 2, 3, ..., n такимъ образомъ, чтобы имѣло мѣсто слѣдующее расположеніе:

1. Въ циклѣ 1, 2, 3, ..., n , 1 любыя двѣ послѣдовательныя точки $v, v+1$ ($v=1, 2, 3, \dots, n-1$) или $n, 1$ опредѣляютъ въ смыслѣ аксіомъ II одинъ классъ $[v, v+1]$ или $[n, 1]$, который не содержитъ ни одной изъ $n-2$ остальныхъ точекъ, такъ что послѣднія всѣ принадлежатъ второму „дополнительному“ классу.

2. Каждая точка прямой Z , отличная отъ этихъ n точекъ, принадлежитъ одному и только одному изъ этихъ n классовъ: $[1, 2], [2, 3], [3, 4], \dots, [n-1, n], [n, 1]$.

3. Это расположеніе остается въ силѣ не только при круговой перестановкѣ цифръ 1, 2, 3, ..., n , но и при обратной нумераціи $n, n-1, \dots, 1$ тѣхъ же точекъ, а также при круговой перестановкѣ въ этой обратной нумераціи.

Случай $n=3$ нами уже исчерпанъ. Чтобы доказать предположеніе путемъ перехода отъ n къ $n+1$, мы предположимъ, что намъ дано $n+1$ точекъ и что по отношенію къ n изъ нихъ теорема справедлива. Пусть классы, соответствующіе нѣкоторымъ n точкамъ, будутъ: $[1, 2]^*$, $[2, 3]^*$, ..., $[n-1, n]^*$, $[n, 1]^*$. Согласно нашему допущенію, $(n+1)$ -ая точка принадлежитъ одному и только одному изъ этихъ n классовъ; мы можемъ принять, что она принадлежитъ классу $[n, 1]^*$, такъ какъ этого

всегда можно достигнуть круговой перестановкой цифръ. Тогда точки $n+1, \nu$ раздѣляютъ пару точекъ $n, 1$ при

$$\nu = 2, 3, 4, \dots, n-1.$$

Поэтому, въ силу аксіомы Π_4 , пара $n+1, 1$ слѣдуетъ за парой ν, n , а пара $n, n+1$ слѣдуетъ за парой $\nu, 1$. Отсюда, въ свою очередь, вытекаетъ, что

$$(n+1, 1)_\nu = (n+1, 1)_n; (n, n+1)_1 = (n, n+1)_\nu \text{ при } \nu = 2, 3, \dots, n-1,$$

гдѣ знакъ равенства служитъ для выраженія тождества соотвѣствующихъ классовъ ¹⁰⁾. Такимъ образомъ, символы

$$(n+1, 1)_2 = (n+1, 1)_3 = \dots = (n+1, 1)_{n-1} = (n+1, 1)_n$$

выражаютъ одинъ и тотъ же классъ, который мы короче будемъ обозначать черезъ $[n+1, 1]$. Точно такъ же пусть $[n, n+1]$ обозначаетъ классъ

$$(n, n+1)_1 = (n, n+1)_2 = \dots = (n, n+1)_{n-1}.$$

Каждая точка Z , отличная отъ точекъ $1, 2, 3, \dots, n+1$, должна принадлежать одному и только одному изъ классовъ

$$[1, 2]^*, [2, 3]^*, \dots, [n-1, n]^*, [n, 1]^*.$$

Новымъ оказывается только тотъ случай, когда точка Z принадлежитъ послѣднему классу $[n, 1]^*$, въ составъ котораго входитъ также точка $n+1$; въ этомъ случаѣ точки Z, ν раздѣляютъ пару точекъ $n, 1$ при $\nu = 2, 3, \dots, n-1$. Примѣняя же предложеніе 1 къ пяти точкамъ $Z, \nu, n, n+1, 1$, мы заключаемъ, что пара Z, ν раздѣляетъ одну и только одну изъ паръ $n, n+1$ и $n+1, 1$ ¹¹⁾; иными словами, точка Z принадлежитъ либо классу $(n, n+1)_\nu$, либо классу $(n+1, 1)_\nu$.

Если поэтому Z и $n+1$ суть точки класса $[n, 1]^*$, то точка Z принадлежитъ либо классу $[n, n+1]$, либо классу $[n+1, n]$. Этимъ предложеніе 3 доказано, а вмѣстѣ съ тѣмъ обнаружено, что каждая новая точка дѣлитъ тотъ классъ, которому она принадлежитъ, на два новыхъ класса. Поэтому звѣздочки, которыми мы имѣли въ виду отмѣтить классы, образованные n точками, въ отличіе отъ классовъ, которые даютъ $n+1$ точекъ, оказываются излишними. Согласно аксіомѣ Π_2 , въ каждомъ классѣ имѣется, по крайней мѣрѣ, одна точка; слѣдовательно, на каждой прямой имѣются, по крайней мѣрѣ, четыре точки, а

¹⁰⁾ $(n+1, 1)_\nu$ есть тотъ изъ двухъ классовъ, определяемыхъ точками $n+1$ и 1 который не содержитъ точки ν ; такъ какъ точки n и ν не раздѣляютъ пары $n+1, 1$, то точка n принадлежитъ тому же классу, а потому классы $(n+1, 1)_\nu$ и $(n+1, 1)_n$ совпадаютъ.

¹¹⁾ Ибо она раздѣляетъ пару $n, 1$.

стало быть, по крайней мѣрѣ, четыре класса; въ нихъ имѣются еще по крайней мѣрѣ 4 другія точки, которыя вмѣстѣ съ прежними даютъ уже восемь классовъ; въ этихъ восьми классахъ есть, по крайней мѣрѣ, восемь новыхъ точекъ и т. д. Въ каждомъ изъ двухъ классовъ, на которые двѣ точки дѣлятъ прямую, имѣется безчисленное множество точекъ.

8. Различныя циклическія расположенія классовъ, которые n точекъ, согласно предложенію 3, образуютъ на прямой, опредѣляютъ два различныхъ „направленія“, въ которыхъ можно „пробѣгать“ классы, т. е. прежде всего „сосчитывать“ ихъ. Но если сюда ввести еще одну $(n + 1)$ -ую точку дѣленія α , которая принадлежитъ, скажемъ, классу $[4, 5]$, то эта точка, какъ мы видѣли, раздѣлитъ этотъ классъ на два новыхъ класса $[4, \alpha]$ и $[\alpha, 5]$; всякая другая точка β того же класса $[4, 5]$ должна поэтому стоять либо къ классу $[4, \alpha]$, либо къ классу $[\alpha, 5]$. Если мы допустимъ послѣднее, то классъ $[\alpha, 5]$ распадется на классы $[\alpha, \beta]$ и $[\beta, 5]$, такъ что каждая точка γ класса $[\alpha, 5]$ должна лежать либо въ классѣ $[\alpha, \beta]$, либо въ классѣ $[\beta, 5]$. Если точка γ принадлежитъ классу $[\beta, 5]$, то послѣдній вновь распадается на классы $[\beta, \gamma]$ и $[\gamma, 5]$; поэтому классъ $[4, 5]$ состоитъ изъ классовъ $[4, \alpha]$, $[\alpha, \beta]$, $[\beta, \gamma]$, $[\gamma, 5]$, и мы получаемъ дальнѣйшее подраздѣленіе, согласно предложенію 3: $[1, 2]$, $[2, 3]$, $[3, 4]$, $[4, \alpha]$, $[\alpha, \beta]$, $[\beta, \gamma]$, $[\gamma, 5]$, $[5, 6]$, . . . , $[n - 1, n]$, $[n, 1]$. Подсчетъ этихъ классовъ въ одномъ или въ другомъ направленіи даетъ въ то же время подсчетъ первоначальныхъ классовъ въ одномъ или въ другомъ направленіи; это продолжается, когда число точекъ дѣленія возрастаетъ, и мы такимъ образомъ приближаемся къ представленію, что точки прямой сами по себѣ могутъ быть приведены къ опредѣленному расположенію въ томъ смыслѣ, что всѣ классы, всѣ ихъ подклассы и т. д. могутъ быть приведены въ два циклически различныя расположенія. Вмѣстѣ съ тѣмъ здѣсь съ возрастающей силой запечатлѣвается представленіе о совокупности классовъ, какъ объ отрѣзкѣ, къ которому, однако, первоначально не примѣнивается понятіе о длинѣ¹²⁾. При всемъ томъ мы стоимъ уже у того пункта, гдѣ возникаетъ понятіе о большемъ и меньшемъ. Въ самомъ дѣлѣ, само собой напрашивается разложеніе класса $[4, 5]$ на классы $[4, \alpha]$ и $[\alpha, 5]$, которые мы рассмотрѣли въ предыдущемъ примѣрѣ, символически выразить такъ:

$$[4, 5] = [4, \alpha] + [\alpha, 5];$$

вмѣстѣ съ тѣмъ классы $[4, \alpha]$ и $[\alpha, 5]$, составляющіе „части“ объемлющаго класса $[4, 5]$, целесообразно считать „меньшими“, нежели весь классъ $[4, 5]$.

¹²⁾ Нужно сказать, что авторъ совершенно безъ нужды привнеситъ сюда наглядныя представленія.

Тогда

$$[\alpha, 5] = [\alpha, \beta] + [\beta, 5],$$

$$[\beta, 5] = [\beta, \gamma] + [\gamma, 5],$$

а вмѣстѣ съ тѣмъ

$$[4, 5] = [4, \alpha] + [\alpha, \beta] + [\beta, \gamma] + [\gamma, 5].$$

Если мы теперь согласимся это соотношеніе между классомъ k и его частью x обозначать знакомъ положеніемъ $x < k$, то

$$[\gamma, 5] < [\beta, 5], \quad [\beta, 5] < [\alpha, 5], \quad [\alpha, 5] < [4, 5],$$

и изъ этихъ „неравенствъ“ вытекаетъ, какъ и въ ариѳметикѣ, что

$$[\gamma, 5] < [4, 5].$$

Относительно двухъ частей k_1 и k_2 объемлющаго класса k мы имѣемъ, такимъ образомъ, критерій сравненія въ отношеніи понятій „больше“ или „меньше“, если одна изъ этихъ частей входитъ въ составъ другой; если же ни одинъ изъ этихъ классовъ не составляетъ части другого класса, то мы такимъ критеріемъ сравненія не располагаемъ. Этотъ критерій долженъ устанавливаться закономъ, который позволялъ бы всюду на прямой приводить въ сопряженіе съ нѣкоторыми данными классами другіе классы, которые принимаются за „равные“ данному классу. Вмѣстѣ съ тѣмъ классъ k_1 считается „меньше“ класса k_2 , если послѣдній содержитъ часть x_1 , которая равна классу k_1 . Логическій генезисъ понятія о величинѣ имѣетъ, такимъ образомъ, точкой отправленія понятія „больше“ и „меньше“; далѣе устанавливается равенство и въ заключеніе уже опредѣляется понятіе „сколь велико“. Для нашихъ цѣлей достаточно первой ступени. Но мы бы желали, чтобы эти соображенія послужили для читателя импульсомъ для проведенія этихъ идей въ какомъ-либо многообразіи, въ которомъ онѣ не нашли еще, какъ для точекъ прямой, установившагося вслѣдствіе повседневнаго опыта тривиальнаго примѣненія; какъ на примѣрѣ, укажемъ на измѣреніе температуръ¹³⁾.

§ 16. Аксиома Дедекинда и основная теорема проективной геометріи.

1. Для обоснованія геометріи плоскости, какъ мы видѣли въ § 13, 4, намъ нужно воспользоваться болѣе богатыми законами трехмѣрнаго пространства, чтобы вывести предложеніе Дезарга; предпосылки, которыя это предложеніе предполагаетъ, подробно указаны въ § 13, 12, доказательство же дано въ § 10, 1. Это предложеніе мы примѣнимъ къ двумъ парамъ треугольниковъ $A_1B_1C_1$ и $A_2B_2C_2$, $B_1C_1D_1$ и $B_2C_2D_2$, расположенныхъ въ нѣкоторой плоскости η такимъ образомъ, что точки пересѣченія соответственныхъ сторонъ первой пары:

¹³⁾ См. Д. Крыжановскій. „Ученіе о температурѣ по Маху“, „Вѣстникъ Оп. Физики“, №№ 464, 465—466.

С сторону A_1B_1 и A_2B_2 ,
 А " B_1C_1 " B_2C_2 ,
 В " C_1A_1 " C_2A_2 ,


а также точки пересечения соответственных сторон второй пары:

A' сторону B_1C_1 и B_2C_2 ,
 С " C_1D_1 " C_2D_2 ,
 B' " B_1D_1 " B_2D_2 ,

расположены на одной прямой u . В таком случае, по теореме Дезарга, сь одной стороны, прямая A_1A_2 , B_1B_2 , C_1C_2 , а сь другой стороны, B_1B_2 , C_1C_2 , D_1D_2 проходить через одну точку. Но эта точка уже определяется парой прямых B_1B_2 и C_1C_2 , входящих в состав обеих систем. Теперь оказывается, что два треугольника $A_1B_1D_1$ и $A_2B_2D_2$ расположены таким образом, что прямая A_1A_2 , B_1B_2 , D_1D_2 , соединяющая соответственные вершины, проходят через одну точку S . Поэтому, в силу обращения теоремы Дезарга, точки пересечения:

С прямых A_1B_1 и A_2B_2 , B' прямых B_1D_1 и B_2D_2
 и A' прямых D_1A_1 и D_2A_2

лежат на одной прямой. Это прямая u (фиг. 52). Доказательство



Фиг. 52.

остается в силе, если две точки в одной, в двух или даже в трех парах (A, A') , (B, B') и (C, C') совпадают. Но оно оказывается непри-

годнымъ, если одна изъ четырехъ точекъ A_1, B_1, C_1, D_1 лежитъ на прямой u . Система трехъ паръ прямыхъ, соединяющихъ эти точки попарно, называется „полнымъ“ четырехугольникомъ; двѣ прямыя, или „стороны“ каждой пары, которыя въ совокупности содержатъ всѣ четыре „вершины“ A_1, B_1, C_1, D_1 , называются „противоположными“ сторонами четырехугольника, а точка ихъ пересѣченія — „дополнительной вершиной“. Вмеѣстѣ съ тѣмъ мы приходимъ къ предложению:

Предложеніе 1. Если въ двухъ отнесенныхъ другъ другу полныхъ четырехугольникахъ пять паръ соответственныхъ сторонъ пересѣкаются въ точкахъ, лежащихъ на прямой u , которая не содержитъ ни одной изъ вершинъ, то прямыя шестой пары также пересѣкаются на той же прямой.

2. Полный четырехугольникъ $OPQR$ (фиг. 53) имѣетъ три дополнительные вершины A, J, B . Относительно нихъ имѣетъ мѣсто предложеніе:

Предложеніе 2. Дополнительные вершины полного четырехугольника не лежатъ на одной прямой.

Доказательство лучше всего провести безъ чертежа, такъ какъ это гарантируетъ намъ, что мы нигдѣ не пользуемся интуитивными соображеніями. Вершины четырехугольника мы обозначимъ просто цифрами 1, 2, 3, 4. Никакія три изъ нихъ не лежатъ на одной прямой. Положимъ, что


прямыя 14 и 23 пересѣкаются въ дополнительной вершинѣ A ,
 „ 24 „ 31 „ „ „ „ „ „ B .
 „ 34 „ 12 „ „ „ „ „ „ „ C .

Нужно доказать, что точки A, B и C не лежатъ на одной прямой. Прямыя 14, 24, 34 суть трансверсали, проходящія, каждая, черезъ одну изъ вершинъ треугольника 123 и выходящія изъ вершины четырехугольника 4; — A, B, C суть точки ихъ пересѣченія со сторонами треугольника. При помощи аксіомъ группы I нетрудно показать, что точки A, B, C отличны одна отъ другой и отъ точекъ 1, 2, 3, 4, ибо всякое другое допущеніе необходимо приводитъ къ тому, что изъ точекъ 1, 2, 3, 4 три лежатъ на одной прямой¹⁴⁾. Дальнѣйшее доказательство предложенія 2 опирается на аксіомы расположенія и ихъ слѣдствія.

На сторонахъ 23 и 31 треугольника 123 мы возьмемъ двѣ точки A' и B' такимъ образомъ, чтобы пара A, A' раздѣляла точки 2, 3 и пара B, B' раздѣляла точки 3, 1; положимъ, что прямая u' , соединяющая точки A' и B' , встрѣчаетъ сторону 12 въ точкѣ C' . Если бы намъ

¹⁴⁾ Если, напримѣръ, точка A совпадаетъ съ точкой B , то точка 1 лежитъ на прямой $A4$, и точка 2 лежитъ на той же прямой, т. е. точки 1, 2, 4 лежатъ на одной прямой.

удалось показать, что точки C и C' также раздѣляют пару точек 1, 2, то отсюда вытекало бы, что точки A, B, C не лежат на одной прямой u , ибо по аксиомѣ Π_3 три пары (A, A') , (B, B') , (C, C') должны были бы при такихъ условіяхъ раздѣлять либо двѣ пары вершинъ треугольника 123, либо ни одной. Это дѣйствительно можно доказать, но для этого нужны нѣкоторыя предварительныя соображенія. Если четыре луча a, b, c, d какого-либо пучка пересекаются двумя прямыми x и x' , не принадлежащими пучку, соответственно въ точкахъ A, B, C, D и A', B', C', D' , то, согласно предложенію 2 § 15-го, пара точекъ A, B имѣетъ относительно пары C, D



Фиг. 53.

то же расположеніе въ смыслѣ аксиомъ группы Π , какое пара A', B' имѣетъ относительно C', D' . Это мы будемъ для краткости обозначать такъ:

$$(A, B; C, D) = (A', B'; C', D').$$

Иначе говоря, въ зависимости отъ того, раздѣляютъ ли другъ друга пары точекъ A, B и C, D , или нѣтъ, — пары A', B' и C', D' также соответственно другъ друга раздѣляютъ или не раздѣляютъ.

Пусть X, Y, Z будутъ точки пересѣченія прямыхъ 14, 24, 34 съ прямой u' ; въ такомъ случаѣ сѣченія пучковъ 1, 2, 3, 4 со сторонами треугольника 123 и съ прямой u даютъ рядъ такихъ „равенствъ“, которыя мы перечислимъ, указывая каждый разъ пучекъ, обуславливающей это равенство.

Пучекъ 1:	$(A, A'; 2, 3) = (X, A'; C, B)$,	¹⁾ (1)
„ 4:	$(A, A'; 2, 3) = (X, A'; Y, Z)$;	(1')
„ 2:	$(B, B'; 3, 1) = (Y, B'; A', C)$,	(2)
„ 4:	$(B, B'; 3, 1) = (Y, B'; Z, X)$;	(2')
„ 3:	$(C, C'; 1, 2) = (Z, C'; B', A')$,	(3)
„ 4:	$(C, C'; 1, 2) = (Z, C'; X, Y)$	(3')

¹⁾ Изъ точки 1 выходятъ прямыя 14, 14', 12, 13, которыя при пересѣченіи съ прямой u даютъ точки $A, A', 2, 3$; при пересѣченіи съ прямой u' тѣ же прямыя даютъ точки X, A', C, B' . Аналогично устанавливаются и остальные „равенства“.

По условію,

точки A, A' раздѣляютъ точки 2, 3, (4)

" B, B' " " 3, 1. (5)

Изъ соотношеній (4) и (1') вытекаетъ: точки X, A' раздѣляютъ точки $Y, Z,$ (6)		Изъ соотношеній (5) и (2') слѣдуетъ: точки Y, B' раздѣляютъ точки $Z, X;$ (7)
---	--	--

отсюда, въ силу аксіомы Π_4 , слѣдуетъ:

точки X, Y слѣдуютъ за $A', Z,$ (6') | точки Y, X слѣдуютъ за $Z, B'.$ (7')

Согласно же предложенію 1 § 15-го, мы заключаемъ изъ соотношеній (6') и (7'), что

пара точекъ X, Y слѣдуетъ за парой $A', B'.$ (8)

Въ силу аксіомы Π_4 , соотношение (6) даетъ:

пара точекъ X, Z слѣдуетъ за парой $A', Y,$ (9)

а соотношение (7) даетъ также:

точки X, Z раздѣляютъ точки $B', Y.$ (10)

Примѣняя теперь предложеніе 1 § 15-го, съ одной стороны, къ соотношеніямъ (9) и (10), мы получимъ, что

пара X, Z раздѣляетъ пару $A', B',$ (11)

а съ другой стороны къ соотношеніямъ (11) и (8), получимъ:

пара A', B' раздѣляетъ пару $Y, Z.$ (12)

Изъ соотношеній (5) и (2) слѣдуетъ:

пара Y, B' раздѣляетъ пару $A', C';$ (13)

поэтому, согласно аксіомѣ Π_4 ,

пара Y, C' слѣдуетъ за $A', B',$

или въ обратномъ порядкѣ:

пара A', B' слѣдуетъ за парой $Y, C'.$ (14)

Наконецъ, въ силу того же предложенія 1 § 15-го, мы заключаемъ изъ соотношеній (13) и (14), что

точки A', B' раздѣляютъ точки $Z, C',$ (15)

а потому, въ виду соотношенія (3),


точки C, C' раздѣляютъ точки 1, 2, (16)

что и требовалось доказать.

3. Полному четырехугольнику противопоставляется „полный четырехсторонник“; это есть совокупность шести точек пересечения четырех прямых, из которых никакая три не проходят через одну точку. Две из этих точек пересечения, или „вершин“ четырехсторонника, через которые проходят все четыре прямые, называются „противоположными“ вершинами, прямая, их соединяющая, — „дополнительной стороной“ четырехсторонника. Так, например, на фиг. 53 прямые OP , PQ , QR , RO определяют полный четырехсторонник с тремя парами противоположных вершин: (O, Q) , (P, R) , (A, B) и с дополнительными сторонами OQ , PR , AB . Эти три прямые не проходят через одну точку, ибо таковой должна была бы служить, скажем, точка J , в которой пересекаются прямые OQ и PR ; но эта точка не лежит на прямой AB , ибо A, B, J суть дополнительные вершины полного четырехугольника, определяемого точками O, P, Q, R . Мы получаем, таким образом, предложение, аналогичное предложению 2:

Предложение 3. Дополнительные стороны полного четырехсторонника не проходят через одну точку.

4. На фиг. 53 изображен частный случай, когда прямая u , о которой идет речь в предложении 1, проходит через точки пересечения A и B двух противоположных сторон полного четырехугольника $OPQR$ и $O'P'Q'R'$. Выделяемым таким образом двум точкам A, B и третьей точке C прямой и это предложение однозначно относительно, при помощи полных четырехугольников, четвертую точку D той же прямой; таким образом, мы имеем возможность этим



Фиг. 54.

способом построить бесчисленное множество точек прямой u , коль скоро дана еще третья точка C . Если мы при этом построении, сохраняя точки A и B , примем за третью точку D , то мы возвратимся обратно к точке C . Отношение точек C, D к выделяемой в нашем полном четырехугольнике паре точек A, B является, таким образом, взаимным. Но и самое выделение точек A и B оказывается несущественным. Именно (фиг. 54), если H, K, L, M суть точки пересечения прямых AJ и BK со сторонами четырехугольника, проходящими через вершины

A и B , то полные четырехугольники $HOKJ$ и $JMQL$ дают каждый по парѣ противоположныхъ сторонъ, соответственно проходящихъ черезъ точки A и B ; между тѣмъ общая ихъ сторона OJQ проходитъ черезъ точку C ; вслѣдствіе этого, пятая ихъ стороны HK и ML должны пройти черезъ точку D . Но, съ другой стороны, четырехугольники $PHJM$ и $JKRL$ даютъ каждый пару противоположныхъ сторонъ, проходящихъ черезъ точки A и B , общая же сторона PJR проходитъ черезъ точку D ; слѣдовательно, шестая стороны HM и KL должны пройти черезъ точку C . Но теперь $HKLM$ представляетъ собой четырехугольникъ, который даетъ двѣ пары противоположныхъ сторонъ, соответственно проходящихъ черезъ точки C и D , между тѣмъ какъ стороны третьей пары проходятъ черезъ точки A и B ; такимъ образомъ, теперь точки C, D выдѣлены по отношенію къ точкамъ A, B совершенно такъ же, какъ раньше были выдѣлены точки A и B относительно C, D . Можетъ возникнуть вопросъ, нельзя ли разсматривать и точки A и C , какъ точки пересѣченія противоположныхъ сторонъ четырехугольника. Это, однако, оказывается невозможнымъ, ибо пары точекъ A, B и C, D , какъ мы сейчасъ покажемъ, другъ друга раздѣляютъ, между тѣмъ, какъ пары A, C и B, D , въ силу аксіомы Π_4 (§ 15), слѣдуютъ другъ за другомъ. Въ самомъ дѣлѣ,

изъ точки Q на прямую PR суть R, J, P, D ,
 " " " " " " " " " " P, J, R, D .

Если бы, поэтому, пары точекъ AC и BD другъ друга раздѣляли, то то же имѣло бы мѣсто относительно точекъ R, J и P, D , а также относительно точекъ P, J и R, D (§ 15, предл. 2); но это противорѣчитъ аксіомѣ Π_4 (§ 15), согласно которой изъ трехъ точекъ R, P, D есть только одна, которая вмѣстѣ съ точкой J раздѣляетъ двѣ другія точки. Слѣдовательно, пары AC и BD другъ друга не раздѣляютъ; то же справедливо и относительно двухъ паръ A, D и C, B ; въ виду аксіомы Π_4 пары A, B и C, D должны другъ друга раздѣлять. Результатъ этого изслѣдованія сводится, такимъ образомъ, къ слѣдующему:

Предложеніе 4. Если полный четырехугольникъ $OPQR$ расположенъ относительно трехъ точекъ A, B, C прямой и такимъ образомъ, что черезъ каждую изъ точекъ A и B проходитъ пара противоположныхъ сторонъ четырехугольника, а черезъ точку C проходитъ пятая сторона, то шестая однозначно опредѣляетъ на прямой и точку D , т. е. любой другой четырехугольникъ, — скажемъ, $OPQR$, такимъ же образомъ расположенный относительно точекъ A, B, C даетъ ту же точку D . Двѣ пары точекъ A, B и C, D называются гармоническими парами точекъ, или двумя парами гармоническихкими парами точекъ, или двумя парами гармоническихкими парами точекъ.

ческих точек. Они обладают следующими свойствами: а) они разделяют друг друга; б) точки C и D также могут быть сделаны точками пересечения противоположных сторон четырехугольника, остальные стороны которого проходят через точки A и B ; в) если, сохраняя точки A и B , мы заменим точку C точкой D , то точка D займет место точки C .


Гармоническое соответствие двух пар точек A, B и C, D , очевидно, представляет собой свойство проективное, ибо путем проектирования полный четырехугольник всегда опять превращается в полный четырехугольник, а, следовательно, две гармонические пары преобразовываются в гармонические же пары.

5. Положим, что три пары противоположных сторон полного четырехугольника XX' и YY' , XU и $X'Y'$, $X'Y$ и XU' пересекаются с двумя прямыми u и u_1 , с каждой в трех парах точек (B, A) , (Z, Z') , (W, W') и (B_1, A_1) , (Z_1, Z'_1) , (W_1, W'_1) (фиг. 55). В таком случае две пары X, X' и Y, Y' могут занимать относительно треугольника ABC , согласно аксиоме Π_3 , только следующие положения:

а) либо они разделяют соответственно пары C, B и C, A ;
б) либо они их не разделяют;

в) либо одна пара разделяет соответствующую ей пару, а другая не разделяет, как это имеет место на фиг. 55 относительно треугольника $A_1 B_1 C$.

Применяя к треугольникам ABC и $A_1 B_1 C$ и ссылаясь на XU и $X'Y'$ (соответственно) или к ссылаясь на $X'Y$ и XU' аксиому Π_3 (§ 15), мы приходим к заключению, что пары Z, Z' и W, W' в случае в) разделяют пару A, B (это иллюстрируется на фиг. 55 парами (A_1, B_1) , (Z_1, Z'_1) , (W_1, W'_1) , а в случае а) и б) не разделяют ее¹⁶⁾. Теперь мы применим ту же аксиому к треугольнику SPP' , образованному прямыми u , $X'Y$ и XU' , и к ссылаясь на проходящим через точки X', Y, X, Y' . В случаях а) и б), когда пара A, B не разделяет точек W, W' , — пары X', Y и S, P' , с одной стороны, и пары X, Y' и




Фиг. 55.

¹⁶⁾ Пользуясь ссылаясь на XU и $X'Y'$, мы это доказываем относительно пары Z, Z' ; пользуясь же ссылаясь на $X'Y$, XU' , — относительно точек W, W' .

S, W' , съ другой стороны, будутъ совместно либо сорасположены, либо противорасположены (II₅), а потому пара Z, Z' не будетъ раздѣлять пары W, W' (II₅, § 15)¹⁷⁾. Въ случаѣ c) точки A, B раздѣляютъ пару W, W' и прямая $X'X$ и $Y'Y'$ должны производить на сторонахъ треугольника $SW'W''$ еще одно дѣленіе (II₅, § 15), пара Z, Z' будетъ раздѣлять вершины W, W'' ¹⁸⁾. Мы доказали, такимъ образомъ, слѣдующее предположеніе:

Предположеніе 5. Если прямая u пересѣкаетъ стороны полного четырехугольника въ трехъ парахъ различныхъ точечекъ, то либо каждая изъ этихъ трехъ паръ раздѣляетъ любую другую пару, либо ни одна изъ трехъ паръ не раздѣляетъ другой пары¹⁹⁾.

6. Въ пунктѣ 4 былъ разобранъ тотъ частный случай, когда сѣкущая u , о которой идетъ рѣчь въ предположеніяхъ 1 и 4, проходитъ черезъ



Фиг. 56.

двѣ точки пересѣченія противоположныхъ сторонъ. Намъ остается, такимъ образомъ, рассмотреть тотъ случай, когда на прямой u пересѣкается одна пара противоположныхъ сторонъ; такой случай имѣлъ бы, напримеръ, мѣсто на фиг. 55, если бы точка Z' совпала съ точкой Z . На фигурѣ 56, которая, такимъ образомъ, получается, сохранены всѣ обозначенія предыдущаго

чертежа и проведена еще прямая SC , которая пересѣкаетъ прямая AB и $X'Y'$ соответственно въ точкахъ Q и Q' . Въ виду полного четырехугольника $XCY'S$ пара X', Y' раздѣляется гармонически парой Q, Z .

¹⁷⁾ Что въ случаѣ $(X', Y; J, W) = (Y', X; S, W')$, это мы доказываемъ, применяя аксіому II₄ къ треугольнику $SW'W''$ и сѣкущимъ $X'Y$ и Y' ; что пара Z, Z' при этомъ не будетъ раздѣлять пары W, W' , мы получаемъ, применяя ту же аксіому къ треугольнику $SW'W''$ и сѣкущимъ $X'Y$ и $X'Y'$.

¹⁸⁾ Что точки A, B въ случаѣ c) раздѣляютъ пару $W'W''$, это было уже выяснено выше въ текстѣ. Применяя поэтому къ треугольнику $SW'W''$ и прямымъ $X'X$ и $Y'Y'$ аксіому II₅, мы приходимъ къ заключенію, что $(X', Y; S, W') = (X, Y', S, W'')$, т. е. въ одной изъ этихъ двойныхъ паръ имѣетъ мѣсто дѣленіе, а въ другой нѣтъ; вслѣдствіе этого, применяя аксіому II₄ вновь къ треугольнику $SW'W''$ и сѣкущимъ $X'Y$ и $X'Y'$, мы приходимъ къ выводу, что пара Z, Z' въ этомъ случаѣ раздѣляетъ пару W, W'' .

¹⁹⁾ Наши три пары точекъ суть (A, B) , (W, W') , (Z, Z') . Въ случаяхъ a) и b), какъ было показано, пара A, B не раздѣляется ни парой W, W' , ни парой Z, Z' , а пара W, W' не раздѣляется парой Z, Z' ; ни одна изъ трехъ паръ не дѣлитъ другой пары. Напротивъ, въ случаѣ c) пара A, B раздѣляется каждой изъ двухъ другихъ паръ, и эти послѣднія, къ свою очередь, раздѣляютъ другъ друга.

Проекціями этихъ двухъ паръ точекъ изъ точекъ C и S на прямую u соответственно служатъ A, B и Q, Z , съ одной стороны, — W, W' и Q, Z , съ другой. Какъ изъ этихъ двухъ паръ дѣлится, слѣдовательно, вторую гармонически. Такъ какъ далѣе двѣ пары точекъ A, C и Y, Y' проектируются изъ точки Z въ двѣ пары B, C и X, X' , то какъ первая, такъ и вторая двѣ пары одновременно другъ друга раздѣляютъ или не раздѣляютъ. Въ силу аксіомы II, § 15, въ примѣненіи къ треугольнику ABC , точки A, B ни въ одномъ ни въ другомъ случаѣ не раздѣляютъ точекъ W, W' ¹⁹⁾. Поэтому:

Предложеніе 6. Если въ условіяхъ предложенія 5 двѣ точки одной изъ поименованныхъ тамъ паръ сливаются въ одну точку Z , то остальные двѣ пары другъ друга не раздѣляютъ; при этомъ имѣется точка Q , которая совмѣстно съ точкой Z дѣлитъ гармонически какъ одну, такъ и другую пару.

Обратно, если двѣ пары точекъ раздѣляются гармонически одной и той же парой Z, Q , то имѣются полные четырехугольники, которые посылаютъ въ точку Z или Q по двѣ противоположныя стороны, а въ каждую изъ двухъ названныхъ паръ точекъ — по одной парѣ противоположныхъ сторонъ.

Въ самомъ дѣлѣ, на прямой, проходящей черезъ точку Z , возьмемъ произвольно двѣ гармоническія пары Z, Q' и X', Y' , проведемъ прямыя AY' и BX' , а также $X'W'$ и $Y'W''$; этимъ опредѣлимъ точки C и S на фиг. 56. Затѣмъ построимъ точки пересѣченія X, Y прямыхъ $WX', AC, W'Y'$ и BC . Въ такомъ случаѣ прямая XU должна пройти черезъ точку Z , такъ какъ X, Y' и Q, Z суть гармоническія пары. вмѣстѣ съ тѣмъ доказано обратное предложеніе, изъ котораго вытекаетъ, что двѣ пары точекъ, раздѣляющія другъ друга, не могутъ быть раздѣлены гармонически одной и той же третьей парой²⁰⁾.


¹⁹⁾ Здѣсь рассматривается сѣченіе треугольника прямыми $X'Y'$ и $X'Y''$. Эти прямыя сѣкутъ:

	сторону AC	въ точкахъ Y и Y' ,
•	BC	• X и X' ,
•	AB	• W и W'' .

Какъ было показано, если точки A, C дѣлятъ пару Y, Y' , то и точки B, C дѣлятъ пару X, X' ; поэтому, въ силу аксіомы II, точки A, B не дѣлятъ пары W, W'' . Если же точки A, C не дѣлятъ пары Y, Y' , то и точки B, C не дѣлятъ пары X, X' , — а потому и точки A, B не дѣлятъ пары W, W'' .

²⁰⁾ Пери принимаетъ даже это свойство двухъ паръ за опредѣленіе дѣленія; согласно его опредѣленію двѣ точки не раздѣляютъ двухъ другихъ точекъ на той же прямой, если существуетъ пара, расположенная гармонически относительно каждой изъ двухъ первыхъ паръ; если же такой третьей пары не существуетъ, то первая пара раздѣляетъ другъ друга. Это опредѣленіе тѣмъ болѣе искусственно, что оно примѣнимо только въ непрерывной системѣ.

7. Изъ изслѣдованій Гильберта о непрерывности въ § 12 его „Основаній“ вытекаетъ, что двумъ парамъ точекъ A, B и M, N , другъ друга не раздѣляющимъ, по силѣ введенныхъ нами до сихъ поръ аксиомъ, не всегда отвѣчаетъ третья пара U, V , дѣлящая гармонически обѣ данныя пары. Если мы попытаемся, согласно предложенію 6, построить полный четырехугольникъ $PQRS$, который имѣетъ двѣ противоположныя стороны PQ и RS , соответственно проходящія черезъ точки M и N , а также двѣ другія противоположныя стороны PR и QS , проходящія черезъ точки A и B , такимъ образомъ, чтобы противоположныя стороны PS и QR третьей пары пересѣкали прямую ω , содержащую точки A, B, M, N (фиг. 57), въ одной точкѣ U , то мы, вообще говоря, получимъ



Фиг. 57.

двѣ различныя точки пересѣченія x_1, y_1 . Соответствующія имъ точки P и Q на отрѣзкахъ AR и BS , которыя мы сохраняемъ неизмѣнными, мы помѣтили отдѣльно черезъ P_1 и Q_1 . Сохраняя вмѣстѣ съ данными точками A, B, M, N неизмѣнными еще точки R и S и повторяя то же построеніе при другихъ положеніяхъ

$P_2, P_3 \dots$ точки P на отрѣзкѣ AR , мы получаемъ четверныя группы точекъ $P_2 Q_2 x_2 y_2, P_3 Q_3 x_3 y_3 \dots$, которая каждой точкѣ x_n прямой ω относятъ нѣкоторую точку y_n и, обратно, каждой точкѣ y_n нѣкоторую точку x_n ²¹⁾. Пусть C будетъ точка пересѣченія прямыхъ AR и BS . Мы ограничиваемъ положеніе точки P_n на прямой AB классомъ $(A, C)_R$, не содержащимъ точки R . Такъ какъ точки A, B не раздѣляютъ пары M, N , то прямая RN и $P_n M$ должны пересѣкаться сторону CB треугольника ABC въ точкахъ Q_n и S , которыя всегда раздѣляютъ пару точекъ B, C ²²⁾;

²¹⁾ Иными словами, если мы произвольную точку прямой ω примемъ за x_n , то мы этимъ построениемъ опредѣлимъ соответствующую ей точку y_n . Именно: соединяя точку x_n съ S , мы получимъ въ пересѣченіи прямыхъ Sx_n и AR точку P_n ; соединяя, далѣе, P_n съ точкой M , мы получаемъ въ пересѣченіи съ прямой SB точку Q_n ; наконецъ, прямая RQ_n опредѣляетъ на прямой ω точку y_n .

²²⁾ Это получается, если примѣнимъ аксиому II₅ къ треугольнику ABC и сѣкущимъ MP_n и RN . Точки P_n, R раздѣляютъ пару A, C по условію, ибо точка

такимъ образомъ, положеніе точки Q_n ограничивается классомъ $(C, B)_S$. Такъ какъ, съ другой стороны, точки P_n и R , раздѣляемые парой A, C , проектируются изъ S въ точки x_n и N , то вслѣдствіе ограниченія, принятаго относительно положенія точки P_n , всѣ точки x_n принадлежатъ классу $(A, B)_N$, который мы короче обозначимъ черезъ $[A, B]$. Но тому же классу принадлежатъ также точки y_n , ибо три пары $A, B, -x_n, y_n$ и M, N , согласно предложенію 5, другъ друга не раздѣляютъ. Съ другой стороны, пользуясь первой ступенью понятія о величинѣ, какъ это установлено въ § 15, 8, мы можемъ сказать, что всегда будетъ имѣть мѣсто одно изъ неравенствъ

$$[A, x_n] \leq [A, y_n] \quad \text{или} \quad [A, x_n] \geq [A, y_n], \quad (17)$$

въ которыхъ знакъ равенства имѣеть мѣсто только въ томъ случаѣ, когда точки x_n и y_n совпадаютъ. На чертежѣ 57 точки x_1, y_1 удовлетворяютъ первому неравенству, точки x_2, y_2 удовлетворяетъ второму, точка же U претворяетъ ихъ въ равенство, такъ какъ въ ней точка x совпадаетъ съ соответствующей точкой y . Однако, существованіе такой точки U должно быть постулировано особой аксіомой.

Обратно, если какъ-либо доказано, что пара точекъ U, I' дѣлитъ гармонически пары A, B и M, N , и U есть та точка этой пары, которая принадлежитъ классу $[A, B]$, то U представляетъ собой такую точку x , которая совпадаетъ съ соответствующей точкой y .

Въ самомъ дѣлѣ, при помощи предложенія 6 мы докажемъ, что прямая PQ , соединяющая точку пересѣченія P прямыхъ US и AR съ точкой пересѣченія Q прямыхъ UR и BS , проходитъ черезъ точку M . Обозначимъ предварительно точку пересѣченія прямыхъ PQ и AB черезъ M' ; въ такомъ случаѣ, согласно предложенію 6²³⁾, точкѣ U соответствуетъ такая точка I' , что

- а) точки A, B раздѣляются гармонически точками U, I' ,
 б) " M', N " " " " " U, I' .

Съ другой стороны, по условію:

- а) точки A, B раздѣляются гармонически парой точекъ U, I' ; въ силу соотношенія а) отсюда вытекаетъ, что точка I' совпадаетъ съ I .
 б) точки M, N раздѣляются гармонически точками U и I' ; въ силу соотношенія б) отсюда вытекаетъ, что точка I' , въ свою очередь, совпадаетъ съ точкой M , что и требовалось доказать.

P_n принадлежитъ классу $(AC)_R$; далѣе, по условію же точки A, B не раздѣляютъ пары M, N ; слѣдовательно, точки S, Q_n не раздѣляютъ пары B, C .

²³⁾ Въ данномъ случаѣ теорема 6 примѣняется къ полному четырехугольнику $PQRS$, разсѣкаемому прямой AB ; стороны PS и QR эта прямая встрѣчается въ одной и той же точкѣ U .

8. Неравенство (17) производить в классъ $[A, B]$ Дедекиндово сѣчение $U'U''$, которымъ мы пользовались в I томѣ (§ 22, 4) для опредѣленія иррациональныхъ чиселъ; именно:

Совокупность точекъ класса $[A, B]$ разбивается на двѣ категоріи точекъ *) U' и U'' такимъ образомъ, что:

- 1) каждая точка класса $[A, B]$ принадлежитъ одной и только одной изъ этихъ категорій;
- 2) изъ крайнихъ точекъ класса A, B , одна должна быть отнесена къ категоріи U' , другая къ категоріи U'' ;
- 3) между любой точкой u' первой категоріи и любой точкой u'' второй категоріи въ классѣ $[A, B]$ имѣеть мѣсто соотношеніе $[A, u'] < [A, u'']$.

Чтобы удобнѣе описать сѣченіе, которое въ нашемъ случаѣ производится путемъ установленія соответствія точекъ y точкамъ x , мы условимся говорить, что точка μ класса $[A, B]$ „предшествуетъ“ точкѣ ν того же класса, если въ предѣлахъ класса $[A, B]$ имѣеть мѣсто неравенство $[A, \mu] < [A, \nu]$. Въ дополненіе къ этому мы условимся также говорить, что точка A предшествуетъ точкѣ B . Слѣдя Энрикесу **) , мы отнесемъ:

- 1) къ категоріи U' каждую точку x класса $[A, B]$, которая предшествуетъ соответствующей точкѣ y ; этой категоріи принадлежитъ, по крайней мѣрѣ, одна точка A ;
- 2) къ категоріи U'' — всѣ остальные точки класса $[A, B]$; сюда принадлежитъ также точка B .

Каждая точка класса $[A, B]$, включая и крайнія точки A, B , можетъ быть разсматриваема, какъ точка x , и должна принадлежать одной изъ двухъ категорій. Если точка x_n предшествуетъ точкѣ y_n , то и каждая точка x класса $[A, x_n]$ предшествуетъ точкѣ y , такъ какъ классъ $[A, x_n]$, какъ совокупность точекъ x , соответствуетъ классу $[B, y_n]$, какъ совокупности точекъ y (предл. 2 § 15). Требованія, которыми характеризуется сѣченіе, такимъ образомъ, выполнены ²⁴⁾.

*) Мы преднамѣренно избѣгаемъ термина „часть“, которымъ мы пользовались въ указанномъ мѣстѣ I тома, чтобы избѣгнуть какого-либо намека на то, что точки такой „части“ пространственно расположены другъ подлѣ друга; такое расположеніе можетъ быть установлено только особой аксіомой.

**) F. Enriques. „Vorlesungen über projektive Geometrie“. Deutsch von H. Fischer. Leipzig. 1903. §§ 18, 19. (Оригиналъ итальянскій).

²⁴⁾ Замѣчаніе этого послѣдняго абзаца, строго говоря, излишне, такъ какъ прежнія соображенія уже даютъ все необходимое для сѣченія; доказать же это соображеніе не такъ просто, если восполнить то, что авторомъ выражено въ немъ нѣкихъ словахъ.

Если разсматривать прямую AB то какъ рядъ точекъ x , то какъ рядъ точекъ y , то этимъ устанавливается сопряженіе прямой (ряда x) съ самою собою

Мы могли бы воспользоваться установленным таким образом сѣченіем U'/U'' , чтобы опредѣлить точку U , о которой идетъ рѣчь аналогично тому, какъ мы разсуждали въ томъ I. Но мы придемъ ближе къ дѣлу, если мы постулируемъ эту точку при помощи слѣдующей аксіомы Дедекинда:

III. Каждое сѣчение U'/U'' класса точекъ $[A, B]$ на прямой uv всегда производится нѣкоторой точкой U этого класса въ томъ смыслѣ, что категория U' совпадаетъ съ классомъ $[A, U]$, категория U'' съ классомъ $[U, B]$.

Эта точка U , разсматриваемая какъ точка x , необходимо должна совпасть съ соответствующей точкой y , такъ какъ она не можетъ ни предшествовать послѣдней, ни слѣдовать за ней. Когда точка U опредѣлена, то точку V мы получаемъ какъ пересѣчение прямой uv съ прямой OC , соединяющей точку C съ точкой пересѣченія O прямыхъ SR и PQ .

Въ классѣ $[A, B]$ не существуетъ другой точки U_0 , отличной отъ U , которая совместно съ другой точкой V_0 , построенной по тому же правилу, что и V , дѣлитъ гармонически какъ точки A и B , такъ и точки M и N ; въ самомъ дѣлѣ, если бы AP_0PC было проекціей AU_0UB изъ точки S на прямую AC ; далѣе, если бы BQ_0QC было проекціей группы точекъ AP_0PC изъ точки M на прямую CB , — то BU_0CA было бы проекціей послѣдней системы точекъ изъ точки R на прямую AB .

(съ рядомъ y). Нетрудно видѣть, что это сопряженіе представляетъ собой проективное соотвѣтствіе. Рядъ точекъ x мы проектируемъ сначала изъ точки S на прямую AC ; получаемъ рядъ точекъ P (перспектива); этотъ рядъ проектируемъ изъ точки M на прямую BC , получаемъ рядъ Q (новая перспектива); наконецъ, рядъ Q проектируемъ изъ R на прямую AB , получаемъ рядъ y (третья перспектива). Въ этомъ проективномъ соотвѣтствіи точки A и B замѣняютъ другъ друга, равно какъ и точки M и N . Подъ классомъ $[A, B]$ мы разумѣемъ классъ $(A, B)_N$ т. е. одинъ изъ двухъ классовъ, на которые точки A и B дѣлятъ прямую AB , а именно классъ, не содержащій точки N . Но такъ какъ точки M и N не раздѣляютъ точекъ A, B , то тотъ же классъ можетъ быть обозначенъ черезъ $(A, B)_M$.

Положимъ теперь, что точка x_n принадлежитъ классу $[A, B]$ и предшествуетъ точкѣ y_n , которая, какъ мы знаемъ, тоже принадлежитъ классу $[A, B]$. Это значитъ, что $[A, x_n] < [A, y_n]$.

Положимъ теперь, что точка x принадлежитъ классу $[A, y_n]$, иначе классу $(A, x_n)_N$; это значитъ, что точки x и N раздѣляютъ точки A, x_n . Но наше проективное соотвѣтствіе превращаетъ эти точки въ y и M , B и y_n ; эти пары, слѣдовательно, раздѣляютъ другъ друга (предл. 2 § 15), т. е. точка y принадлежитъ классу $(y_n, B)_M$; значитъ, точки y, M дѣлятъ пару y_n, B .

Разсмотримъ теперь пять точекъ y_n, y, B, M, N .

Точки y_n, B дѣлятъ точки y, M ; (а)

точки y_n, B не дѣлятъ точекъ M, N . (б)

Соотношеніе (б) представляетъ собой слѣдствіе аксіомы II, ибо точки y_n принадлежатъ классу $[A, B]$ или $(A, B)_M$, т. е. точки y_n и M дѣлятъ пару A, B . Изъ

Слѣдовательно, двѣ группы AU_0UB и BV_0VA должны были бы имѣть одинаковое расположеніе (предл. 2-ое § 15). Если бы точки A, B не раздѣляли точекъ U, U_0 и, слѣдовательно, либо пара A, U_0 раздѣляла бы пару U, B , либо пара A, U раздѣляла бы пару U_0, B , то въ первомъ случаѣ пара B, U_0 должна была бы раздѣлять пару U, A , во второмъ случаѣ пара B, U —пару A, U_0 ; но то и другое находится въ противорѣчій съ аксіомой Π_3 , согласно которой точкѣ U отвѣчаетъ только одна изъ трехъ точекъ U_0, A, B , которая вмѣстѣ съ ней раздѣляетъ двѣ другія точки.

Но такъ какъ изъ двухъ точекъ, которыя гармонически дѣлятъ пару A, B , одна необходимо должна принадлежать классу $[A, B]$, то отсюда слѣдуетъ²⁵⁾:

Предложеніе 7-ое: двумъ парамъ точекъ A, B и M, N , не раздѣляющимъ другъ друга, всегда отвѣчаетъ одна и только одна пара точекъ U, V , которая раздѣляетъ гармонически какъ пару A, B , такъ и пару M, N .

Это доказательство существованія, являющееся слѣдствіемъ требованія, выраженнаго аксіомой Π_3 , само по себѣ не даетъ точнаго построенія точекъ U и V ; напротивъ, для этого необходимо еще присоединить кривую второго порядка,—образъ, самое воспроизведеніе котораго можно себѣ представить только при средствѣ безпредѣльнаго повторенія нѣкотораго построенія.

9. Аксіомы I, II, III образуютъ основу проективной геометріи. Уже здѣсь мы можемъ, такъ сказать, удвоить продуктивность труда, затрачиваемаго на построеніе этой геометріи; для этого достаточно замѣтить, что изъ аксіомъ I, II, III и ихъ слѣдствій вытекаютъ правильныя предложенія, если мы будемъ замѣнять слова „точка“, „плоскость“ словами „плоскость“, „точка“. Напримѣръ:

соотношеній (α) и (β) , въ силу предложенія 1 § 16-го, вытекаетъ, что точки y_n, B дѣлятъ пару y, N ; т. е. точка y принадлежитъ классу $(y_n, B)_N$ или $[y_n, B]$. Итакъ, если точка x принадлежитъ классу $[A, x_n]$, то точка y принадлежитъ классу $[y_n, B]$.

Какъ выяснено было въ § 15, п.п. 7 и 8, точка x_n дѣлитъ классъ $[A, B]$ на классы $[A, x_n]$ и $[x_n, B]$. Если точка x_n предшествуетъ точкѣ y_n , то $[A, x_n] < [A, y_n]$; весь классъ $[y_n, B]$ принадлежитъ классу $[x_n, B]$ въ томъ числѣ и точка y ; точка y дѣлитъ классъ $[x_n, B]$ на $[x_n, y]$ и $[y, B]$ такъ что $[A, x_n] < [A, y]$. Такъ какъ $[A, x] < [A, x_n]$, то $[A, x] < [A, y]$.

²⁵⁾ Въ предыдущемъ абзацѣ было обнаружено, что точка U_0 не можетъ лежать вмѣстѣ съ U въ классѣ $[A, B]$; но если бы существовала другая пара точекъ, которая дѣлила бы гармонически какъ пару $[A, B]$, такъ и пару $[M, N]$, то одна изъ этихъ точекъ лежала бы необходимо внутри класса $[A, B]$. Если бы мы ее приняли за точку U_0 , то мы пришли бы такимъ образомъ къ противорѣчію.

Двѣ точки инцидентны съ одной и только одной прямой (съ прямой, ихъ соединяющей).

Три точки, не инцидентныя съ одной и той же прямой, инцидентны съ одной плоскостью.

Но и въ геометріи на плоскости, которой мы въ дальнѣйшемъ намѣрены ограничиться, всѣ предложенія ризбиваются на пары и переходятъ одно въ другое, когда мы замѣняемъ слова „прямая“ и „точка“ другъ другомъ и соотвѣтственно мѣняемъ остальные термины. Треугольнику, какъ системѣ прямыхъ, соединяющихъ три точки, соотвѣтствуетъ трехсторонникъ, какъ система трехъ точекъ пересѣченія трехъ прямыхъ на плоскости. Предложеніе Дезарга даетъ, напримѣръ:

Если два сопряженныхъ треугольника на плоскости расположены такимъ образомъ, что прямая, соединяющая соотвѣтствующія вершины, проходятъ черезъ одну точку, то точки пересѣченія соотвѣтствующихъ сторонъ лежатъ на одной прямой.

Нѣтъ надобности проводить эту идею черезъ всѣ аксіомы сопряженія въ отдѣльности. Понятіе о расположеніи легко перенести на лучи пучка $S(a, b, c, \dots)$; именно, мы будемъ присваивать лучамъ a, b, c, \dots , проходящимъ черезъ точку S , тѣ же свойства расположенія, которыя принадлежатъ точкамъ ихъ пересѣченія A, B, C, \dots , съ какой-либо прямой u , не проходящей черезъ точку S . Такъ какъ, согласно предл. 2 § 15, расположеніе точекъ на прямой есть свойство проективное, т. е. принадлежитъ также проекціямъ этихъ точекъ на любую прямую изъ точки S , то расположеніе лучей пучка не зависитъ отъ вспомогательной прямой u и удовлетворяетъ аксіомамъ 2, если мы замѣняемъ слова „точка“ и „прямая“ другъ другомъ. Изъ предложеній, которыя такимъ образомъ получаются, мы приведемъ здѣсь аксіому расположенія въ плоскости Π_2 и ея обращеніе.

Двѣ прямая u, v въ плоскости треугольника либо не раздѣляютъ ни одной пары вершинъ, либо раздѣляютъ двѣ пары.

Новое обозначеніе, здѣсь введенное, не нуждается, конечно, въ поясненіи; для доказательства предложенія, написаннаго справа, доста-

Двѣ плоскости инцидентны съ одной и только одной прямой (съ прямой ихъ пересѣченія).

Три плоскости, которыя не инцидентны съ одной и той же прямой, инцидентны съ одной и той же точкой (съ точкой ихъ пересѣченія).

Если два сопряженныхъ трехсторонника, лежащіе въ одной плоскости, расположены такимъ образомъ, что точки пересѣченія соотвѣтственныхъ сторонъ лежатъ на одной прямой, то прямая, соединяющая соотвѣтственныя вершины, проходятъ черезъ одну точку.

Двѣ точки U, V въ плоскости трехсторонника либо не раздѣляютъ ни одной пары его сторонъ, либо раздѣляютъ двѣ пары.

точно провести прямую, соединяющую точки U и V , и примѣнить предл. 1 § 15-го къ точкамъ ея пересѣченія со сторонами трехсторонника. Такъ какъ предложеніе о лучахъ пучка, которое такимъ образомъ получается изъ аксіомы III, также оказывается справедливымъ, то точки плоскости находятся въ такомъ же отношеніи къ ея прямымъ, въ какомъ прямая находится къ ея точкамъ. Этимъ установленъ законъ двойственности, согласно которому всѣ предложенія строго проективной геометріи даютъ правильныя предложенія, если мы въ нихъ слова „точка“ и „прямая“ замѣнимъ другъ другомъ и соответственно видоизмѣнимъ остальные термины. Поэтому впредь изъ двухъ „двойственныхъ“ въ указанномъ смыслѣ слова предложеній мы должны будемъ доказывать только одно; это сбереженіе труда даетъ уже здѣсь возможность оцѣнить достоинство строго логическаго развитія проективной геометріи изъ аксіомъ. Чтобы вполне провести принципъ Маха объ экономіи мышленія, мы будемъ впредь выражать всѣ опредѣленія въ ихъ двойственной формулировкѣ. Такъ, напримѣръ, мы будемъ называть четыре луча пучка гармоническими, если имъ отвѣчаетъ полный четырехсторонникъ, въ которомъ черезъ двѣ пары противоположныхъ вершинъ проходитъ по одному изъ названныхъ лучей, а третій и четвертый лучи проходятъ каждый черезъ одну изъ двухъ другихъ противоположныхъ вершинъ. Эти лучи всегда проходятъ черезъ четыре гармоническія точки одного изъ полныхъ четырехугольниковъ, которые опредѣляетъ полный четырехсторонникъ; вмѣстѣ съ тѣмъ легко усмотрѣть, что четыре луча пучка, проходящіе черезъ четыре гармоническія точки, всегда представляютъ собой гармоническіе лучи.

10. Пучку лучей, который мы уже опредѣлили выше въ § 15, по принципу двойственности въ плоскости отвѣчаетъ „рядъ точекъ“, т. е. совокупность точекъ прямой линіи. Рядъ точекъ и пучекъ лучей суть основные образы (первой ступени) проективной геометріи на плоскости. При ихъ посредствѣ можно образовать наиболѣе интересныя плоскія кривыя, коническія сѣченія, какъ по точкамъ, такъ и по касательнымъ. Чтобы уже здѣсь выдвинуть цѣль нашего изслѣдованія, мы предпошлемъ вспомогательное замѣчаніе въ предположеніи, что мы оперируемъ въ Евклидовой геометріи. Если мы проектируемъ точки окружности P_1, P_2, P_3, \dots изъ двухъ точекъ на ея периферіи S и T , то углы $P_b SP_k$ и $P_b TP_k$ ($b, k = 1, 2, 3, \dots$) равны между собою при всевозможныхъ комбинаціяхъ индексовъ b и k . Если мы отнесемъ каждому лучу пучка S тотъ лучъ пучка T , который проходитъ черезъ ту же точку окружности P_k , то четыремъ гармоническимъ лучамъ одного пучка S отвѣчаютъ четыре гармоническихъ же луча другого пучка T , ибо соответствующіе лучи одного и другого пучка, въ силу теоремы о вписанныхъ углахъ, образуютъ одинаковые углы. Съ другой стороны, это соответствіе между двумя пучками не нарушается при проектированіи послѣднихъ. Если поэтому мы попутно

будем считать известнымъ, что центральная проекція окружности есть коническое сѣченіе, то мы можемъ сказать, что точки конического сѣченія P_1, P_2, P_3, \dots проектируются изъ двухъ его точекъ S и T двумя пучками, которые находятся въ такомъ соотвѣтствіи, что любымъ четырехъ гармоническимъ лучамъ одного пучка отвѣчаютъ четыре гармоническихъ же луча другого пучка. Отсюда естественно можно придти къ мысли, что и обратно точки любого конического сѣченія могутъ быть получены, какъ точки пересѣченія соотвѣтствующихъ лучей двухъ пучковъ S, T , находящихся въ такомъ соотвѣтствіи, что четырехъ гармоническимъ лучамъ одного пучка отвѣчаютъ четыре гармоническихъ же луча другого.

Это соображеніе, которымъ мы ниже, конечно, вовсе не будемъ пользоваться, приводитъ къ мысли устанавливать обратимо-однозначныя „сопряженія“ между лучами двухъ пучковъ (или рядовъ точекъ), т. е. устанавливать и изслѣдовать законы, которые относятся каждому элементу (точкѣ — въ случаѣ ряда точекъ, лучу — въ случаѣ пучка лучей) одного образа одинъ и только одинъ элементъ другого образа и обратно. Пучекъ лучей $S(a, b, c, \dots)$ съ вершиной S и лучами a, b, c, \dots можно проще всего привести въ сопряженіе съ рядомъ точекъ $u(A, B, C, \dots)$, если каждому лучу пучка S отнести ту точку прямой u , черезъ которую онъ проходитъ; такое соотвѣтствіе называютъ перспективнымъ. Если два ряда точекъ u и v на плоскости находятся въ перспективномъ соотвѣтствіи съ однимъ и тѣмъ же пучкомъ S той же плоскости, то между ними тѣмъ самымъ устанавливается однозначное соотвѣтствіе²⁶⁾, которое также называется перспективнымъ. Прямая, соединяющая соотвѣтствующія точки двухъ перспективныхъ рядовъ на плоскости, проходить, слѣдовательно, черезъ одну точку S . Два пучка, находящіеся въ перспективномъ соотвѣтствіи съ однимъ и тѣмъ же рядомъ точекъ, мы также будемъ называть перспективными²⁷⁾.

Представимъ себѣ теперь, что рядъ точекъ u при помощи пучка лучей S_1 приведенъ въ перспективное соотвѣтствіе съ рядомъ точекъ u_1 ; что рядъ точекъ u_1 , въ свою очередь, при помощи пучка S_2 приведенъ въ перспективное соотвѣтствіе съ рядомъ точекъ u_2 ; далѣе, этотъ рядъ приведенъ при помощи пучка S_3 въ соотвѣтствіе съ рядомъ u_3 и т. д.; въ такомъ случаѣ и послѣдній рядъ этой системы u_n будетъ однозначно

²⁶⁾ Т. е. такое соотвѣтствіе будетъ дѣйствительно установлено, если мы примемъ, что каждой точкѣ одного ряда отвѣчаетъ та точка другого ряда, которая лежитъ съ первой на одномъ лучѣ пучка.

²⁷⁾ Иначе говоря, перспективными называются два пучка, приведенные въ такое соотвѣтствіе другъ съ другомъ, что точки пересѣченія соотвѣтствующихъ лучей лежатъ на одной прямой.

сопряженъ съ первымъ рядомъ u^{28}); однако, прямая, соединяющія соответствующія точки рядовъ u и u_n , вообще говоря, не будутъ проходить черезъ одну точку,—ными словами, эти два ряда не будутъ перспективными. Но соответствие рядовъ u и u_n сохраняетъ то общее съ перспективной свойство, что четыремъ гармоническимъ точкамъ ряда u всегда отвѣчаютъ четыре гармоническія же точки ряда u_n . Однозначное соответствие между двумя основными образами первой ступени называется проективнымъ, если четыремъ гармоническимъ элементамъ одного образа всегда соответствуютъ четыре гармоническихъ же элемента другого. Два основныхъ образа, проективные съ третьимъ, проективны между собой. Основной образъ можетъ быть сопряженъ проективнымъ соответствіемъ и съ самой собой, если, напримѣръ, мы совмѣстимъ рядъ u_n съ рядомъ u . Каждое перспективное соответствие является также проективнымъ; но мы покажемъ, что и обратно—каждое проективное соответствие можетъ быть осуществлено при помощи ряда перспективныхъ сопряженій.

11. Съ этою цѣлю мы прежде всего замѣтимъ слѣдующее:

Предложеніе 8. Проективное соответствие двухъ основныхъ образовъ сохраняетъ расположеніе элементовъ; это значитъ, что двумъ парамъ элементовъ одного образа, раздѣляющимъ другъ друга, всегда отвѣчаютъ двѣ пары элементовъ другого образа, также раздѣляющія другъ друга.

Въ самомъ дѣлѣ, допустимъ къ двумъ парамъ A, B и C, D , раздѣляющимъ другъ друга, отвѣчаютъ двѣ пары A', B' и C', D' , не раздѣляющія другъ друга. Пусть U', V' будутъ элементы, которые, согласно предложенію 7, дѣлятъ гармонически какъ элементы A' и B' , такъ и элементы C' и D' . Въ такомъ случаѣ элементы U, V , соответствующихъ элементамъ U', V' , согласно опредѣленію проективнаго соответствія, должны также дѣлить гармонически какъ элементы A, B , такъ и элементы C, D ; но это противорѣчитъ послѣднему предложенію пункта 6. Слѣдовательно, предложеніе 8 правильно; отсюда вытекаетъ, что циклическому ряду классовъ $[1, 2], [2, 3], \dots$, о которыхъ была рѣчь въ § 15, 7, также отвѣчаетъ циклическій рядъ $[1', 2'], [2', 3'] \dots$ ²⁹⁾.

²⁸⁾ Конечно, при надлежащемъ о томъ соглашеніи.

Если точекъ A ряда u соответствуетъ точка A_1 ряда u_1 , точекъ A_2 ряда u_2 , точекъ A_{n-1} ряда u_{n-1} отвѣчаетъ точка A_n ряда u_n , то мы должны условиться относить каждой точкѣ A ряда u , точку A_n ряда u_n .

²⁹⁾ Согласно предл. 3 § 15, 7, n точекъ прямой всегда могутъ быть перенумерованы такимъ образомъ, чтобы изъ двухъ классовъ, на которые двѣ послѣдовательныя точки (v и $v+1$) дѣлятъ прямую, одинъ вовсе не содержалъ ни одной изъ остальныхъ $n-2$ точекъ, а другой содержалъ бы, слѣдовательно, всѣ остальные: первый изъ двухъ классовъ и обозначается символомъ $[v, v+1]$; каждая

Теперь возникает вопрос, скольким элементам одного основного образа можно произвольно отнести элементы другого образа, чтобы установить проективное соответствие, в котором названные элементы отвечают друг другу. Двух элементов, во всяком случае, мало. В самом деле, если бы мы имели дело, скажем, с двумя рядами точек u и u' и отнесли бы двум точкам A, B одного ряда произвольные две точки A', B' другого ряда, то оба ряда можно было бы привести в перспективное соответствие с пучком, вершиной которого служила бы точка пересечения S прямых AA' и BB' ; этим было бы установлено даже перспективное соответствие между рядами u и u' , в котором точки A, A' и B, B' соответствовали бы друг другу. Но мы могли бы также сначала привести ряд u в перспективное соответствие с рядом u'' , отнеся точкам A и B совершенно произвольные две точки A'' и B'' ряда u'' ; далее, ряд u'' мы могли бы привести в перспективное соответствие с рядом u' так, чтобы точки A'', A' и B'', B' соответствовали друг другу. Этим будет установлено также соответствие между рядами u и u' ³⁰⁾; простое испытание показывает, однако, что соответствие между рядами u и u' мѣняется, когда мы ъмняем точки A'' и B'' ; иными словами, двух точек недостаточно для определения проективного соответствия. Мы посмотрим поэтому, что дадут нам три точки; для большей наглядности мы при этом сначала предположим, что ряд точек u приведен в проективное соответствие с самим собой таким образом, что из трех точек A, B, C каждая соответствует себѣ самой.

12. Можетъ быть, впрочемъ, будетъ яснѣ представлять себѣ дело такимъ образомъ, что на одной прямой два ряда точек u, u' приведены другъ съ другомъ в проективное соответствие такимъ образомъ, что три точки A, B, C первого ряда u совпадаютъ съ соответствующими точками A', B', C' второго ряда u' . Въ такомъ случаѣ точка D , которая совместно съ B дѣлит гармонически пару A, B , также должна со- точка прямой, отличная отъ этихъ u точекъ принадлежать одному и только одному изъ этихъ u классовъ: $[1, 2], [2, 3], [3, 4] \dots [n-1, n], [n, 1]$.


Пусть теперь $1', 2', 3' \dots n'$ будутъ точки, отвечающія этимъ u точкамъ при данномъ проективномъ соответствіи. Пусть, далѣе, $[1', 2'], [2', 3'] \dots [n', 1']$ будутъ u классовъ на которые эти послѣднія u точекъ, согласно тому же предл. 3 § 15, дѣлятъ свою прямую.

Пусть λ будетъ одна изъ первого ряда точекъ, отличная отъ v и $v+1$; она, такимъ образомъ, не принадлежитъ классу $[v, v+1]$; пусть x будетъ точка, принадлежащая этому классу; въ такомъ случаѣ точки x и λ раздѣляютъ пару точекъ $v, v+1$; слѣдовательно, точки x' и λ' раздѣляютъ пару $v', v'+1'$. Но точка λ' не принадлежитъ классу $[v', v'+1']$; слѣдовательно, точка x' ему принадлежитъ. Итакъ каждая точка класса $[v, v+1]$ переходитъ въ точку класса $[v', v'+1']$ и, какъ очень легко уже усмотрѣть, обратно.

³⁰⁾ См. примѣчаніе 28.

впасть съ соотвѣтствующей ей точкой D , ибо послѣдняя совмѣстно съ B должна дѣлить гармонически пару точекъ A' и B' .

Если два ряда точекъ, расположенные на одной прямой, или два пучка съ общей вершиной приведены въ проективное соотвѣтствіе другъ съ другомъ, то подъ двойнымъ элементомъ въ этомъ соотвѣтствіи разумѣютъ такой элементъ, который отвѣчаетъ самому себѣ; A, B, C, D представляютъ собой, такимъ образомъ, двойные элементы въ томъ соотвѣтствіи, о которомъ идетъ рѣчь. Двойными элементами являются также точка E , которая совмѣстно съ C дѣлится гармонически пару B, D , да же, точка F , которая совмѣстно съ D дѣлится гармонически точки C, E и т. д. Мы получаемъ, такимъ образомъ, неограниченный рядъ двойныхъ элементовъ, ибо можно безъ труда обнаружить, что всѣ точки A, B, C, D, E, F, \dots различны между собой. Но здѣсь это не имѣетъ значенія. Однако, естественно возникаетъ предположеніе, что въ этомъ соотвѣтствіи всѣ вообще точки оказываются двойными элементами, т. е. соотвѣтствуютъ каждая себѣ самой. Чтобы изслѣдовать этотъ вопросъ, мы допустимъ, что нѣкоторой точкѣ P ряда u отвѣчаетъ точка P' ряда u' , отличная отъ P . Согласно предложенію 1 § 15-го, пара точекъ P, P' либо раздѣляетъ двѣ изъ трехъ паръ $A, B; B, C; C, A$; либо не раздѣляетъ ни одной изъ нихъ.




Фиг. 58.

Примемъ сначала первое; пусть, такимъ образомъ, пара точекъ P, P' раздѣляетъ пары C, A и C, B (см. фиг. 58). Такъ какъ пара A, C , такимъ образомъ, дѣлитъ пару P, P' , то она должна еще раздѣлять либо пару P, B либо пару P', B (§ 15, 1). Но въ такомъ случаѣ, въ силу предложенія 8, точки A, C должны также раздѣлять соотвѣтственно пару P', B или P, B ; иными словами, точки A, C раздѣляютъ всѣ три пары, составленныя изъ точекъ P, P', B , что противорѣчитъ предложенію 1 § 15-го. Сдѣланное допущеніе, такимъ образомъ, невозможно.

Обращаясь теперь ко второму случаю, примемъ, какъ это всегда возможно сдѣлать, что точки A, B, C , помѣчены черезъ X, Y, Z такимъ образомъ, что точки P и P' принадлежатъ классу $[X, Y]$, не содержащему Z , а точка P' , лежащая внутри класса $[X, Y]$, падаетъ внутрь класса $[P, Y]$; классы, содержащіяся внутри $[X, Y]$, обозначаются однозначно, когда мы замыкаемъ опредѣляющія ихъ буквы въ прямоугольныя скобки (см. фиг. 59)²¹⁾.

²¹⁾ Какъ было выяснено въ § 15, 7, классъ $[X, Y]$ дѣлится однозначно на классы $[XP]$ и $[PY]$; точка P' принадлежитъ одному изъ этихъ классовъ; если бы

Внутри класса $[P, P']$ не лежить ни одна из точек X, Y, Z . Проективное соответствие рядов u и u' относить, согласно предложению 8, точкам некоторого класса ряда u и точки класса ряда u' , в частности, точкам класса $[X, Y]$, не содержащего точки Z , — точки класса $[X', Y']$, не содержащего точки Z' . Но так как точки X', Y', Z' совпадают с точками X, Y, Z , то это означает, что каждой точке класса $[X, Y]$ соответствует точка того же класса $[X, Y]$.



Фиг. 59.

Каждой точке класса $[P, Y]$ отвечает точка класса $[P', Y']$. При помощи этого сопряжения мы произведем, как в п. 7, Дедекиндово сечение U_1/U_2 класса $[P, Y]$; именно, мы отнесем к категории U_1 каждую точку Q класса $[P, Y]$, которая, вместе со всеми предшествующими ей точками класса $[P, Y]$, предшествует соответствующей ей точке Q' ; все остальные точки мы отнесем к категории U_2 . Категории U_1 принадлежат все точки класса $[P, P']$, включая и точку P , но, быть может, не включая точки P' ; категории U_2 , во всяком случае, принадлежит точка Y . Так как все условия сечения здесь выполнены, то, в силу аксиомы III, существует в классе $[P, Y]$ точка U , которая производит это сечение, так что категория U_1 сводится к классу $[P, U]$, а категория U_2 — к классу $[U, Y]$. Но точка U' , соответствующая точке U , не может лежать ни в классе $[P, U]$ ни в классе $[U, Y]$. Если бы она лежала в классе $[P, U]$, то точка U должна была бы ей предшествовать, что составляет противоречие; если бы она лежала в классе $[U, Y]$, то, в силу предложения 8, каждой точке класса $[U, Y]$ отвечала бы точка класса $[U', Y']$, а потому каждая точка класса $[U, U']$ предшествовала бы соответствующей ей точке и, следовательно, принадлежала бы категории U_1 , иначе говоря, классу $[P, U]$; мы вновь получаем противоречие³²⁾. Следовательно, точка U' совпадает с точкой U , т. е. U , как и точки X, Y, Z , есть

оказалось, что точка P' принадлежит классу $[PX]$, то мы обозначения X и Y при соответствующих трех классах транспонируем: тогда точка P' будет принадлежать классу $[PY]$ и однозначно раздѣлить его на классы $[PP']$ и $[P'Y]$. Вь смыслѣ обозначеній, принятых вь § 15, 7,

$$[X, Y] = [X, P] + [P, P'] + [P', Y].$$

³²⁾ Авторъ разбираетъ два случая: когда точка U' , соответствующая точке U , падаетъ внутрь класса $[P, U]$ и когда она падаетъ внутрь класса $[U, Y]$. Второй случай разобранъ вполне правильно, но нѣсколько словъ, которыми авторъ ограничивается относительно перваго случая, содержатъ погрѣшность. «Если бы точка U' принадлежала классу $[P, U]$ », говоритъ авторъ, «то точка U должна была бы ей предшествовать». Точка U должна была бы предшествовать точке U' , если бы она сама, т. е. точка U , принадлежала категории U_1 (т. е. классу $[P, U]$); изъ того же, что точка U' принадлежитъ классу $[P, U]$, такого вывода сдѣлать нельзя.

Первый случай необходимо разобрать такъ же, какъ и второй. Допустимъ, что точка U' падаетъ внутрь класса $[P, U]$; тогда она принадлежитъ необходимо

двойная точка въ проективномъ соотвѣтствіи рядовъ u и u' . Въ классѣ $[P, U]$ двойныхъ элементовъ вовсе нѣтъ, такъ какъ каждая точка этого класса предшествуетъ соотвѣтствующей точкѣ. Этотъ предварительный результатъ мы примѣнимъ прежде всего къ другому проективному соотвѣтствію рядовъ u' и u , которое относитъ обратно точкамъ Y', P', X' точки Y, P, X и, слѣдовательно, каждой точкѣ класса $[Y', X']$ опять-таки относитъ точку класса $[Y, X]$. Каждой точкѣ класса $[P', X']$ отвѣчаетъ точка класса $[P, X]$. Слѣдовательно, въ классѣ $[P, X]$ имѣется точка V' , которая совпадаетъ съ соотвѣтствующей ей точкой V и опредѣляетъ классъ $[P', V]$ внутри класса $[P', X']$, который не содержитъ ни одного двойного элемента въ соотвѣтствіи, связывающемъ рядъ u' съ рядомъ u . Но каждый двойной элементъ этого соотвѣтствія является также двойнымъ элементомъ въ соотвѣтствіи, связывающемъ рядъ u съ рядомъ u' ; вслѣдствіе этого мы приходимъ къ заключенію, что въ классѣ $[U, V]$, принадлежащемъ классу $[X, Y]$, нѣтъ двойныхъ элементовъ, между тѣмъ какъ крайнія точки класса U и V представляютъ собой двойные элементы. Но, съ другой стороны, точка W' , которая совмѣстно съ точкой Z дѣлитъ гармонически точки U, V , принадлежитъ классу $[U, V]$ и въ то же время совпадаетъ съ соотвѣтствующей ей точкой W'' ; ибо точки U, V и Z совпадаютъ съ соотвѣтствующими имъ точками. Такимъ образомъ, классъ $[U, V]$ все-таки имѣетъ двойной элементъ. Такъ какъ это находится въ противорѣчій съ полученнымъ выше выводомъ, то и второе наше допущеніе также оказывается неправильнымъ. Въ виду же того, что одинъ изъ двухъ рассмотрѣнныхъ случаевъ необходимо долженъ наступить, коль скоро точка P' не совпадаетъ съ точкой P , то точка P' совпадаетъ съ P . Чтобы это разсужденіе отъ противнаго дѣйствительно имѣло доказательную силу, нужно быть увѣреннымъ, что логическая область нашей геометріи, т. е. система аксіомъ I, II, III, не содержитъ внутренняго противорѣчія. Это можно было бы легко доказать при помощи арифметической геометріи § 12-го (п. 10), но мы, въ видахъ сбереженія мѣста, не станемъ этого дѣлать.

13. Предварительный результатъ этого изслѣдованія сводится къ слѣдующему: если на прямой установлено проективное соотвѣтствіе, которое относитъ три точки каждую самой себѣ, то оно относитъ и любую другую точку прямой самой себѣ.

классу $[P', U]$, ибо весь классъ $[P, Y]$ превращается въ $[P', Y]$, и ни одна его точка не переходитъ въ точку класса $[P, P]$. Съ другой стороны, каждая точка \bar{U} класса $[U', U]$ также принадлежитъ въ этомъ случаѣ категоріи U , а потому предшествуетъ соотвѣтствующей точкѣ U'' ; между тѣмъ весь классъ $[P, U]$ превращается въ $[P', U']$, а потому точка U' лежитъ внутри класса $[P', U']$ и, слѣдовательно, предшествуетъ точкѣ U .

Ясно, что справедливо также предложение, соответствующее этому в силу принципа двойственности: проективное соответствие, которое относит каждый из некоторых трех лучей пучка самому себе, отнести также и любой луч пучка самому себе; в самом деле, если мы разсечем пучек прямой линией, то этим самым на последней будет установлено проективное соответствие; три точки, представляющая собой сечение этой прямой с тремя лучами, которые в пучке отвечали самим себе, соответствуют каждая самой себе. Далее, отсюда можно также непосредственно усмотреть: если ряд точек сопряжен с пучком таким образом, что три точки лежат каждая на соответствующем луче, то каждая точка прямой лежит на соответствующем ей луче.³³⁾ Эти три предложения в совокупности образуют следующую основную теорему проективной геометрии:

Если установлено проективное соответствие между двумя основными образами первой степени, и при этом три элемента одного образа инцидентны каждому с соответствующим элементом другого образа, то и каждый элемент первого образа инцидентен с соответствующим элементом второго образа.

При этом мы разумеет, что две точки или две прямые инцидентны друг с другом, если они совпадают; точка же инцидентна с прямой, если она на последней лежит. Теперь мы утверждаем:

Если два ряда точек u и u' связаны проективным соответствием таким образом, что точка A пересечения прямых u и u' отвечает самой себе, то это соответствие представляет собой перспективу.

Если два пучка U и U' связаны проективным соответствием таким образом, что прямая, соединяющая их вершины, отвечает самой себе, то эти пучки перспективны друг с другом (или, если угодно, с одним и тем же рядом точек).


В самом деле, остановимся на первом предложении: пусть B и C будут две точки прямой u , отличная от A , а B' и C' — соответствующая им точки прямой u' . Пучек S , которому принадлежат прямые BB' и CC' , будет приведен в проективное соответствие с самим

³³⁾ Положим, что в некотором проективном соответствии пучка S с рядом и лучам a, b, c пучка соответствуют точки A, B, C пересечения этих лучей с прямой u . Допустим далее, что луч d пересекает u в точке D , но что лучу d в нашем соответствии отвечает не точка D прямой u , а другая точка D' . Если, однако, мы каждому лучу отнесем точку его пересечения с прямой u , то этим будет установлено перспективное, а следовательно, и проективное соответствие. Мы получим, следовательно, проективное соответствие, если отнесем точкам A, B, C, D точки A, B, C, D' ; это противоречит доказанному предложению.

собой, если мы каждому лучу, проходящему через некоторую точку прямой u , отнесем луч, проходящий через соответствующую точку прямой u' . Но в таком случае каждый из трех лучей SA, SB, SC отвечает самому себе, а следовательно, отвечает самому себе и каждый из остальных лучей³⁴⁾. Отсюда вытекает с тем же вытекающе, что перспективное соответствие двух рядов точек или двух пучков вполне определяется, если мы, помимо общего элемента, отнесем произвольным двум элементам одного образа произвольные же два элемента другого.

14. Этим предложением мы теперь воспользуемся, чтобы исследовать наиболее общее проективное соответствие двух основных образов первой степени.


Пусть A, B, C и A', B', C' будут три пары соответствующих точек двух проективных рядов u и u' ; пусть u'' будет вспомогательная прямая, проходящая через точку A (см. фиг. 60).



Фиг. 60.

На прямой AA' мы выберем произвольно точку S и отнесем перспективно прямую u' к пучку S , а последний, в свою

Пусть a, b, c и a', b', c' будут три пары соответствующих лучей двух проективных пучков U и U' ; пусть U'' будет вспомогательная точка, лежащая на прямой a (см. фиг. 61).



Фиг. 61.

Через точку пересечения прямых a и a' мы проведем произвольную прямую s и отнесем перспективно пучек U' к

³⁴⁾ Заметим, что обратные предложения справедливы по самому определению перспективы. Если, например, два ряда точек u и u' расположены (или связаны) перспективно, то это значит, что оба они расположены перспективно относительно одного и того же пучка S ; иначе говоря, прямая, соединяющая точку S с точкой A прямой u , встречает прямую u' в соответствующей точке A' ; поэтому точка пересечения обих прямых соответствует самой себе.

очередь свяжем перспективой съ прямой u'' ; этимъ будетъ установлено проективное соотвѣтствіе между прямой u'' (и прямой u' , а также) и прямой u , при чемъ точка пересѣченія A прямыхъ u и u'' отвѣчаетъ самой себѣ. Согласно заключительному предложению пункта 13, прямая u и u'' расположены также перспективно относительно пучка T , которому принадлежать прямыя BB'' и CC'' . Проективное соотвѣтствіе рядовъ u и u' осуществляется, такимъ образомъ, при помощи перспективныхъ соотвѣтствій, связывающихъ ряды u и u'' и ряды u'' и u' .

Каждой точкѣ X прямой u прямая TX опредѣляетъ соотвѣтствующую точку X'' на прямой u'' , а прямая SX'' устанавливаетъ на прямой u' , точку X' , которая въ этомъ проективномъ соотвѣтствіи отвѣчаетъ точкѣ X ³⁵).

Такимъ образомъ, проективное соотвѣтствіе между двумя основными образами первой ступени установлено, если тремъ элементамъ одного образа отнесены произвольные три элемента другого образа.

Если рѣчь идетъ о рядѣ точекъ и пучкѣ, то можно взять вспомогательный рядъ точекъ, расположенныхъ перспективно относительно данного пучка или же вспомогательный пучекъ связать перспективно съ даннымъ рядомъ точекъ и применить указанное сейчасъ построение; оно дастъ возможность найти элементъ, соотвѣтствующій любому данному элементу. Проективное соотвѣтствіе, не представляющее собой перспективы, какъ мы видимъ, можетъ быть всегда осуществлено посредствомъ небольшого числа перспективныхъ сопряженій.

³⁵) Здѣсь существенно важно то, что мы получаемъ построение, которое непосредственно даетъ точку X' , отвѣчающую любой точкѣ X , коль скоро даны точки A', B', C' , соотвѣтствующія тремъ точкамъ A, B, C . Этимъ и обуславливается слѣдующій выводъ.

ряду точекъ s , а этотъ послѣдній свяжемъ перспективой съ пучкомъ U'' ; этимъ будетъ установлено также проективное соотвѣтствіе между пучкомъ U'' и (пучкомъ U' , а также) пучкомъ U , при чемъ прямая a , соединяющая точки U' и U'' , отвѣчаетъ себѣ самой. Согласно заключительному предложению п. 13, пучки U и U'' расположены перспективно относительно ряда точекъ l , которому принадлежать точки пересѣченія прямыхъ b, b'' и c, c'' . Проективное соотвѣтствіе пучковъ U и U' осуществляется, такимъ образомъ, при посредствѣ перспективныхъ соотвѣтствій, связывающихъ пучки U и U'' и пучки U'' и U' .

Каждому лучу x пучка U точка пересѣченія прямыхъ l и x , будучи соединена съ точкой U'' , относитъ лучъ x'' въ пучкѣ U'' ; точка же пересѣченія прямыхъ s и x'' , будучи соединена съ точкой U' , опредѣляетъ лучъ x' , соотвѣтствующій лучу x въ пучкѣ U' .

15. Преодолевъ наиболѣе глубокія трудности проективной геометрии, мы можемъ перейти теперь къ осуществленію идеи, высказанной въ п. 10; къ тому же попутно мы уяснили себѣ, что мы не должны брать двухъ пучковъ, связанныхъ перспективно другъ съ другомъ. Сообразно этому мы установимъ, согласно п. 14, проективное соотвѣтствіе

между двумя пучками U и U' такъ, чтобы лучъ UU' не отвѣчалъ самому себѣ, и возьмемъ пересѣченіе каждаго луча x пучка U съ соотвѣтствующимъ лучемъ x' пучка U' . Совокупность Ξ точекъ пересѣченія называется рядомъ точекъ (кривой) второго порядка, такъ какъ на прямой g можетъ быть не больше двухъ точекъ ряда Ξ .

Чтобы доказать послѣднее утвержденіе въ первомъ изъ этихъ положеній, мы возьмемъ сѣченія прямой g съ двумя пучками U и U' ; мы получимъ, такимъ образомъ, на прямой g два проективныхъ ряда точекъ; согласно основной теоремѣ, на нашей прямой можетъ быть не болѣе двухъ точекъ, которыя въ этомъ соотвѣтствіи отвѣчаютъ каждая самой себѣ, иначе пучки U и U' , вопреки условію, были бы перспективны.

Въ отличіе отъ рядовъ точекъ и пучковъ второго порядка мы будемъ называть образы, которые мы до сихъ поръ именовали этими терминами, рядами перваго порядка и пучками перваго класса. Замѣтимъ уже здѣсь, что рядъ точекъ второго порядка представляетъ собой коническое сѣченіе, а пучекъ второго класса — совокупность его касательныхъ. Въ ближайшихъ параграфахъ мы займемся этими образами подробно.

§ 17. Важнѣйшія проективныя свойства коническихъ сѣченій.

1. Важнѣйшія проективныя свойства рядовъ II пор. (второго порядка) и пучковъ II кл. (второго класса) съ необычайной простотой вытекаютъ изъ закона ихъ образованія; а именно, по существу, они выводятся изъ двухъ фигуръ, соотвѣтствующихъ другъ другу по принципу двойственности. Чтобы отчетливо выдѣлить законъ двойственности, мы будемъ отмѣчать соотвѣтствующія точки и прямыя одними и тѣми же буквами, точки — прописными, а прямыя — строчными.


Два пучка S и T (фиг. 62) мы приведемъ въ проективное соотвѣтствіе, отнеся произвольнымъ тремъ лучамъ a' , b' , c' перваго

между двумя рядами точекъ u и u' такимъ образомъ, чтобы точка пересѣченія прямыхъ u и u' не соотвѣтствовала самой себѣ; затѣмъ каждую точку X прямой u соединимъ прямой линіей x съ точкой X' прямой u' . Совокупность лучей ξ называется пучкомъ второго класса, такъ какъ черезъ одну точку P можетъ проходить не больше двухъ лучей ξ .

Два ряда точекъ s и t (см. фиг. 63) мы приведемъ въ проективное соотвѣтствіе, отнеся произвольнымъ тремъ точкамъ A' , B' , C'


пучка произвольные же три луча a'' , b'' , c'' второго в качестве соответствующих имъ. Точки пересечения A , B и C трехъ паръ соответственныхъ лучей принадлежатъ въ такомъ случаѣ ряду II пор., образуемому пучками S , T . Черезъ точку C проведемъ двѣ прямыя φ и ψ и каждую точку пря-

вого ряда произвольныя три точки A'' , B'' , C'' второго в качестве соответствующихъ имъ. Прямая a , b , c , соединяющія три пары соответственныхъ точекъ, принадлежатъ въ такомъ случаѣ пучку II кл., образуемому двумя рядами s и t . На прямой c выберемъ произвольно двѣ точки Φ и Ψ



Фиг. 62.

мой φ отнесемъ, въ качестве соответствующей, тому лучу пучка S , который черезъ нее проходитъ; точно такъ же отнесемъ точки прямой ψ соответственно проходящимъ черезъ нихъ лучамъ пучка T . Лучамъ a' , b' , c' отвѣчаютъ, такимъ образомъ, на прямой φ точки A' , B' , C' , — лучамъ же a'' , b'' , c'' отвѣчаютъ на прямой ψ точки A'' , B'' , C'' . Такъ какъ рядъ q расположенъ перспективно относи-



Фиг. 63.

и каждый лучъ пучка Φ отнесемъ, въ качестве соответствующаго, той точкѣ ряда s , черезъ которую онъ проходитъ; точно такъ же каждый лучъ пучка Ψ отнесемъ той точкѣ прямой t , черезъ которую онъ проходитъ. Точкамъ A' , B' , C' отвѣчаютъ тогда въ пучкѣ Φ лучи a' , b' , c' , — точкамъ же A'' , B'' , C'' отвѣчаютъ въ пучкѣ Ψ лучи a'' , b'' , c'' . Такъ какъ пучекъ Φ расположенъ перспективно относительно ряда то-

тельно пучка S , а рядъ ψ — перспективно относительно T , такъ какъ, сверхъ того, пучки S и T связаны проективнымъ соответствіемъ, то и рядъ φ связанъ проективнымъ соответствіемъ съ рядомъ ψ . Но такъ какъ соответствующія точки C' и C'' рядовъ φ и ψ совпадаютъ въ одной точкѣ C , то ряды φ и ψ перспективны, т. е. прямыя $A'A''$, $B'B''$... и т. д., соединяющія соответственные точки, проходятъ черезъ одну точку Ω . Поэтому, чтобы найти лучъ x'' пучка T , соответствующій произвольному лучу x' пучка S , достаточно соединить точку пересѣченія X' прямыхъ x и φ съ точкой Ω , а затѣмъ точку пересѣченія X'' этой прямой съ прямою ψ соединить съ точкой T . Прямая x' и x'' пересѣкаются тогда въ некоторой точкѣ X , принадлежащей ряду Π пор. Аналогичнымъ образомъ мы можемъ получить лучъ x' , если данъ лучъ x'' . Этимъ путемъ мы можемъ построить сколько угодно точекъ X нашего ряда Π пор. Лучу TS или s'' пучка T отвѣчаетъ на прямой ψ точка S'' , въ которой лучъ пересѣкаетъ эту прямую; точкѣ же S'' отвѣчаетъ на прямой φ точка пересѣченія S' прямыхъ φ и $S''\Omega$; лучи s' и s'' пересѣкаются въ точкѣ S , которая, слѣдовательно, также принадлежитъ нашему ряду Π пор.; точно такъ же и точка T . Указанное выше построение точки X содержитъ также рѣшеніе задачи: найти на прямой x' , проходящей черезъ точку ряда S , вторую точку X этого ряда.

чекъ s , а пучекъ Ψ — перспективно относительно ряда t ; такъ какъ, сверхъ того, ряды s и t связаны проективнымъ соответствіемъ, то пучекъ Φ связанъ проективно съ пучкомъ Ψ . Но въ виду того что соответствующіе лучи c' и c'' пучковъ Φ и Ψ сливаются въ одну прямую c , пучки Φ и Ψ перспективны, т. е. точка пересѣченія соответственныхъ лучей a' и a'' , b' и b'' , ... лежатъ на одной прямой ω . Поэтому, чтобы найти точку X'' ряда t , соответствующую произвольной точкѣ X' ряда s , нужно разыскать точку пересѣченія прямой x' , соединяющей точки X' и Φ , съ прямою ω и соединить ее прямой x'' съ точкой Ψ ; эта прямая пересѣкаетъ прямую t въ искомой точкѣ X'' . Прямая, соединяющая точки X' , X'' , принадлежитъ тогда пучку Π кл. Аналогичнымъ образомъ мы можемъ получить точку X' , если дана точка X'' . Этимъ способомъ мы можемъ построить сколько угодно прямыхъ x нашего пучка Π кл. Точкѣ пересѣченія S'' прямыхъ t и s въ ряду t отвѣчаетъ въ пучкѣ Ψ лучъ s'' , соединяющій точку Ψ съ s'' ; лучу же s'' отвѣчаетъ въ пучкѣ Φ прямая s' , соединяющая точку пересѣченія прямыхъ s' и ω съ точкой Φ ; прямая, соединяющая точки S' и S'' , есть s , а потому послѣдняя также принадлежитъ пучку Π кл.; точно такъ же и прямая t . Указанное выше построение луча x содержитъ также рѣшеніе задачи — провести черезъ точку X' , лежащую на лучѣ s пучка, второй лучъ x , также при-

— Чтобы точка X' совпала с S , т. е. чтобы прямая x' , помимо S , не содержала ни одной точки нашего ряда, прямая x'' должна также проходить через точку S , иначе говоря, прямая x' должна совпасть с SS' , т. е. с s'^{36}). Такая прямая, как s' , которая имѣетъ съ рядомъ одну, а не двѣ общія точки, называется касательной къ ряду. Черезъ точку S проходитъ, слѣдовательно, только одна касательная s' . Точно такъ же l'' представляетъ собой касательную въ точкѣ T . Легко усмотрѣть, что прямая $T\Omega$ встрѣчаетъ прямую φ въ точкѣ U , принадлежащей ряду II пор.; точно такъ же и прямая $S\Omega$ встрѣчаетъ прямую ψ въ точкѣ V , принадлежащей ряду.

Точками A, B, C вполне определяется проективное соответствие пучковъ S, T ; лучамъ SA, SB и SC должны быть отнесены лучи TA, TB, TC . Рядъ второго порядка, такимъ образомъ, вполне определяется пятью точками S, T, A, B, C . Можетъ, однако, показаться, что при этомъ точки S и T должны быть выдѣлены въ виду ихъ особаго значенія по сравненію съ точками A, B, C ; но это не такъ. Въ самомъ дѣлѣ, φ и ψ суть произвольныя прямыя, проходящія черезъ точку C , а, слѣдовательно, U и V двѣ совершенно произвольныя точки нашего ряда II пор., которыя, если угодно, могутъ со-

надлежащій пучку.— Чтобы лучъ x совпадалъ съ s , т. е. чтобы черезъ точку X' не проходилъ ни одинъ лучъ пучка, помимо s , точка X'' также должна лежать на прямой s , т. е. точка X' должна совпадать съ точкой пересѣченія S' прямыхъ s и s' . Точка, черезъ которую проходитъ только одинъ лучъ пучка II кл., называется точкой касанія пучка. На прямой s лежить, такимъ образомъ, только одна точка касанія S' . Точно такъ же T'' представляетъ собой точку касанія на прямой l . Легко усмотрѣть, что прямая u , соединяющая точку $(t\omega)$ пересѣченія лучей t и ω съ точкой Φ , принадлежитъ нашему пучку II кл.; точно такъ же и прямая, соединяющая точку $s\omega$ съ точкой Ψ .

Лучами a, b, c вполне определяется проективное соответствие двухъ рядовъ s, t ; точкамъ sa, sb, sc должны быть отнесены точки ta, tb, tc . Пучекъ второго класса, такимъ образомъ, вполне определяется пятью лучами s, t, a, b, c . Можетъ, однако, показаться, что при этомъ лучи s и t должны быть выдѣлены по ихъ особенному значенію по сравненію съ лучами a, b, c ; но это не такъ. Въ самомъ дѣлѣ, Φ и Ψ суть произвольныя точки на прямой c , а, слѣдовательно, u и v суть два совершенно произвольныхъ луча въ нашемъ пучкѣ II кл., которые, если угодно, могутъ также совпадать съ лучами

³⁶⁾ Прямая x'' должна совпадать съ $T'S$, а послѣдняя, какъ мы видѣли, соответствуетъ лучу s' или SS' пучка S .

впадать также съ точками A и B . Если мы, сохраняя точки A, B, U, V, S, T будемъ замѣнять точку C другими точками C_1, C_2, \dots нашего ряда Π пор. ³⁷⁾, то точка X' на прямой x' будетъ занимать положенія X'_1, X'_2, \dots , точка X'' на прямой x'' будетъ занимать положенія X''_1, X''_2, \dots , при чемъ прямыя $X'X'', X'_1X''_1, X'_2X''_2 \dots$ будутъ по прежнему проходить черезъ точку Ω ³⁸⁾. Мы получаемъ, такимъ образомъ, два ряда точекъ на прямыхъ x' и x'' , именно, X', X'_1, X'_2, \dots и X'', X''_1, X''_2, \dots , расположенныхъ перспективно другъ относительно друга. Но пучки U и V расположены перспективно относительно этихъ двухъ рядовъ. Слѣдовательно, они связаны другъ съ другомъ проективнымъ соответствіемъ. Такъ какъ, далѣе, C_n есть точка пересѣченія соответственныхъ лучей UX'_n и VX''_n ($n = 0, 1, 2 \dots$), то нашъ рядъ Π пор. образуется также проективными пучками U, V .

a и b . Если мы, сохраняя лучи a, b, u, v, s и t , будемъ замѣнять лучъ c другими лучами $c_1, c_2, c_3 \dots$ нашего пучка Π кл., то лучъ x' будетъ занимать въ пучкѣ X' положенія $x'_1, x'_2 \dots$; лучъ x'' въ пучкѣ X'' будетъ занимать положенія $x''_1, x''_2 \dots$, при чемъ точки $x'x'', x'_1x''_1, x'_2x''_2 \dots$ будутъ по-прежнему лежать на прямой ω . Мы получаемъ, такимъ образомъ, два пучка лучей $x', x'_1, x'_2 \dots$ и $x'', x''_1, x''_2 \dots$, которые при посредствѣ прямой ω приведены другъ съ другомъ въ перспективное соответствіе; но ряды u и v , въ свою очередь, расположены перспективно относительно этихъ двухъ пучковъ; слѣдовательно, они связаны другъ съ другомъ проективнымъ соответствіемъ. Такъ какъ, далѣе, лучъ c_n соединяетъ точки uX'_n и vX''_n ($n = 0, 1, 2 \dots$), то нашъ пучекъ Π кл. образуется также проективными рядами u и v .

³⁷⁾ Сохраняя при этомъ точки U и V , такъ что, когда точка занимаетъ положеніе C_i , то прямыя q и ψ замѣняются прямыми C_iU и C_iV .

³⁸⁾ То, что доказано выше относительно точки Ω , можетъ быть сформулировано слѣдующимъ образомъ: Пусть S и T суть два проективныхъ (но не перспективныхъ) пучка, а C произвольная третья точка пучка, принадлежащая образуемому этими двумя пучками ряду Π пор.; черезъ точку C проведемъ произвольныя прямыя CU и CV , и на нихъ возьмемъ соответственно точки U и V , принадлежащія ряду Π пор. Если точка X есть любая другая точка ряда, X' и X'' суть точки пересѣченія прямыхъ CU и CV соответственно съ прямыми SX и TV , то прямая $X'X''$ проходитъ черезъ точку пересѣченія Ω прямыхъ SV и TU . Если точка C замѣняется точкой C_i , а точки U и V остаются, то вмѣсто точекъ X' и X'' мы получимъ точки X'_i и X''_i , а прямая $X'_iX''_i$ по прежнему будетъ проходить черезъ точку пересѣченія прямыхъ SV и TU .

2. Изъ множества фактовъ, вытекающихъ изъ этихъ положеній, мы приведемъ только важнѣйшія.

Предложеніе 1. Рядъ точекъ II пор. всегда содержитъ вершины пучковъ, которыми онъ образованъ.

Предложеніе 2. Рядъ точекъ II пор. проектируется изъ любыхъ двухъ принадлежащихъ ему точекъ проективными пучками.

Одинъ и тотъ же рядъ II пор. можетъ, следовательно, быть образованъ проективно ∞^2 способами; точно такъ же и пучекъ II кл.

Предложеніе 3. Рядъ II пор. опредѣляется пятью точками, или четырьмя точками и касательной въ одной изъ нихъ, или тремя точками и касательными въ двухъ изъ нихъ.

Первый случай иллюстрируется элементами S, T, A, B, C ; второй— S, s, T, A, C гдѣ лучи s', a', c' пучка S соответствуютъ лучамъ s'', a'', c'' пучка T ; третій случай иллюстрируется элементами S, s', T, t'', C ; здѣсь лучи s', t', c' пучка S соответствуютъ лучамъ s'', t'', c'' пучка T ²⁹⁾.

Въ виду предложенія 2, построеніе касательныхъ и точекъ касанія, указанное въ п. 1, приобретаетъ большее значеніе: такъ, оно оказывается примѣнимымъ ко всякой точкѣ въ рядѣ II пор., а также ко всякому лучу въ пучкѣ II кл.

Такимъ образомъ имѣемъ:

Предложеніе 4. Рядъ II пор. имѣетъ касательную въ каждой своей точкѣ.

Предложеніе 1'. Пучекъ II кл. всегда содержитъ прямая, представляющія собой носительницы образующихъ ихъ рядовъ точекъ.

Предложеніе 2'. Пучекъ второго класса даетъ въ пересѣченіи съ любыми двумя принадлежащими ему пучками проективные ряды.

Предложеніе 3'. Пучекъ II кл. опредѣляется пятью лучами, или четырьмя лучами и точкой касанія одного изъ нихъ, или тремя лучами и точками касанія двухъ изъ нихъ.

Первый случай иллюстрируется элементами s, t, a, b, c , второй— s, S, t, b, c , при чемъ точки S', A', C' ряда s соответствуютъ точкамъ S'', A'', C'' ряда t ; наконецъ, третій случай иллюстрируется элементами s, S', t, T'', c ; здѣсь точки S', T', C' ряда s отвѣчаютъ точкамъ S'', T'', C'' ряда t .

Предложеніе 4'. Въ пучкѣ II кл. каждый лучъ имѣетъ точку касанія.

²⁹⁾ Для опредѣленія ряда II пор. должны быть даны образующіе его проективные пучки; а для этого достаточно знать три луча одного пучка и соответствующіе имъ лучи второго.


Но несомненно наиболее важный результат представляет собой: Предложение Паскаля *) и предложение Бриансона **)

Во всяком обыкновенном шестиугольнике, вершины которого принадлежат ряду II пор., три пары противоположных сторон пересекаются в трех точках, лежащих на одной прямой w . Это непосредственно видимъ на шестиугольникѣ $SXTUCV$:


Сторона: SX, XT, TU
 Противоп. сторона: UC, CV, VS
 Точка пересѣченія: X', X'', Ω

Во всяком обыкновенномъ шестисторонникѣ, стороны котораго принадлежатъ пучку II кл., прямая, соединяющая попарно противоположныя вершины, проходитъ черезъ одну и ту же точку W ; это непосредственно видимъ на шестисторонникѣ $sxtucv$:

Вершина: sx, xt, tu
 Противоп. верш.: uc, cv, vs
 Соедин. прямая: x', x'', ω



Фиг. 64.



Фиг. 65.

эти три точки действительно лежатъ на одной прямой w ; на фиг. 64 шестиугольникъ имѣетъ другое расположение; но здѣсь сохранены обозначенія фиг. 62.


въ самомъ дѣлѣ, эти три луча проходятъ черезъ одну точку. На фиг. 65 шестисторонникъ имѣетъ другое расположение; но здѣсь сохранены обозначенія фиг. 63.

*) Въ книгѣ Реяе (Th. Reye, „Die Geometrie der Lage“, 3 Aufl., 1 Abt., S. 77) имѣется указаніе, что Паскаль (Pascal) открылъ предположеніе, названное его именемъ, когда ему было 16 лѣтъ (въ 1639 г.). Брианшонъ (Brianchon) опубликовалъ открытое имъ предположеніе въ 1806 г.

Интересно рассмотреть еще тот случай, когда пучки S и T имеют перспективное расположение, так что, например, точка C лежит на прямой ST (см. фиг. 66)⁴⁰). Они образуют тогда прямую, проходящую через точки U' и V' и содержащую точку X' ⁴¹). Мы, таким образом, получаем:

Частный случай предложения Паскаля.

Если последовательные вершины шестиугольника $SXTUCI'$ попеременно расположены на двух прямых p и q , то три пары противоположных сторон пересекаются в трех точках, лежащих на одной прямой w (фиг. 66).



Фиг. 66.

Обращение предложения Паскаля.


Если три пары противоположных сторон плоского шестиугольника $SXTUCI'$ пересекаются в трех точках X' , X'' , X''' , лежащих на одной прямой w , то шесть его вершин либо принадлежат ряду II пор., либо расположены по три на двух прямых p и q .

⁴⁰ Если точка C лежит на прямой ST , то лучи c' и c'' оба совпадают с прямой ST ; иными словами, прямая, соединяющая вершины соответствующих пучков, отвѣчает самой себѣ.

⁴¹ Ибо точки пересѣчения соответственных лучей двух перспективных пучков лежат на одной прямой.

Частный случай предложения Бриансона.

Если последовательные стороны шестисторонника $sxtucv$ попеременно проходят через две точки P и Q , то прямая, соединяющая три пары противоположных вершин, проходит через одну точку W (фиг. 67).



Фиг. 67.

Обращение предложения Бриансона.

Если три прямые, попарно соединяющие противоположные вершины плоского шестисторонника $sxtucv$, проходят через одну точку W , то шесть его сторон либо принадлежат пучку II кл., либо проходят по три через две точки P и Q .

Въ самомъ дѣлѣ, если мы сохранимъ обозначенія, принятыя на фигурахъ 64—67, то при условіяхъ перваго предложенія ряды φ и ψ будутъ перспективны, если точкамъ U', C', G' отнесемъ точки U'', C'', G'' ; эта перспектива воспроизводится пучкомъ Ω . Слѣдовательно, X' и X'' также представляютъ собой соответствующія точки. Вершины шестиугольника представляютъ собой, поэтому, точки пересѣченія соответствующихъ лучей проективныхъ пучковъ S и T , т. е. принадлежать ряду II пор., если только пучки лучей не перспективны ⁴²⁾. Въ этомъ исключительномъ случаѣ точка C лежитъ на прямой TS : но тогда и точки U, X, V принадлежатъ одной прямой (§ 16. 10). Въ виду принципа двойственности этимъ доказано и второе предложеніе. Оба предложенія могутъ служить для того, чтобы построить рядъ II пор. или пучекъ II кл. соответственно по пяти точкамъ или по пяти лучамъ.

3. Какъ мы видѣли въ п. 1., общему лучу ST двухъ проективныхъ пучковъ S и T , образующихъ рядъ II порядка κ , соответствуетъ какъ въ одномъ, такъ и въ другомъ пучкѣ касательная ряда κ .


Чтобы использовать этотъ фактъ, мы должны еще разъ обратиться къ доказательству предложенія Паскаля (см. фиг. 62 или 64). Проективные пучки S и T опредѣляютъ на прямыхъ φ и ψ два перспективныхъ ряда; эта перспектива осуществляется пучкомъ Ω . Но проективное соотвѣтствіе пучковъ S и T вполне опредѣляется, если мы отнесемъ другъ другу лучи SU и TU , SV и TV , SC и TC . Это остается въ силѣ и въ томъ случаѣ, если точка U сольется съ точкой T , а подъ лучемъ TU , въ виду приведеннаго выше предложенія о касательныхъ, будемъ разумѣть касательную въ точкѣ T , такъ какъ этой послѣдней, дѣйствительно, отвѣчаетъ лучъ ST , тождественный при этихъ условіяхъ съ SU . вмѣстѣ съ тѣмъ можно принять, что точка V совпадаетъ съ S , при чемъ подъ прямой SV нужно разумѣть касательную въ точкѣ S . Мы получаемъ, такимъ образомъ, предложенія 5. и 6. *)

Предложеніе 5. Предло- | Предложеніе 5'. Предло-
женіе Паскаля остается въ | женіе Брианшона остается въ

⁴²⁾ Пучекъ Ω , какъ указано въ текстѣ, осуществляетъ перспективное соотвѣтствіе рядовъ φ и ψ ; въ этомъ соотвѣтствіи точкамъ U', C', V', X' ряда φ отвѣчаютъ точки U'', C'', V'', X'' ряда ψ . Если мы теперь каждому лучу пучка T , проходящему черезъ нѣкоторую точку ряда φ , отнесемъ тотъ лучъ пучка T , который проходитъ черезъ соответствующую точку ряда ψ , то между пучками будетъ установлено проективное соотвѣтствіе. вмѣстѣ съ тѣмъ лучамъ SU', SC', SV', SX' будутъ отвѣчать лучи TU'', TC'', TV'', TX'' , которые въ пересѣченіи съ первыми послѣдовательно даютъ остальные вершины U, C, V, X шестиугольника.

*) Мы формулируемъ предложеніе о пятиугольникѣ и пятисторонникѣ въ томъ видѣ, въ какомъ его обыкновенно выводятъ, какъ предѣльный случай предложенія Паскаля и Брианшона.

силѣ, если двѣ послѣдовательныя вершины сливаются въ одну точку, а соединяющая ихъ прямая замѣняется касательной въ этой точкѣ (см. фиг. 68). Иными словами, если



Фиг. 68.

даны пять точекъ ряда II пор., и мы желаемъ опредѣлить касательную въ одной изъ нихъ, то слѣдуетъ обозначить эту точку цифрами 5 и 6, а четыре остальные точки въ той или другой послѣдовательности—цифрами 1, 2, 3, 4; затѣмъ нужно построить прямую Паскаля p по схемѣ:

Сторона: 12, 23, 34


Противоп. стор.: 45, 56, 61

Точка пересѣч.: X, Y, Z

Точки X и Z опредѣляютъ прямую p , которая въ пересѣченіи съ прямою 23 даетъ точку Y; прямая Y5 и есть искомая касательная.

Предложеніе 6. Если вершины полного четырехугольника принадлежатъ ряду II пор., то любыя двѣ дополни-

силѣ, если двѣ послѣдовательныя стороны сливаются въ одну прямую, а точка ихъ пересѣченія замѣняется точкой касанія этой прямой (см. фиг. 69). Иными словами, если дачы пять



Фиг. 69.

лучей пучка II кл., и мы желаемъ опредѣлить точку касанія одного изъ нихъ, то слѣдуетъ обозначить этотъ лучъ цифрами 5, 6, а четыре остальные въ той или другой послѣдовательности — цифрами 1, 2, 3, 4; затѣмъ нужно построить точку Бриансона P по схемѣ:

Вершина: 12, 23, 34

Противоп. верш.: 45, 56, 61


Соединяющ. прямая: x , y , z .

Пересѣченіемъ прямыхъ x и z опредѣляется точка P ; черезъ точки P и 23 проводимъ прямую y ; тогда $y5$ есть точка касанія.

Предложеніе 6'. Если стороны полного четырехсторонника принадлежатъ пучку II кл. то любыя двѣ дополни-

тельные вершины лежат на одной прямой съ точкой пересѣченія касательныхъ въ двухъ противоположныхъ вершинахъ.


Сюда относится фиг. 70, въ которой сохранены обозначенія фигуры 68; на прямой p , согласно нашему предположенію, лежитъ также точка пересѣченія касательныхъ въ двухъ другихъ противоположныхъ вершинахъ;



Фиг. 70.

тельные стороны и прямая, соединяющая точки касанія двухъ противоположныхъ сторонъ, проходить черезъ одну точку.

Сюда относится фиг. 71, въ которой сохранены обозначенія фигуры 69; черезъ точку P , согласно нашему предположенію, проходитъ прямая, соединяющая точки касанія („хорда соприкосновенія“) двухъ другихъ противоположныхъ сторонъ;



Фиг. 71.

это обнаруживается непосредственно, если замѣнимъ обозначенія 1; 2, 3; 4; 5, 6 черезъ 1, 2; 3; 4, 5; 6.

4. Четыре точки A, B, C, D ряда II пор. опредѣляютъ въ общемъ три четырехугольника $ABCD, ACBD, ADBC$, къ каждому изъ которыхъ можно примѣнить предположеніе 6; аналогично обстоитъ дѣло и съ четырьмя лучами a, b, c, d пучка II кл. Отсюда вытекаютъ два особенно плодотворныхъ предположенія.


Предположеніе 7. Четыре точки A, B, C, D ряда II пор. опредѣляютъ полный четырехугольникъ, касательныя же a, b, c, d въ этихъ точкахъ образуютъ полный четырехсторонникъ; дополнительные стороны четырехсторонника x, y, z и дополнительные вершины X, Y, Z четырехугольника образуютъ

Предположеніе 7'. Четыре луча a, b, c, d пучка II кл. опредѣляютъ полный четырехсторонникъ, ихъ точки соприкосновенія опредѣляютъ полный четырехугольникъ; дополнительные вершины четырехугольника X, Y, Z и дополнительные стороны x, y, z четырехсторонника образуютъ

одинъ и тотъ же треуголь-
никъ⁴²⁾.

одинъ и тотъ же треуголь-
никъ.

Представимъ себѣ, что рядъ II пор. заданъ точками B, C, D и касательными b, d , въ точкахъ B и D ; чтобы построить рядъ, достаточно отнести лучамъ b, BC, BD пучка B лучи DB, DC, d пучка D ; этимъ рядъ вполне определенъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ определена и касательная c въ точкѣ C . Пусть теперь A будетъ произвольная точка ряда. Чтобы найти касательную a , надо, согласно предложению 7, точку пересѣченія X прямыхъ AC и BD спроектировать изъ точки bc на прямую d и изъ точки cd на прямую b , а затѣмъ соединить полученныя точки da и ab (см. фиг. 72). Если мы вмѣсто A возьмемъ другія точки ряда $A_1, A_2, A_3 \dots$ ⁴³⁾



Фиг. 72.

то лучи $CA, CA_1, CA_2, CA_3, \dots$ определятъ на прямой BD рядъ точекъ X, X_1, X_2, X_3, \dots , перспективный съ пучкомъ C ; точки этого ряда проектируются изъ точекъ bc и cd двумя проективными пучками. Последніе, въ свою очередь, определяють на прямыхъ d и b два взаимно проектив-

⁴²⁾ На прямой XU , соединяющей двѣ дополнителныя вершины X и U четырехугольника, согласно предыдущему предложению, лежатъ точки пересѣченія касательныхъ a и b, c и d ; иначе говоря, дополнителная сторона z полного четырехсторонника совпадаетъ съ прямой XU ; точно такъ же дополнителныя стороны четырехсторонника u и x совпадаютъ съ прямыми XZ и YZ .

⁴³⁾ См. подробный рисунокъ 73, на которомъ для облегченія самаго черченія рядъ II пор. изображенъ окружностью, какъ это, впрочемъ, дѣлалось уже и раньше въ другихъ чертежахъ.

ныхъ ряда, при чемъ касательныя a, a_1, a_2, a_3, \dots въ точкахъ A, A_1, A_2, A_3, \dots постоянно соединяють двѣ соответственныя точки этихъ рядовъ. Примѣняя еще сюда законъ двойственности, мы получаемъ:

Предложеніе 8. Касательныя ряда II пор. образуютъ пучекъ II кл.

Предложенія 8'. Точки касанія пучка II кл. образуютъ рядъ II пор.


Теперь ясно, почему мы имѣли возможность демонстрировать предложенія 7 и 7' одной и той же фигурой. Нужно обратить вниманіе на построения рядовъ II пор. по точкамъ и касательнымъ, вытекающія изъ фиг. 73. Предыдущія соображенія наводятъ также на мысль установить проективное соответствіе между двумя рядами II пор. Съ этой цѣлью мы введемъ слѣдующее опредѣленіе:

Четыре точки ряда II пор. называются гармоническими, если онѣ изъ какой-либо точки ряда проектируются четырьмя гармоническими лучами; согласно предложенію 2, они въ такомъ случаѣ проектируются и изъ любой другой точки ряда гармоническими лучами.

Четыре луча въ пучкѣ II кл. называются гармоническими, если какой-либо лучъ пучка пересѣкаетъ ихъ въ четырехъ гармоническихъ точкахъ; согласно предложенію 2', любой другой лучъ пучка въ этомъ случаѣ также пересѣкаетъ ихъ въ четырехъ гармоническихъ точкахъ.

Помощью этихъ предложеній можно безъ труда распространить на точки и лучи образовъ второго порядка свойства расположенія, устанавливаемая аксіомами группы II.

Если теперь будемъ вообще называть проективнымъ соответствіемъ любыхъ двухъ образовъ такое сопряженіе ихъ, при которомъ четыремъ гармоническимъ элементамъ всегда отвѣчаютъ четыре гармоническихъ же элемента, то мы по фиг. 73 можемъ установить слѣдующее: четыремъ гармоническимъ точкамъ A, A_1, A_2, A_3 , отвѣчаютъ четыре гармоническихъ луча, соединяющихъ ихъ съ точкою C ; эти лучи опредѣляютъ на прямой DB четыре



Фиг. 73

гармоническія точки X, X_1, X_2, X_3 ; этимъ послѣднимъ, въ свою очередь, отвѣчаютъ на b и d по четыре гармоническихъ точки на каждой ab, a_1b, a_2b, a_3b и da, da_1, da_2, da_3 , какъ проекціи изъ точекъ cd и bc ; нако-

нецъ, послѣднимъ отвѣчаютъ четыре гармоническія касательныя a, a_1, a_2, a_3 . Такимъ образомъ, точки ряда второго порядка оказываются проективно сопряженными съ лучами пучка касательныхъ II кл. Вмѣстѣ съ тѣмъ мы получаемъ:

Предложеніе 9. Точки ряда II пор. связаны проективнымъ соотвѣтствіемъ съ касательнымъ пучкомъ II кл., если каждой точкѣ отнесена, въ качествѣ соответствующаго луча, касательная въ этой точкѣ.

5. Исходя изъ фиг. 72 и относящихся къ ней соображеній, можно также съ необычайной простотой развить теорію поляръ рядовъ II пор. и пучковъ II кл. Мы будемъ при этомъ придерживаться Рее *)), книгой котораго мы и вообще руководились въ настоящемъ изложеніи. Мы утверждаемъ, прежде всего, что въ ряду II порядка x и въ соответствующемъ пучкѣ касательныхъ точка X и прямая x , а также Y и y, Z и z другъ друга вполне опредѣляютъ.

Въ самомъ дѣлѣ, по своему положенію

относительно совершеннаго четырехугольника, опредѣляемаго точками A, B, C, D , точки пересѣченія U' и U'' прямой x съ прямыми BD и AC раздѣляются гармонически точкой X и точками ряда x ;

этимъ мы хотѣли выразить, что прямыя $U'X$ и $U''X$ имѣютъ каждая по двѣ общія точки съ рядомъ x , которыя дѣлятъ гармонически соответственно пары X и U' , X и U'' .

Съ другой стороны, прямая x уже вполне опредѣляется точками A, C ряда x , которая лежать на одной прямой съ точкой X , ибо это есть прямая, соединяющая точку пересѣченія ac касательныхъ въ A и C съ точкой U'' , которая совмѣстно съ X дѣлитъ гармонически пару A, C . Мы можемъ поэтому смотрѣть на BD , какъ на совершенно произ-

относительно совершеннаго четырехсторонника, опредѣляемаго лучами a, b, c, d , лучи u' и u'' , соединяющіе точку X съ точками bd и ac , раздѣляются гармонически лучомъ x и лучами пучка x ;

черезъ точки $u'x$, или bd , и $u''x$ или ac проходятъ двѣ касательныя ряда x , которыя раздѣляютъ гармонически соответственно пары x и u' , x и u'' .

Съ другой стороны, точка X уже вполне опредѣляется прямыми a и c , пересѣкающимися на прямой x , ибо это есть точка пересѣченія прямой AC , соединяющей точки касанія лучей a и c съ лучемъ u'' , который совмѣстно съ x дѣлитъ гармонически пару лучей a, c . Мы можемъ поэтому смотрѣть на bd , какъ на совершенно произвольную точку на прямой x ,

*) Th. Reye „Geometrie der Lage“, I Abt., achter Vortrag.

вольную прямую, проходящую через точку X , которая имѣетъ съ рядомъ κ двѣ общія точки B и D ; вмѣстѣ съ тѣмъ мы только-что доказали, что какъ точка U' , которая совмѣстно съ X дѣлитъ гармонически пару B, D , такъ и точка пересѣченія bd касательныхъ въ точкахъ B и D , лежатъ на прямой x .

Этимъ доказано:

Предложеніе 10. Рядъ второго порядка κ относить каждой точкѣ X , лежащей въ плоскости ряда, но ему не принадлежащей, прямую x , „полюсу этой точки“, обладающую слѣдующими свойствами:

- a) каждая прямая, проходящая через точку X и имѣющая съ рядомъ κ двѣ общія точки, пересѣкаетъ прямую x въ точкѣ, которая совмѣстно съ X дѣлитъ гармонически упомянутую пару точекъ ряда;
- b) если точки касанія двухъ касательныхъ ряда κ лежатъ на одной прямой съ точкой X , то эти касательныя пересѣкаются на прямой x ;
- c) если изъ точки X проходятъ двѣ касательныя къ ряду κ , то точки ихъ соприкосновенія лежатъ на прямой x .
- d) Если пучекъ второго класса составленъ изъ касательныхъ ряда второго порядка, то каждая точка служитъ по-


изъ которой выходятъ двѣ касательныя b и d къ ряду κ : вмѣстѣ съ тѣмъ мы только-что установили, что какъ лучъ u' , который совмѣстно съ x дѣлитъ гармонически пару лучей b, d , такъ и прямая, соединяющая точки касанія лучей b и d , проходитъ черезъ точку X .

Предложеніе 10'. Пучекъ второго класса κ относить каждому лучу, расположенному въ его плоскости, но ему не принадлежащему, точку X , „полюсу“ этого луча x , обладающую слѣдующими свойствами:

- a) каждая точка прямой x , изъ которой выходятъ двѣ касательныя къ ряду κ , опредѣляетъ съ точкой X прямую, которая совмѣстно съ x дѣлитъ гармонически упомянутую пару касательныхъ;
- b) если касательныя двухъ точекъ соприкосновенія пучка пересѣкаются на прямой x , то прямая, соединяющая точки касанія, проходитъ черезъ точку X ;
- c) если на прямой x лежатъ точки соприкосновенія двухъ лучей пучка κ , то ихъ касательныя проходятъ черезъ точку X .

люсомъ своей полярѣ, каждая прямая—полярѣй своего полюса ⁴⁴⁾).

Утвержденія с) еще нуждаются въ доказательствѣ. На фигурѣ 72 черезъ точку X не проходятъ касательныя къ ряду κ , но изъ точекъ Y и Z проходятъ по двѣ касательныя. Но такъ какъ двѣ пары точекъ Y, Y' и Y, Y'' раздѣляются рядомъ κ гармонически, то y есть полярѣй точки Y ; точно такъ же z есть полярѣй точки Z ; такимъ образомъ, въ треугольникѣ XYZ



Фиг. 72.

каждая сторона служитъ полярѣй противоположащей вершины; онъ называется поэтому „полярнымъ треугольникѣмъ“, или „полярнымъ трехсторонникомъ“. Если бы теперь прямая ZZ'' , соединяющая точку Z съ точкой пересѣченія Z'' прямой ζ и ряда κ , имѣла бы съ рядомъ κ еще одну общую точку P , то точка, которая совмѣстно съ Z дѣлила бы гармонически пару Z'', P , должна была бы также лежать на прямой ζ ; но въ такомъ случаѣ она должна была бы совпасть съ точкой Z'' , что возможно

⁴⁴⁾ Прямая ζ есть полярѣй точки Z ; она соединяетъ согласно предложенію с), доказательство котораго помѣщено въ текстѣ ниже, точки касанія Z' и Z'' касательныхъ, выходящихъ изъ точки Z ; мы можемъ поэтому смотрѣть на точку Z , какъ на точку пересѣченія двухъ касательныхъ пучка, а на ζ , какъ на прямую, соединяющую точки касанія; поэтому Z есть полюсъ прямой ζ .

только въ томъ случаѣ, когда точка P также совпадаетъ съ Z^n . Поэтому касательныя въ точкахъ Z' и Z'' проходятъ черезъ точку $Z^{45)}$.

Предложеніями 10 и 10' можно многообразно воспользоваться для построенія поляры по данному полюсу и полюса по данной полярѣ; при этомъ рядъ κ долженъ быть только заданъ достаточнымъ числомъ точекъ или касательныхъ, т. е., слѣдовательно, либо пятью точками, либо пятью касательными, либо четырьмя точками и касательной въ одной изъ нихъ, либо четырьмя касательными и точкой касанія одной изъ нихъ, либо тремя точками и касательными въ двухъ изъ нихъ, либо тремя касательными и точками касанія двухъ изъ нихъ. Во всѣхъ этихъ случаяхъ проективное построеніе ряда κ непосредственно ясно, а полюсы и поляры могутъ быть найдены при помощи одной только линейки.

6. Сохраняя на фигурѣ 72 точки A, B, Z , а вмѣстѣ съ ними и прямая a, b, ζ , мы предположимъ, что точка X занимаетъ на прямой ζ различныя положенія X_1, X_2, X_3, \dots *). Такъ какъ точки C и D въ ряду κ опредѣляются прямыми AX и BX , то вмѣстѣ съ измѣненіями положенія точки X касательныя c и d въ точкахъ C и D будутъ занимать другія положенія c_1, c_2, c_3, \dots и d_1, d_2, d_3, \dots . Мы обратимъ теперь вниманіе на положенія луча c ; согласно предложенію 2', лучи c, c_1, c_2, c_3, \dots пересекаютъ прямая a и b въ двухъ взаимно проективныхъ рядахъ точекъ $ac, ac_1, ac_2, ac_3, \dots$ и $bc, bc_1, bc_2, bc_3, \dots$. Эти ряды проектируются изъ точки Z двумя проективными пучками x, x_1, x_2, x_3, \dots и y, y_1, y_2, y_3, \dots . Но послѣдній пучекъ расположенъ перспективно относительно ряда X, X_1, X_2, X_3, \dots ; слѣдовательно, этотъ рядъ связанъ проективно съ пучкомъ x, x_1, x_2, x_3, \dots . Если точка X_n не принадлежитъ ряду κ , то x_n есть поляра этой точки; если прямая x_n не касается ряда κ , то точка X_n есть ея полюсъ; но если точка X совпадаетъ съ одной изъ точекъ Z' или Z'' пересѣченія прямой ζ и ряда κ , то точки B и D , а вмѣстѣ съ ними и Y также совпадаютъ съ тою же точкой; вмѣстѣ съ тѣмъ прямая x становится касательной, ибо, какъ мы видѣли, ZZ' и ZZ'' суть касательныя къ ряду κ изъ точки Z . Если мы поэтому захотимъ распространить понятіе о полярѣ и на такія точки, которыя принадлежатъ ряду κ , то мы должны будемъ установить такое опредѣленіе: поляра точки ряда Π пор. есть касательная въ этой точкѣ, полюсъ касательной есть ея точка соприкосновенія. Опираясь на это

*) Иначе: если прямая, проходящая черезъ точку X , встрѣчаетъ рядъ κ въ точкахъ A и C , то она встрѣчаетъ прямую x въ точкѣ U , которая совмѣстно съ X дѣлитъ гармонически точки A и C ; если поэтому точки A и C сливаются въ одну точку, то съ послѣдней сливается и точка U ; т. е. прямая x проходитъ черезъ точку касанія каждой касательной, выходящей изъ точки X .

*) Точки эти на фиг. 72 для упрощенія чертежа опущены.

опредѣленіе, мы можемъ уже высказать безъ ограниченія слѣдующее предложеніе:

Предложеніе 11. Поляры точекъ ряда перваго порядка ζ образуютъ пучекъ перваго класса Z , который связанъ проективно съ этимъ рядомъ, и вершина котораго служить полюсомъ прямой ζ , и обратно.


Неразобранный еще случай, когда прямая ζ касается ряда κ , очень легко исчерпать. — На этомъ предложеніи можно основать новое доказательство закона двойственности; это доказательство, быть можетъ, не имѣетъ того основного характера, но зато оно относитъ каждой плоской фигурѣ вполне опредѣленную двойственную ей фигуру. Для этой цѣли достаточно построить полюру каждой точки этой фигуры и полюсь каждой ея прямой относительно нѣкотораго ряда II пор. Тогда четыремъ гармоническимъ точкамъ прямой соответствуютъ четыре гармоническихъ луча пучка ⁴⁶⁾; двумъ парамъ точекъ, раздѣляющимъ другъ друга, отвѣчаютъ двѣ пары лучей пучка, также раздѣляющія другъ друга и т. д. Построеніе и изслѣдованіе фигуры, полярной относительно данной, очень поучительно. Для упражненія возьмемъ въ плоскости ряда втораго порядка κ еще другой рядъ втораго порядка λ и отнесемъ каждой точкѣ послѣдняго P ея полюру p относительно ряда κ . Такимъ образомъ мы получимъ безчисленное множество лучей p . Что можно о нихъ сказать? Если мы представимъ себѣ рядъ λ образованнымъ при помощи двухъ проективныхъ пучковъ S и T , то имъ отвѣчаютъ два проективныхъ ряда точекъ s и t , при чемъ прямая p соединяетъ попарно соответствующія другъ другу точки. Лучи p образуютъ, слѣдовательно, пучекъ втораго класса, огибающій нѣкоторый рядъ точекъ втораго порядка.

7. Мы видимъ изъ этого примѣра и изъ всего предыдущаго изслѣдованія, какъ необыкновенно подвижна современная синтетическая геометрія, какъ легко она разматывается въ прогивоположность древней геометрії, съ построеніемъ которой мы, по существу, знакомимся уже въ школѣ. Наиболее существенная разница между обѣими геометріями, очевидно, заключается въ томъ, что въ геометрії древнихъ вполне господствуетъ понятіе объ измѣреніи, между тѣмъ какъ новая геометрія основывается, главнымъ образомъ, на понятіяхъ о расположеніи и инцидентности; поэтому ея и называютъ геометріей положенія. Метрическія свойства могутъ быть познаваемы только путемъ сравненія въ силу законовъ измѣренія; поэтому они гораздо менѣ бросаются въ глаза, нежели свойства расположенія и инцидентности. Отсюда — особенная наглядность

⁴⁶⁾ Это слѣдуетъ изъ того, что точкамъ, расположеннымъ на одной прямой, будутъ отвѣчать лучи пучка, вершиной котораго служить полюсь этой прямой; полному же четырехугольнику будетъ отвѣчать полный четырехсторонникъ.

геометрии положения. Если часто приходится слышать, что то или другое доказательство в области проективной геометрии основывается исключительно на воззрении, то это может и должно означать лишь то, что доказательства апеллируют только к таким свойствам пространственных образов, которые можно непосредственно усмотреть на чертеже, не прибегая к измерению и сравнению; таковы свойства расположения и инцидентности. Мы узнаем, например, что две пары точек разделяют друг друга гармонически по их положению относительно полного четырехугольника. В прежней геометрии они определяются известной пропорцией, и гармоническое расположение двух точек часто познается только путем вычисления. Ряды II пор. греки определяли, как сечения круговой конической поверхности плоскостью; они пользовались, таким образом, метрически выделенным рядом второго порядка, окружностью, теория которой должна была, конечно, быть предпослана; между тем, новая геометрия восходит к источнику, из которого протекают свойства всех рядов второго порядка.

Что окружность принадлежит к числу рядов второго порядка, это мы уже видели в предыдущем параграфе. Для округления нашего очерка учения о конических сечениях нам остается еще только показать, что ряды второго порядка действительно представляют собой сечения круговой конической



Фиг. 74.

поверхности плоскостью, или—что сводится к тому же—что они представляют собой центральные проекции окружностей. Положим, что в плоскости η дан ряд точек второго порядка k (см. фиг. 74). Через некоторую его касательную t мы проведем плоскость η' и в по-

следней построим окружность k' , касающуюся прямой t в той же точке T , что и ряд k . Положим, далее, что произвольными три касательные a, b, c пучка k встречают прямую t в точках X, Y, Z . Из этих точек мы проводим касательные a', b', c' к окружности k' . В таком случае прямые a и a', b и b', c и c' определяют три плоскости α, β, γ . Последние пересекаются в одной точке S , так как они не могут проходить через одну прямую. Из точки S проектируем окружность k' на плоскость η . Мы утверждаем, что k есть проекция

окружности κ' . Въ самомъ дѣлѣ, эта проекція во всякомъ случаѣ представляетъ собой образъ, который можетъ быть воспроизведенъ на плоскости η проективными пучками ⁴⁷⁾; это есть, слѣдовательно, рядъ точекъ второго порядка, который имѣетъ съ рядомъ κ четыре общія касательныя a, b, c, l и общую точку касанія T' на прямой t ; онъ совпадаетъ поэтому съ рядомъ κ . Замѣтимъ, что мы воспользовались въ этомъ доказательствѣ только тѣмъ свойствомъ образа κ' , что онъ представляетъ собой рядъ второго порядка; спеціальныя метрическія свойства окружности намъ вовсе не были нужны. Если мы поэтому выскажемъ предложеніе:

Предложеніе 12. Ряды второго порядка представляютъ собой центральныя проекціи окружностей,

то этимъ будетъ переданъ результатъ нашего изслѣдованія только въ ограниченной формѣ.

Этимъ мы закончимъ ученіе о коническихъ сѣченіяхъ; метрическія свойства этихъ образовъ будутъ изложены частью въ планиметріи, частью въ аналитической и начертательной геометріяхъ.

§ 18. Проективная метрика.

1. Развивая въ трехъ предыдущихъ параграфахъ начала проективной геометріи, мы ограничились основными предложеніями и притомъ тѣми, доказательство которыхъ сопряжено съ дѣйствительно принципиальными трудностями. Придерживаясь этого принципа, мы должны были бы, собственно говоря, изложить еще свойства непрерывности рядовъ II пор. и пучковъ II кл.; въ частности, слѣдовало бы изложить важныя предложенія, которыя Рейэ приводитъ въ восьмой лекціи перваго отдѣла своей „Геометріи положенія“ (стр. 100 и 101 IV изданія). Однако, эти предложенія въ указанномъ мѣстѣ доказаны при помощи непрерывности прямой линіи; между тѣмъ, исходя изъ той точки зрѣнія теоріи познанія, которой мы придерживаемся, мы должны стараться не пользоваться аксіомой непрерывности III, пока мы къ этому не вынуждены необходимостью. Въ первую очередь, здѣсь рѣчь идетъ о слѣдующемъ предложеніи: если изъ двухъ точекъ A и B нѣкоторой прямой κ выходить по 2 касательныя къ ряду II пор., а изъ двухъ другихъ точекъ этой прямой C и D не выходятъ касательныя, то такія двѣ пары точекъ другъ друга не раздѣляютъ. Однако, доказательства этого предложенія требуютъ развитія обширныхъ подготовительныхъ соображеній, вслѣдствіе чего мы это оставимъ въ сторонѣ ⁴⁸⁾.

⁴⁷⁾ Если мы представимъ себѣ два проективныхъ пучка M' и N' въ плоскости η' , образующихъ окружность κ' , то проекціей этой окружности на плоскость η будетъ рядъ, образованный проективными пучками M и N , представляющими собой проекціи пучковъ M' и N' изъ точки S на плоскость η .

⁴⁸⁾ См. С. Koehler, Arch. d. Math. und Phys., 3 Reihe, Bd. 6, p. 95.


2. Мы обращаемся теперь къ проективной метрике, которая служить основой всякаго измѣренія въ эллиптической, гиперболической и параболической геометрiяхъ, и въ частности, служить основой учения о подобии и измѣренiи площадей въ Евклидовой геометрiи. Въ противоположность Евклидовой, проективная метрика плоскости отличается полною двойственностью; это значить, что каждому предложению, касающемуся соотношенiя между величинами отрѣзковъ, соответствуетъ предложенiе, которое устанавливаетъ такое же соотношенiе между величинами угловъ и получается изъ предыдущаго, по существу, замѣною словъ „прямая“, „отрѣзокъ“, „точка“ словами „точка“, „уголъ“, „прямая“. Изъ двухъ двойственныхъ предложенiй мы всегда будемъ доказывать только одно; мы настоячиво рекомендуемъ, однако, читателю всегда проводить въ видѣ упражненiя доказательство и построения предложенiя, соответствующаго изложенному по принципу двойственности.

При доказательствѣ основной теоремы намъ пришлось уже воспользоваться развитой выше въ § 15 первой ступени понятiя о величинѣ отрѣзка; впрочемъ, на этой ступени въ синтезѣ упомянутаго понятiя мы пользуемся лишь тѣмъ основнымъ положенiемъ, что цѣлое должно считаться больше своей части. Сообразно этому, мы получили возможность сравнивать между собою 2 отрѣзка лишь въ томъ случаѣ, когда одинъ изъ нихъ составляетъ часть другого; для того же случая, когда это не имѣеть мѣста, мы не имѣемъ никакого критерiя. Въ своемъ мѣстѣ мы уже указали, что для полнаго построенiя понятiя о величинѣ необходимо установить построенiе, которое давало бы критерiй, въ какомъ случаѣ два отрѣзка на прямой линiи должны называться равными или неравными. Для этого намъ послужить проективное обобщенiе приѣма Штейнера для „передвиженiя отрѣзка вдоль по прямой линiи“, которымъ мы пользовались въ § 5, 2 для построенiя конгруэнтныхъ отрѣзковъ AB и $A'B'$ (см. фиг. 5). Проводя три прямыя u, v, w фигуры 5, черезъ произвольную точку U , мы получимъ правило передвиженiя отрѣзка AB по прямой u , служащей его носительницей, съ выдѣленiемъ на послѣдней точки U въ качествѣ „выключенной“ ея точки⁴⁶⁾. Подъ

⁴⁶⁾ Приѣмъ, посредствомъ котораго Штейнеръ „передвигаетъ“ отрѣзокъ на прямой u , т. е. откладываетъ на прямой u отъ точки A отрѣзокъ $A'B'$, равный AB , заключается въ томъ (фиг. 5), что онъ проводитъ прямыя v и w , параллельныя прямой u , и изъ произвольной точки S прямой w проектируетъ отрѣзокъ AB на прямую v ; получивъ, такимъ образомъ, отрѣзокъ ab , онъ изъ точки пересѣченiя S' прямой w съ прямою $A'a$ проектируетъ отрѣзокъ ab на прямую u и получаетъ требуемый отрѣзокъ $A'B'$.

Въ проективной плоскости параллельныхъ линiй нѣтъ; мы замѣняемъ поэтому прямыя v и w , пересѣкающiя у Штейнера прямую u въ бесконечно удаленной точкѣ, двумя прямыми, проходящими черезъ произвольную точку U прямой u , и производимъ то же построенiе. Полученный, такимъ образомъ, отрѣзокъ $A'B'$ мы

отрѣзкомъ AB *excluso* U мы разумѣемъ тотъ изъ двухъ классовъ, опредѣляемыхъ, согласно аксіомамъ II, на прямой и точками A и B , который не содержитъ точки U ⁴⁹⁾. Отрѣзки AB и $A'B'$, которые могутъ быть преобразованы одинъ въ другой при помощи указаннаго построения („передвиженія“), мы будемъ называть равными *excluso* U ; при этомъ будемъ мы считать дозволеннымъ буквы $A'B'$ замѣнять другъ другомъ⁵⁰⁾. Теперь необходимо перевести это конструктивное опредѣленіе равенства на языкъ отвлеченныхъ понятій и освободить его отъ вспомогательныхъ линий и точекъ, которыми мы пользовались при этомъ построении. Пусть P будетъ



точка пересѣченія прямыхъ SA и $S'B'$, а Q —точка пересѣченія прямыхъ SB и $S'A'$; примѣняя предложеііе 6 § 16 къ полиному четырехугольнику

принимаямъ равнымъ отрѣзку AB *excluso* U , въ виду особаго значенія выдѣленной точки U . Это есть опредѣленіе проективнаго равенства двухъ отрѣзковъ на прямой. Остается только доказать, что положеніе точки B' не зависитъ отъ выбора прямыхъ v, w и точки S . Съ этой цѣлью авторъ показываетъ, что это построеніе сводится, собственно, къ тому, что мы строимъ точку M , которая совместно съ U дѣлитъ гармонически точки B, A' , а затѣмъ строимъ точку B' , которая совместно съ A дѣлитъ гармонически пару U, A' .

⁴⁹⁾ Слѣдующая аналогія выясняетъ нѣсколько эту терминологию. Если мы представимъ себѣ окружность, то каждая пара ея точекъ A и B дѣлитъ ее на двѣ дуги; каждая изъ этихъ двухъ дугъ съ одинаковымъ правомъ могла бы претендовать на названіе дуги AB , по каждой изъ этихъ дугъ можно непрерывно пройти отъ точки A къ точкѣ B . Но если мы выключимъ изъ окружности одну ея точку U , то такой переходъ можно будетъ сдѣлать уже только по одной дугѣ: по той, которая не содержитъ выключенной точки U . Въ этомъ смыслѣ, по выключеніи точки U , каждой парѣ точекъ A и B отвѣчаетъ уже одинъ отрѣзокъ AB ; это и есть отрѣзокъ AB *excluso* U .

⁵⁰⁾ Иными словами, отрѣзки AB и BA *excluso* U мы будемъ считать также равными.

$abSS'$, мы заключаемъ, что точка пересѣченія M прямыхъ PQ и u совокупно съ точкой U дѣлятъ гармонически какъ пару точекъ A, B' , такъ и пару B, A' ; при этомъ предполагается, что отрѣзки AB и $A'B'$, какъ у насъ на фигурѣ, имѣютъ *excluso U* одинаковое направленіе, т. е. группы точекъ U, A, B и U, A', B' образуютъ циклы одного направленія въ томъ смыслѣ, какъ это установлено въ § 16. Сообразно этому, мы можемъ установить слѣдующее опредѣленіе:

Два отрѣзка AB и $A'B'$ прямой u , имѣющіе *excluso U* одинаковое направленіе, называются равными *excluso U*, если существуетъ такая точка M , которая совмѣстно съ U дѣлитъ гармонически какъ пару A, B' , такъ и пару B, A' , въ предположеніи, что точки каждой пары не сливаются въ одну; два отрѣзка AB и $A'B'$, имѣющіе *excluso U* противоположное направленіе, называются равными *excluso U*, если равны сонаправленные отрѣзки съ тѣми же крайними точками.

Такимъ образомъ, отрѣзокъ $A'B'$ опредѣленъ однозначно, если даны точки U, A, B и A' или B' и, если, сверхъ того, установлено, должны ли отрѣзки AB и $A'B'$ имѣть одинаковое направленіе, или нѣтъ. Каждый отрѣзокъ AB равенъ самому себѣ и, кромѣ того, $AB = BA$: напротивъ, отрѣзокъ AB никогда не можетъ быть равенъ своей части $A'B'$, если только оба отрѣзка не имѣютъ точки U общей крайней точкой. Въ самомъ дѣлѣ, два отрѣзка UA и UA' должны всегда считаться равными какъ въ силу построенія, которымъ осуществляется передвиженіе отрѣзка по прямой, такъ и въ силу приведеннаго выше опредѣленія, равнозначущаго названному построенію⁵¹⁾; при этомъ совершенно безразлично, который изъ двухъ классовъ точекъ, опредѣляемыхъ точками U и A (а также U и A'), мы принимаемъ за „отрѣзокъ“ UA (и соотвѣтственно UA')⁵²⁾; если же, напротивъ, ни одна изъ точекъ A, B, A', B' не совпадаетъ съ точкой U и отрѣзокъ $A'B'$, составляя часть отрѣзка AB , имѣетъ съ послѣднимъ одинаковое направленіе, то двѣ пары A, B' и A', B раздѣляютъ другъ друга; поэтому, согласно § 16, 6 (конецъ), не можетъ существовать точекъ U, M , которыя дѣлили бы гармонически обѣ упомянутыя пары. Два отрѣзка AB и $A''B''$ (*excluso U*), равные *excluso U* третьему отрѣзку $A'B'$, равны между собой, ибо наше построеніе, служащее для сравненія отрѣзковъ AB и $A''B''$ съ отрѣзкомъ $A'B'$, можетъ быть выполнено при посредствѣ одного и того же отрѣзка

⁵¹⁾ Если точки A и A' совпадаютъ съ U , то мы можемъ сказать, что точки U, U дѣлятъ гармонически какъ пару AB' , такъ и пару $A'B$. Точка M , которая вмѣстѣ съ U дѣлитъ гармонически названные два отрѣзка, въ этомъ случаѣ всегда существуетъ: она совпадаетъ съ точкой U .

⁵²⁾ Дѣло въ томъ, что данное выше опредѣленіе отрѣзка *excluso U*, терять содержаніе, когда точка U сама становится крайней точкой отрѣзка.

ab на прямой v (ср. фиг. 75)⁵¹⁾. На основании приведенных предположений мы имеем возможность относительно любых двух отрезков прямой и решить, будут ли они равны или нет, а в последнем случае, который из них больше⁵²⁾.

3. Построение, дающее передвижение отрезка по прямой, вполне достаточно также для того, чтобы устроить масштаб, разделенный на проективно равные части. Прежде всего мы непосредственно имеем возможность последовательно отложить единицу меры m произвольное число раз (фиг. 76)⁵³⁾. Таким образом мы получаем точки 2, 3, 4, ... нашей фигуры, если отрезок 01 представляет собой выбранную нами единицу меры. Согласно определению равенства, точка $n + 1$ расположена относительно предшествующих точек таким образом, что она совокупно с точкой $n - 1$ делит гармонически пару U, n ⁵⁴⁾. Таким



Фиг. 76.

⁵²⁾ Предыдущее определение проективного равенства двух отрезков может быть интерпретируемо и так, что два отрезка AB и $A'B'$ на прямой u равны, если они представляют собой проекции одного и того же отрезка ab на прямую v из двух точек прямой w . На фигуре 75 мы видим, что два отрезка AB и $A''B''$, равные в этом смысле третьему отрезку $A'B'$, представляют собой проекции одного и того же отрезка ab на прямую u из двух точек прямой w .

⁵³⁾ Чтобы решить, который из двух неравных отрезков больше, нужно их проективно отложить от общей точки в одну и ту же сторону и рассмотреть, который из них составит часть другого.

⁵⁴⁾ На фигуре проведена прямая QR , параллельная прямой u , чтобы показать, что та точка прямой u , которая считается бесконечно удаленной в Евклидовой геометрии, в проективной скалке имеет конечный номер; в нашем случае этот номер падает между 4 и 5, как это отчетливо видно на скалке прямой w для точки R .

⁵⁵⁾ Положим, что мы хотим на прямой u при выключенной точке U отложить отрезок AB от точки B в ту же сторону; иными словами, мы желаем построить отрезок $A'B'$, равный *excluso* U отрезку AB , таким образом, чтобы точка A' совпала с B . Найдем тогда вспомогательную

же образомъ мы опредѣлимъ точки $-1, -2, -3, \dots$ при помощи условия, что точки $-(n+1)$ и $-(n-1)$ дѣлятъ гармонически пару $-n, U$; построение для передвиженія отрезка также непосредственно даетъ этотъ рядъ точекъ. Нужно замѣтить, что имѣть необходимости всегда пользоваться для осуществленія этого построения одной и той же парой точекъ прямой u ; результатъ вѣдь не зависитъ отъ выбора этихъ вспомогательныхъ точекъ. Поэтому ихъ слѣдуетъ выбирать такъ, чтобы было удобно получить точки дѣленія на прямой u . Мы не можемъ входить здѣсь въ разсмотрѣнiе различныхъ модификацій, которыя здѣсь возможны. Точки дѣленія постоянно сгущаются по мѣрѣ приближенія къ точкѣ U , но онѣ никогда ея не достигаютъ; при этомъ по одну сторону расположены только точки съ положительными индексами, а по другую — съ отрицательными. Изъ какой бы точки прямой u мы ни исходили, мы не имѣемъ возможности достигнуть точки U при помощи конечнаго числа шаговъ, равныхъ между собой *excluso* U ⁵⁶). Точка U является, такимъ образомъ, съ точки зрѣнiя проективнаго равенства, „бесконечно удаленной“ точкой прямой u .

Если мы выразимъ опредѣленіе точекъ съ положительными и отрицательными индексами въ одномъ предложеніи, именно, что три точки, изъ которыхъ одна *excluso* U равноудалена отъ двухъ другихъ, образуютъ вмѣстѣ съ точкой U гармоническую группу, то мы сейчасъ же сумѣемъ опредѣлить и n -ую часть отрезка $p, p+1$ нашей скалы; именно, отрезокъ $p, p+1$ дѣлится въ точкахъ дѣленія

$$p, p + \frac{1}{n}, p + \frac{2}{n}, \dots, p + \frac{n-1}{n}, p + 1$$


на n равныхъ частей, если любая три послѣдовательныя точки дѣленія образуютъ съ точкой U гармоническую группу, въ которой точка U вмѣстѣ со средней точкой дѣлятъ гармонически двѣ другія. Если мы приведемъ поэтому рядъ точекъ u въ проективное соотвѣтствіе съ са-

точку M , которая совмѣстно съ U дѣлитъ гармонически какъ пару A, B , такъ и пару A', B' . Такъ какъ точки послѣдней пары совпадаютъ, то съ ними совпадаетъ и точка M ; иначе говоря, точка B совмѣстно съ U дѣлитъ гармонически пару A, B' ; поэтому B' есть точка, которая совмѣстно съ A дѣлитъ гармонически пару U, B .

Этотъ случай и имѣетъ мѣсто при построении проективной скалы, когда мы складываемъ отрезокъ $(n, n+1)$, равный отрезку $(n-1, n)$; поэтому точка $(n+1)$ совмѣстно съ $(n-1)$ дѣлитъ гармонически отрезокъ U, n .

⁵⁶) Точка $-(n+1)$, какъ выяснено выше, совмѣстно съ точкой $-(n-1)$ дѣлитъ гармонически пару (U, n) ; поэтому точки $-(n+1)$ и $-(n-1)$ раздѣляютъ эту пару точекъ; иначе говоря, точка $-(n+1)$ попадаетъ внутрь отрезка $(U, -n)$, не содержащаго точки $-(n-1)$; въ этомъ смыслѣ точка $-(n+1)$ приближается къ U въ направленіи $-1, -2, -3 \dots$, никогда ея не достигая. Въ этомъ же смыслѣ точка $(n+1)$ приближается къ U съ другой стороны.

мимъ собой такимъ образомъ, чтобы точкамъ $U, p, p + \frac{1}{n}$ соответствовали точки $U, 0, 1$, то точкамъ $p + \frac{2}{n}, p + \frac{3}{n}, \dots, p + \frac{n-1}{n}, p+1$ будутъ отнесены точки $2, 3, \dots, n-1, n$. Но то же самое проективное соответствие будетъ установлено, если мы точкамъ $U, p, p+1$ отнесемъ точки $U, 0, n$, такъ какъ точки $p+1$ и n , какъ мы видѣли, отвѣчаютъ другъ другу въ этомъ соответствіи⁸⁶⁾. Отсюда слѣдуетъ, что нашимъ опредѣленіемъ раздѣленіе отрезка $p, p+1$ на n равныхъ *excluso* U частей однозначно опредѣлено; вмѣстѣ съ тѣмъ мы получаемъ слѣдующее построеніе (см. фиг. 77); мы проектируемъ точки $0, 1, \dots, n$ на прямую v , проходящую черезъ точку U , въ точки



Фиг. 77.

$0', 1', 2', \dots, n'$, соединяемъ точку $0'$ съ точкой p , а точку n' съ точкой $p+1$; изъ точки пересѣченія Q полученнаго такимъ образомъ прямыхъ мы проектируемъ обратно точки $0', 1', \dots, n'$ на прямую u ; проекціи и представляютъ собою искомыя точки дѣленія. Впрочемъ, вся суть

здѣсь заключается въ томъ, что три послѣдовательныя точки $0', 1', 2', \dots, n'$ совместно съ точкой U образуютъ гармоническую группу; такой рядъ можно построить и непосредственно, выбравъ произвольно точки $0'$ и $1'$.

Исходя, такимъ образомъ, отъ точекъ $U, 0, 1$, мы имѣемъ возможность легко отнести каждому рациональному числу нѣкоторую точку прямой u , и къ каждой изъ этихъ точекъ мы приходимъ рядомъ гармоническихъ построеній. При обоснованіи этихъ построеній мы не пользовались основной теоремой проективной геометріи⁸⁷⁾. Когда мы, поэтому,

⁸⁶⁾ Въ силу основной теоремы проективной геометріи.

⁸⁷⁾ Авторъ-то собственно пользуется основной теоремой въ томъ пунктѣ, къ которому относится предыдущее примѣчаніе; но справедливо то, что въ этомъ нѣтъ необходимости: можно было непосредственно указать построеніе 77, которое дастъ дѣленіе отрезка на n проективно равныхъ частей.

въ доказательствѣ основной теоремы относимъ три точки A, B, C самимъ себѣ и имѣемъ въ виду доказать, что въ такомъ случаѣ при проективномъ соответствіи и любая другая точка ряда должна отвѣчать самой себѣ, то мы можемъ обозначить эти три точки въ любой послѣдовательности черезъ $U, 0, 1$, а затѣмъ изъ опредѣленія проективнаго соответствія мы можемъ непосредственно заключить, что каждая точка, имѣющая рациональный номеръ, отвѣчаетъ самой себѣ⁵⁸⁾; дѣйствительная трудность въ доказательствѣ основной теоремы заключается, слѣдовательно, въ томъ, чтобы обнаружить, что и всѣ остальные точки должны отвѣчать каждой самой себѣ.

4. Совершенно ясно, что проективной скалой можно воспользоваться для измѣренія отрѣзковъ совершенно такъ же, какъ и обыкновенной метрической скалой. Если мы на какой-либо прямой развернемъ проективную скалу, то любая точка послѣдней либо совпадаетъ съ какой-либо точкой дѣленія скалы, либо можетъ быть точкой, расположенной сколь угодно близко отъ нея. Слѣдовательно, каждый отрѣзокъ можетъ быть съ любымъ приближеніемъ, рационально выраженъ въ частяхъ единицы скалы⁵⁹⁾, и о числѣ, которое мы такимъ образомъ получаемъ, можно сказать, что оно измѣряетъ рациональный отрѣзокъ въ принятой единицѣ мѣры. Строгаго доказательства этого предложенія мы здѣсь дать не можемъ.

Подобно тому, какъ изъ чиселъ α и β , измѣряющихъ два отрѣзка a, b , можно арифметически составить новое число $\alpha + \beta$, ихъ сумму, такъ и изъ соответствующихъ отрѣзковъ a и b можно геометрически построить новый отрѣзокъ, который измѣряется числомъ $\alpha + \beta$ и поэтому называется суммой отрѣзковъ a и b . Естественно возникаетъ вопросъ, нельзя ли указать также отрѣзокъ, представляющій собой чисто геометрическую аналогію произведенія $\alpha\beta$. Если бы это оказалось возможнымъ, то мы могли бы чисто геометрически, не пользуясь измѣряющими числами, производить по двумъ различнымъ законамъ такіа сопряженія отрѣзковъ, которая вполне соответствовали бы сложению и умноженію чиселъ. Эти два построенія должны были бы поэтому удовлетворять тѣмъ же законамъ, которымъ слѣдуютъ сложение и умножение чиселъ. Таковыми, въ первую очередь, являются слѣдующія:

⁵⁸⁾ Прямую и мы представляемъ себѣ, слѣдовательно, то какъ рядъ точекъ X , то какъ рядъ точекъ X' ; точки $U, 0, 1$ совпадаютъ каждая съ самою собою—и какъ точка X , и какъ точка X' . Точка 2 дѣлитъ совместно съ точкой 0 гармонически пару $U, 1$; если поэтому точкѣ 2 отвѣчаетъ въ ряду X' точка 2, то и она должна совместно съ 0 дѣлить гармонически пару $U, 1$; а потому точка 2' совпадаетъ съ точкой 2 и т. д.

⁵⁹⁾ По числу дѣленій проективной скалы, которая онь охватывается.

А) при сложении:

а) законъ перемѣстительный: $a + b = b + a$,

б) законъ сочетательный: $(a + b) + c = a + (b + c)$;

В) при умножении:

а) законъ перемѣстительный: $ab = ba$,

б) законъ сочетательный: $(ab)c = a(bc)$;

С) при соединении обѣихъ операций:

законъ распределительный: $(a + b)c = ac + bc$.

Мы дадимъ здѣсь одну систему построений, удовлетворяющую этимъ требованиямъ, одинъ видъ такого „исчисленія отрезковъ“, по выраженію Гильберта.


Равенство отрезковъ прямой при выдѣленной на ней точкѣ U мы будемъ считать установленнымъ, какъ въ п. 2. Кромѣ точки U мы выберемъ еще на прямой u совершенно произвольно двѣ другія: „точку нуля“ N и „точку единицы“ E . Всѣ отрезки на прямой u , которые мы захотимъ сравнивать, мы будемъ представлять себѣ передвинутыми построениемъ, осуществляющимъ передвиженіе отрезка по прямой, такимъ образомъ, чтобы всѣ они имѣли точку N общей конечной точкой. Въ направленіи UNE мы будемъ откладывать положительные отрезки, въ направленіи ENU — отрицательные, совершенно такъ же, какъ въ проективной скалѣ, которую мы также будемъ считать нанесенной. Ту точку скалы, которая имѣетъ рациональный номеръ r , мы будемъ обозначать черезъ A_r , такъ что точки U, N, E придется обозначить черезъ A_∞, A_0, A_1 ; вмѣстѣ съ тѣмъ отрезокъ $\overline{A_0 A_r}$ мы также будемъ обозначать короче черезъ r . Если точка P не принадлежитъ къ числу тѣхъ, которыя имѣютъ рациональный номеръ, и если вмѣстѣ съ тѣмъ отрезокъ $\overline{A_0 P}$, какъ таковой, будемъ отмѣчать буквой x , то мы точку P будемъ обозначать соответственно черезъ A_x ; точку A_0 мы будемъ называть начальной а точку A_x конечной точкой этого отрезка.

5. Прежде всего мы опредѣлимъ сложение. Чтобы получить конечную точку A_{r+y} отрезка, представляющаго собой сумму двухъ отрезковъ $A_0 A_x$ и $A_0 A_y$, мы должны отъ конечной точки одного отрезка отложить посредствомъ построения, служащаго для передвиженія отрезковъ, второй отрезокъ, сохраняя направленіе послѣдняго. Для этого проводимъ черезъ точку A_∞ еще двѣ вспомогательныя прямыя v и w и изъ произвольной точки C_0 прямой w проектируемъ точки A_0, A_x, A_y на прямую v ; получаемъ точки B_0, B_x, B_y ; затѣмъ для прибавленія отрезка $A_0 A_y$ къ отрезку $A_0 A_x$, мы изъ точки пересѣченія C_x прямыхъ $B_0 A_x$ и w проектируемъ точку B_y на прямую u (см. фиг. 78). Чтобы прибавить къ отрезку $A_0 A_x$ отрезокъ $A_0 A_y$, мы

проектируемъ изъ точки пересѣченія C_y прямыхъ B_0A_y и w точку B_x на прямую u . Обѣ проекціи, согласно перемѣстительному закону сложения отрезковъ, должны опредѣлять ту же точку A_{x+y} на прямой u . Въ самомъ дѣлѣ, $B_0C_xB_yC_0B_xC_y$ есть частный случай шестиугольника Паскаля⁶⁰); если мы поэтому точку пересѣченія прямыхъ C_yB_x и C_xB_y , о которой идетъ рѣчь, обозначимъ черезъ S , то схема:

$$\begin{array}{l} \text{сторона: } B_0C_x, \quad C_xB_y, \quad B_yC_0, \\ \text{противоположная сторона: } C_0B_x, \quad B_xC_y, \quad C_yB_0, \\ \text{точка пересѣченія: } A_x, \quad S, \quad A_y. \end{array}$$

обнаруживаетъ, что точка S лежитъ, какъ и требовалось, на прямой u . Такимъ образомъ, равенство $x + y = y + x$ остается въ силѣ какъ для



Фиг. 78.

положительныхъ, такъ и для отрицательныхъ отрезковъ. Наше построение даетъ $\overline{A_0A_x} + \overline{A_0A_y} = \overline{A_0A_{x+y}}$; иными словами, отрезокъ A_0A_0 при сложении отрезковъ играетъ ту же роль, что и число 0 въ арифметикѣ.

Относительно сложения отрезковъ имѣть мѣсто слѣдующее важное предложеніе.

Вспомогательное предложеніе I. Имѣть мѣсто соотношение:

$$u(A_{\infty}A_0A_1A_xA_yA_z \dots) \bar{\pi} u(A_{\infty}A_1A_{1+x}A_{x+y}A_{y+z}A_{z+\dots}),$$

гдѣ знакъ $\bar{\pi}$, происходящій отъ греческой буквы π , служить для обозначенія проективнаго соответствія. Въ самомъ дѣлѣ, для построения точки A_{x+y} нужно изъ точки C_0 предыдущей фигуры спроектировать точку A_x на прямую v , а затѣмъ полученную точку B_x спроектировать на прямую w изъ точки C_x . Произведя это построение для точекъ $x = \infty, 0, 1, x, y, z, \dots$ (см. фиг. 79), мы получимъ на прямой w рядъ

⁶⁰) Это шестиугольникъ Паскаля, вписанный въ рядъ II пор., который представляютъ собой двѣ прямыя v и w .

точек $w(C_x C_0 C_1 C_x C_y C_z \dots)$, который, с одной стороны, при посредствѣ пучка B_0 приведенъ въ перспективное соотвѣтствіе съ рядомъ

$$u(A_\infty A_0 A_1 A_2 A_y A_z \dots),$$

а, сь другой стороны, при посредствѣ пучка B_s , — сь рядомъ

$$u(A_x A_s A_{1+s} A_{2+s} A_{y+s} A_{z+s} \dots).$$


Слѣдовательно, послѣдніе два ряда связаны другъ сь другомъ проективно.

Изъ предложенія I вытекаетъ, сь одной стороны, что

$$u(A_\infty A_0 A_1 A_2 A_x \dots) \bar{\wedge} u(A_\infty A_y A_{-s+y} A_{x+y} \dots) \\ \wedge u(A_\infty A_{y+s} A_{(-s+y)+s} A_{(x+y)+s} \dots),$$

а сь другой стороны, что

$$u(A_\infty A_0 A_{-s} A_x \dots) \bar{\wedge} u(A_\infty A_s A_0 A_x \dots) \\ \wedge u(A_\infty A_{s+y} A_y A_{(s+y)+y} \dots).$$



Фиг. 79.


Въ виду же доказаннаго только-что закона перемѣстительнаго

$$u(A_\infty A_{y+s} A_{(-s+y)+s} A_{(x+y)+s} \dots) \bar{\wedge} u(A_x A_{y+s} A_{y+s} A_{(x+y)+s} \dots).$$

Пусть B_0, B_y, B_s (см. фиг. 80) будутъ проекціи точекъ A_0, A_y, A_z изъ нѣкоторой точки P плоскости на вспомогательную прямую v , проходящую черезъ точку A_∞ . Пусть Q будетъ точка пересѣченія прямыхъ $A_0 B_s$ и w . Прямая QB_0 и QB_y пересѣкаютъ прямую u въ точкахъ A_{-s} и A_{-s+y} ⁶¹⁾. Если прямая w встрѣчаетъ прямую $A_{-s+y} B_0$ въ

⁶¹⁾ Если мы обозначимъ точку пересѣченія прямой QB_0 сь прямой u черезъ A_ξ , то легко убѣдимся, что точка A_{-s+y} совпадаетъ съ A_0 , такъ что ξ должно быть равно 0. Такимъ же образомъ докажемъ, что точка пересѣченія прямой QB_y сь прямой u есть точка A_{-s+y} .

точкѣ R , то прямая RB_3 пересѣкаетъ прямую u въ точкѣ $A_{(-x+y)+z}$. Эта точка совпадаетъ съ точкой A_y , какъ это обнаруживаетъ шестиугольникъ Паскаля $A_0P.A_yR.A_{-z+y}Q$. Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что въ двухъ проективныхъ рядахъ $u(A_\infty.A_y+A_z.A_{(-z+y)+z}.A_{(x+y)+z} \dots)$ и $u(A_\infty.A_y+A_z.A_{(x+z)+y} \dots)$ каждый изъ первыхъ трехъ элементовъ отвѣчаетъ самому себѣ; поэтому, въ силу основной теоремы проективной геометрии, каждая точка первого ряда совпадаетъ съ соответствующей точкой второго ряда; слѣдовательно, точка $A_{(x+y)+z}$ совпадаетъ съ точкой $A_{(x+z)+y}$; такимъ образомъ, мы доказали, что при сложении



отрѣзковъ имѣетъ мѣсто также законъ сочетательный:

$$(x + y) + z = (x + z) + y.$$

Сообразно этому, сумма трехъ отрѣзковъ x, y, z можетъ быть однозначно обозначена черезъ $x + y + z$.

6. Отъ точекъ A_∞, A_0, A_1 мы переходимъ къ точкамъ A_2, A_3, \dots, A_n при помощи гармоническихъ группъ:

$$A_\infty A_0 A_1 A_2, \quad A_\infty A_1 A_2 A_3, \quad A_\infty A_2 A_3 A_4, \dots, \quad A_\infty A_{n-2} A_{n-1} A_n.$$


Точно такъ же посредствомъ передвиженія отрѣзковъ мы можемъ получить по точкамъ A_∞, A_0, A_x точки $A_{2x} A_{3x} \dots A_{nx}$; для этого нужно только строить гармоническія группы $A_\infty A_0 A_x A_{2x}, A_x A_x A_{2x} A_{3x}, A_x A_{2x} A_{3x} A_{4x}, \dots, A_\infty A_{(n-2)x} A_{(n-1)x} A_{nx}$. Въ каждой изъ этихъ группъ первая и третья точка раздѣляютъ гармонически двѣ другія. Точка A_{nx} строится по точкамъ $A_\infty A_0 A_x$ при помощи такого же ряда гармоническихъ группъ, какъ точка A_n по точкамъ $A_\infty A_0 A_1$; если мы поэтому установимъ проективное соотвѣтствіе, относящее точкамъ A_∞, A_0, A_1 точки A_x, A_0, A_x , то точкѣ A_n отвѣчаетъ точка A_{nx} ; поэтому ⁶²⁾

$$u(A_\infty A_0 A_1 A_n) \bar{\cap} u(A_x A_0 A_x A_{nx}).$$

⁶²⁾ Точка A_∞ вмѣстѣ съ точкой A_1 дѣлитъ гармонически пару $A_0 A_2$; если мы поэтому установимъ проективное соотвѣтствіе, въ которомъ точкамъ A_∞, A_0, A_1 отвѣчаютъ точки A_x, A_0, A_x , то точкѣ A_2 будетъ отвѣчать такая точка, которая вмѣстѣ съ A_0 дѣлитъ гармонически пару $A_\infty A_x$; а это и есть точка A_{2x} ; и т. д.

Это соотношение покаместъ установлено лишь для цѣлыхъ положительныхъ значеній числа n ; мы воспользуемся имъ лишь, какъ наведеніемъ для слѣдующаго опредѣленія того сопряженія отрезковъ, которое мы будемъ называть ихъ умноженіемъ: отрезокъ xu однозначно опредѣляется по отрезкамъ x и y требованіемъ $u(A_x A_0 A_y A_{xy}) \bar{\wedge} u(A_\infty A_0 A_1 A_x)$. Если x и y суть рациональныя числа, то это опредѣленіе выражаетъ, что отрезокъ xu получается изъ отрезка y такъ, какъ x получается изъ 1.

Въ этой формѣ часто выражаютъ правило умноженія дробей; вообще проективное исчисленіе отрезковъ даетъ интересное освѣщеніе основъ ариѳметики. вмѣстѣ съ тѣмъ легко усмотрѣть преимущество, которое геометрія представляетъ въ этомъ отношеніи по сравненію съ ариѳметикой: если отрезокъ x не представляетъ собой рациональнаго



Фиг. 81.

кратнаго отрезка, принятаго за 1, то исходя отъ точекъ A_x , A_0 , A_1 невозможно придти къ точкѣ A_x при помощи конечнаго числа гармоническихъ построеній, и ариѳметическое опредѣленіе произведенія xu въ этомъ случаѣ ничего бы не дало. Наше же опредѣленіе произведенія xu оперируетъ надъ самими отрезками x и y , а не надъ числами, ихъ измѣряющими: поэтому оно обходитъ указаннныя выше затрудненія.

Самое построеніе произведенія xu по отрезкамъ x и y вытекаетъ непосредственно изъ опредѣленія умноженія. Изъ произвольной точки плоскости C_0 (фиг. 81) проектируемъ точки A_∞ , A_0 , A_1 , A_x на произвольную прямую v , проходящую черезъ точку A_∞ , и получаемъ такимъ образомъ точки B_∞ , B_0 , B_1 , B_x . Прямая $B_1 A_y$ опредѣляетъ на прямой $C_0 A_0$ точку Y , а прямая $Y B_x$ встрѣчаетъ прямую u въ точкѣ A_{xy} , ибо

$u(A_\infty A_0 A_1 A_2) \bar{\wedge} v(B_\infty B_0 B_1 B_2)$; проектируя же эти послѣднія точки изъ Y на прямую u , получаемъ: $v(B_\infty B_0 B_1 B_2) \bar{\wedge} u(A_\infty A_0 A_1 A_2)$; слѣдовательно, $u(A_\infty A_0 A_1 A_2) \bar{\wedge} u(A_\infty A_0 A_1 A_2)$, какъ это требуется опредѣленіемъ. Теперь замѣстимъ исходные элементы A_x и A_y другъ другомъ; именно, проектируя точки A_∞, A_0, A_1, A_2 изъ точки C_0 на прямую v , мы построимъ точки B_∞, B_0, B_1, B_2 , опредѣлимъ затѣмъ точку пересѣченія X прямыхъ $B_1 A_x$ и $C_0 A_0$ и найдемъ точку пересѣченія прямой $X B_y$ съ прямой u ; эта точка пересѣченія, которую нужно обозначить черезъ A_{yx} , совпадаетъ съ точкой A_{xy} , такъ какъ въ шестигульникѣ Паскаля $B_1 A_x B_x A_{xy} B_y A_y$ точки пересѣченія противоположныхъ сторонъ $B_1 A_x$ и $A_{xy} B_y$, $A_x B_x$ и $B_y A_y$, $B_x A_{xy}$ и $A_y B_1$ должны лежать на одной прямой; такъ какъ двумя послѣдними точками пересѣченія служатъ C_0 и Y , то первой должна служить точка X . Этимъ доказанъ законъ перемѣстительный при умноженіи: $yx = xy$. Изъ опредѣленія умноженія вытекаетъ:

Вспомогательное предположеніе II. Такъ какъ, въ силу опредѣленія умноженія,

$$u(A_\infty A_0 A_1 A_2 A_3 \dots) \bar{\wedge} u(A_\infty A_0 A_1 A_2 A_3 \dots),$$

то, съ одной стороны,

$$u(A_x A_0 A_1 A_2) \bar{\wedge} u(A_\infty A_0 A_1 A_2) \bar{\wedge} u(A_x A_0 A_1 A_2 A_3 \dots),$$

а съ другой стороны,

$$u(A_x A_0 A_1 A_2) \bar{\wedge} u(A_x A_0 A_1 A_2) \bar{\wedge} u(A_x A_0 A_1 A_2 A_3 \dots);$$

поэтому

$$u(A_\infty A_0 A_1 A_2 A_3 \dots) \bar{\wedge} u(A_\infty A_0 A_1 A_2 A_3 \dots);$$

вмѣстѣ съ тѣмъ, въ силу основной теоремы, точка $A_{(xy)z}$ совпадаетъ съ точкой $A_{(xz)y}$. Законъ сочетательный, такимъ образомъ, также выполняется.

Согласно вспомогательнымъ предположеніямъ I и II мы имѣемъ, съ одной стороны,

$$u(A_x A_0 A_{-y} A_x) \bar{\wedge} u(A_\infty A_0 A_{-y} A_x) \bar{\wedge} u(A_x A_y A_0 A_{x+y}),$$

а съ другой стороны,

$$u(A_x A_0 A_{-y} A_x) \bar{\wedge} u(A_\infty A_y A_0 A_{x+y}) \bar{\wedge} u(A_\infty A_y A_0 A_{(x+y)});$$

какъ что


$$u(A_x A_y A_0 A_{x+y}) \bar{\wedge} u(A_\infty A_y A_0 A_{(x+y)});$$

вмѣстѣ съ тѣмъ, въ силу основной теоремы, точка A_{x+y} совпадаетъ съ точкой $A_{(x+y)}$. Такимъ образомъ доказано также, что и законъ распределительный остается въ силѣ.

7. Если на фиг. 81 точка A_x совпадает с A_0 , с A_1 или с A_∞ , то точка X на прямой A_0C_0 , как точка пересечения последней с прямой B_1A_x , приходит в совмещение соответственно с точками A_0, C_0, B_0 ; точка же A_{xy} на прямой u , как точка пересечения последней с прямой XB_y , соответственно совпадает с точками A_0, A_y, A_x . Поэтому

$$0 \cdot y = 0, \quad 1 \cdot y = y, \quad \infty \cdot y = \infty,$$

если только точка A_y сама не совпадает с точкой A_x . Если мы соединим еще сюда факт, доказанный выше, что в нашем исчислении



Фиг. 82.

отрезков $x + 0 = x$, то выбор индексов точек A_x, A_0, A_1 найдеть себя полное оправдание.

Подобно тому, как вычитание возможно было определить, как прибавление отрицательного отрезка, мы определим теперь деление на отрезок x , как умножение на обратный отрезок $1/x$. Так как при $y = 1/x$ точка A_{xy} должна совпадать с точкой A_1 , то мы получим на фиг. 81 точку A_{1x} , если найдем пересечение $B_{1/x}$ прямых XA_1 и v и спроектируем его из точки C_0 на прямую u . На фиг. 82 воспроизведено это простое построение отрезков, обратных отрезкам x, y, z ; для построения точки A_{1x} мы находим пересечение X прямой B_1A_x с прямой C_0A_0 , которую мы будем обозначать через s , и проектируем точку пересечения $B_{1/x}$ прямых XA_1 и v из точки C_0 на прямую u . Легко усмотреть, что по смыслу нашего исчисления

отрѣзковъ $1/0 = \infty$, $1/1 = 1$, $1/\infty = 0$. Пучки лучей B_1 и A_1 проектируютъ точки $A_\infty A_0 A_1 A_x A_y A_z$ и $A_{1/x} A_{1/y} A_{1/z} A_1 A_{1/y} A_{1/x}$ въ тѣ же точки $B_0 A_0 C_0 XYZ$ прямой s ; отсюда вытекаетъ:

Вспомогательное предположеніе III. Имѣть мѣсто соотношеніе:

$$u(A_\infty A_0 A_1 A_x A_y A_z \dots) \bar{\cap} u(A_0 A_\infty A_1 A_{1/x} A_{1/y} A_1 \dots).$$

Изъ этихъ трехъ вспомогательныхъ предположеній мы вскорѣ выведемъ важныя слѣдствія. Но прежде всего мы подчеркнемъ важный результатъ нашего изслѣдованія, что наше исчисленіе отрѣзковъ слѣдуетъ всѣмъ законамъ четырехъ дѣйствій. Всѣ построенія, необходимыя для полученія отрѣзковъ $x + y$, $x - y$, x/y , x/v , выполняются исключительно при помощи прямыхъ линий. Но результатъ этихъ построеній, какъ оказалось, не зависитъ отъ вспомогательныхъ прямыхъ; онъ зависитъ исключительно отъ выбора трехъ точекъ A_x , A_0 , A_1 и отъ конечныхъ точекъ тѣхъ отрѣзковъ, надъ которыми мы производимъ наши построенія. Если мы теперь представимъ себѣ, что плоскость η , въ которой производятся всѣ эти построенія, вмѣстѣ съ прямой u , спроектированы на нѣкоторую другую плоскость η' , а D_∞ , D_0 , D_1 , D_x , D_y суть проекціи точекъ A_∞ , A_0 , A_1 , A_x , A_y , то фигурѣ, при посредствѣ которой мы на плоскости η по точкамъ A_x , A_y строимъ точки A_{x+y} , A_{x-y} , A_{xy} , $A_{x/y}$, отвѣчаетъ на плоскости η' фигура, опредѣляющая по точкамъ D_x и D_y соответственно точку D_{x+y} , D_{x-y} , D_{xy} , $D_{x/y}$; если мы спроектируемъ плоскость η' на другую вспомогательную плоскость η'' , то тѣ же выводы останутся въ силѣ. Такъ какъ, однако, мы показали, примѣнительно къ фиг. 60, что любое проективное соотвѣтствіе между двумя прямыми u и u'' можетъ быть осуществлено двукратнымъ проектированіемъ, то этимъ доказано:

Предложеніе 1. Если двѣ прямыя u и u'' , снабженныя проективными скалами, приведены въ проективное соотвѣтствіе, и основными точкамъ A_∞ , A_0 , A_1 прямой u и отвѣчаютъ основныя точки C_∞ , C_0 , C_1 прямой u'' , отрѣзкамъ же x , y , ... (excl. A_∞) прямой u и отвѣчаютъ отрѣзки x^* , y^* , ... (excl. C_x) прямой u'' , то

$$1) (x \cdot y)^* = x^* \cdot y^*, \quad 2) (x - y)^* = x^* - y^*, \quad 3) (x/y)^* = x^*/y^*, \\ 4) (x/v)^* = x^*/v^*,$$

гдѣ $+$, $-$, \cdot , $/$ суть знаки четырехъ операций при основныхъ точкахъ A_x , A_0 , A_1 , между тѣмъ какъ знаки \cdot , $-$, \cdot , $/$ выражаютъ тѣ же дѣйствія при основныхъ точкахъ C_∞ , C_0 , C_1 .

Иными словами: основныя четыре дѣйствія суть операции проективной; такъ, напримѣръ, $A_{x \cdot y}$ и $C_{x^* \cdot y^*}$ суть соотвѣтствующія точки. Такъ какъ $1^2 = 1$, то и $1^{*2} = 1^*$: слѣдовательно, $1^* = 1^{(3)}$, а потому, въ виду

⁶⁵⁾ Если мы тремъ точкамъ A_∞ , A_0 , A_1 прямой u и опнесемъ точки C_∞ , C_0 , C_1 на прямой u' , то этимъ будетъ установлено проективное соотвѣтствіе между рядами u и u' ,

равенства 1): $2^* = 2$, $3^* = 3$, ...; поэтому, в силу соотношений 1), 2), 3), 4), $r^* = r$, если r есть рациональное число; это вытекает, конечно, и из того обстоятельства, что мы от точек C_∞ , C_0 , C_1 приходим к точкам C_r совершенно тем же рядом гармонических построений, который от точек A_∞ , A_0 , A_1 приводит к точкам A_r . Так как каждый отрезок может быть с любым приближением выражен рациональным кратным отрезка, принятого за единицу, то и всегда вообще $x^* = x$, если мы под x^* и x разумем числа, измеряющие отрезки. При всем том предложение 1 отнюдь не является излишним^{*)}. Помимо того значения этого предложения, которое выяснено

каждой точкой A_x ряда n будет отвечать некоторая точка $C_{x/n}$ ряда n' . Если, однако, A_x , A_0 , A_1 суть основные точки проективной скалы на прямой n , то индекс x точки A_x есть определенное число; таким же образом x^* есть также определенное число. Нужно доказать, что $x^* = x$. Прежде всего $1^* = 1$, ибо мы точкой A_1 отнесли точку C_1 (ишь никаких оснований выводить это, как в тексте, из того, что $1^* = 1^*$). Но тогда соотношение 1) даст $(1+1)^* = 1^* + 1^*$, т. е. $2^* = 2$ и т. д.; этим доказано соотношение $n^* = n$ для всякого целого n ; а тогда при помощи соотношения 4) докажем его для всех рациональных чисел.

^{*)} Предложение 1 устанавливает внутреннюю связь между основами проективной геометрии и основами учения о числах, в частности, теорией алгебраических числовых корпусов. Так как в тексте мы не имеем возможности войти в эти соображения, то мы дадим здесь некоторые указания по этому вопросу. Формулами 1) — 4) Дедекинда в четвертом издании лекций Дирихле по теории чисел (L. Dirichlet, „Vorlesungen über Zahlentheorie“, Supplement XI) совершенно абстрактно определять „перестановки“ корпуса A , которые преобразуют его в „сопряженный“ корпус A^* . Затем в юбилейной статье „о перестановках корпуса всех алгебраических чисел“ Дедекинда распространил это определение и вытекающая из него следствия на корпус всех алгебраических чисел, на корпус всех вещественных, а также на корпус всех комплексных чисел. Согласно предложению 1, эти перестановки представляют собой не что иное, как проективные сопряжения корпуса A с самим собой, если только они совпадают с сопряженным корпусом A^* . В противном случае четырем гармоническим точкам числового ряда A все же отвечают четыре гармонические точки ряда A^* , но это соответствие также не будет проективным, ибо свойства расположения ряда A не совпадают с соответствующими свойствами ряда A^* . Наши формулы $1^* = 1$, $2^* = 2$, ... показывают, правда, что рациональные точки с одним и тем же номером всегда соответствуют друг другу, но для иррациональных точек это не всегда имеет место. В качестве примера рассмотрим числовой корпус (область) всех чисел вида $a + b\sqrt{2}$, где a и b суть рациональные числа. Если мы положим $x^* = a - b\sqrt{2}$, то четырем гармоническим точкам x отвечают всегда четыре гармонические точки x^* ; вместе с тем рациональные числа ($b = 0$) соответствуют каждое самому себе; но числу $x = \sqrt{2}$ отвечает число $x^* = -\sqrt{2}$. Свойства расположения, таким образом, не сохранились. Иначе обстоит дело в геометрии. Это обуславливается тем, что основная теорема покоится на том аксиоматически введенном факте, согласно которому любые двумя парам точек, которые друг друга не разделяют,

въ подстрочномъ примѣчаніи, оно даетъ такое доказательство формулы $x = x^*$, которое лишь косвеннымъ образомъ зависитъ отъ аксіомы о непрерывности; вѣрнѣе, зависитъ отъ послѣдней лишь въ той мѣрѣ, въ какой отъ нея зависитъ основная теорема проективной геометріи. Если x^* удовлетворяетъ алгебраическому уравненію съ рациональными коэффициентами, то тому же уравненію, въ силу предложенія 1, удовлетворяетъ также x ; съ другой стороны, такъ какъ точка A_x , вслѣдствіе проективности свойствъ расположенія *excluso* U , всегда лежитъ между точками съ тѣми же нумерами, какъ и точка C_{x^*} , то число x^* не можетъ быть корнемъ этого уравненія, отличнымъ отъ x ; поэтому число $x^* = x$.

8. Съ помощью вспомогательныхъ предложеній мы теперь докажемъ предложеніе, играющее основную роль во всей метриѣ.

Предложеніе 2. Проективное ангармоническое отношеніе четырехъ элементовъ ряда перваго или втораго порядка, а также пучка перваго или втораго класса, не зависитъ отъ выбора трехъ основныхъ точекъ ∞ , 0, 1.

Понятіе объ ангармоническомъ отношеніи было нами установлено въ § 11, 8. Здѣсь мы называемъ ангармоническое отношеніе проективнымъ потому, что оно должно быть составлено по проективной скалѣ. Будетъ достаточно доказать предложеніе для прямолинейнаго ряда точекъ, такъ какъ вслѣдствіе закона двойственности оно уже будетъ тѣмъ самымъ доказано для пучка перваго класса; отъ пучка же перваго класса оно можетъ быть перенесено на рядъ втораго порядка и отсюда на пучекъ его

всегда отвѣчаетъ третья пара точекъ (u, v) , которая раздѣляетъ гармонически какъ точки одной пары, такъ и точки другой пары. По даннымъ четыремъ точкамъ u и v опредѣляются посредствомъ извлеченія квадратнаго корня. За исключеніемъ того случая, когда въ области A какъ разъ окажется этотъ корень, основная теорема въ области A несправедлива. Чтобы исключить возможность всякихъ перестановокъ, отличныхъ отъ полного тождества, было бы необходимо ввести въ область A всѣ вещественные квадратные радикалы, равно какъ и всѣ вообще вещественныя числа, которыя можно получить, послѣдовательно расширяя числовую область путемъ производства рациональныхъ дѣйствій надъ квадратными корнями и извлеченія корня изъ чиселъ, уже полученныхъ тѣмъ же путемъ ранѣе. Однако, такой корпусъ не совпадаетъ съ своими сопряженными корпусами, такъ какъ послѣднія содержатъ также комплексныя числа; поэтому нѣтъ никакого противорѣчія съ основной теоремой въ томъ, что Дедекинды для корпуса всѣхъ алгебраическихъ чиселъ обнаруживаютъ существованіе перестановокъ, которыя отличны отъ тождества. Къ тому же эти корпусы не вещественные. Что касается основныхъ двухъ вопросовъ, поставленныхъ въ названной юбилейной статьѣ, то на нихъ мы можемъ отвѣтить, что корпусъ всѣхъ вещественныхъ чиселъ, въ силу основной теоремы, допускаетъ только тождественную перестановку, корпусъ же всѣхъ комплексныхъ чиселъ допускаетъ еще перестановку, которая воспроизводится путемъ взаимнаго замѣщенія чиселъ $\sqrt{-1}$ и $-\sqrt{-1}$.

касательныхъ совершенно такъ же, какъ мы перенесли свойства расположения съ пучка перваго класса на рядъ точекъ втораго порядка.

Мы примемъ теперь, что гармоническіе ряды u и u^* , о которыхъ идетъ рѣчь въ предложениі 1, лежатъ на одной прямой. Положимъ, что точкамъ $A_\infty, A_0, A_1, A_{x_n}$ ряда u отнесены точки $C_\infty, C_0, C_1, C_{x_n}$ ряда u^* ($n = 1, 2, \dots$); положимъ, что координатія x исходитъ отъ основныхъ точекъ A_∞, A_0, A_1 , а координатія x^* отъ точекъ C_∞, C_0, C_1 . Въ такомъ случаѣ, какъ мы показали въ п. 7,

$$x^* = x. \quad (1)$$

Положимъ, что отрѣзки $C_0A_\infty, C_0A_0, C_0A_1, C_0A_{x_n}$ при основныхъ точкахъ C_∞, C_0, C_1 выражаются черезъ a', b', c', x_n' , такъ что ихъ конечныя точки суть $C_a', C_b', C_c', C_{x_n}'$. Постараемся установить зависимость между x_n' и x_n .

Согласно вспомогательнымъ предложеніямъ I, II, III, мы, исходя отъ ряда точекъ $u(C_\infty, C_0, C_1, C_{x_n})$, всегда получимъ проективный съ нимъ рядъ, если мы къ индексамъ всѣхъ точекъ C прибавимъ одно и то же число, положительное или отрицательное, или если мы всѣ эти индексы помножимъ на одно и то же число, или, наконецъ, если замѣнимъ ихъ всѣ обратными значеніями. Этимъ путемъ мы послѣдовательно получимъ слѣдующія соотношенія (вмѣсто точекъ мы вездѣ для краткости пишемъ только ихъ индексы):

$$\begin{aligned} (\infty, 0, 1, x_n) \bar{\wedge} (\infty, 0, r, rx_n) \bar{\wedge} (\infty, s, r+s, rx_n + s) \\ \bar{\wedge} \left(0, \frac{1}{s}, \frac{1}{r+s}, \frac{1}{rx_n + s} \right) \bar{\wedge} \left(0, \frac{b}{s}, \frac{b}{r+s}, \frac{b}{rx_n + s} \right) \\ \bar{\wedge} \left(a', \frac{b}{s} + a', \frac{b}{r+s} + a', \frac{b}{rx_n + s} + a' \right); \end{aligned}$$

отсюда, опуская промежуточные члены, получимъ:

$$(\infty, 0, 1, x_n) \bar{\wedge} \left(a', \frac{b}{s} + a', \frac{b}{r+s} + a', \frac{b}{rx_n + s} + a' \right). \quad (2)$$

Точка, отвѣчающая въ этомъ проективномъ соотвѣтствіи точкѣ C_∞ , будетъ C_a' . Если мы желаемъ, чтобы точкамъ C_0 и C_1 такимъ же образомъ отвѣчали точки C_b' и C_c' , то нужно положить

$$\frac{b}{s} + a' = b', \quad \frac{b}{r+s} + a' = c',$$

такъ что

$$b = (b' - a')(c' - a')\omega, \quad r = (b' - c')\omega, \quad s = (c' - a')\omega,$$

гдѣ ω есть коэффициентъ пропорціональности. Въ виду соотношенія (2)

$$и (C_{\infty}, C_0, C_1, C_{x^*}, C_{x_2^*}, \dots) \bar{\wedge} (C_{a'}, C_{b'}, C_{c'}, C_{x_1'}, C_{x_2'}, \dots), \quad (3)$$

гдѣ

$$x_n' = \frac{b}{rx_n^* + s} + a' = \frac{a'(b' - c')x_n^* + b'(c' - a')}{(b' - c')x_n^* + (c' - a')}; \quad (4)$$

наконецъ, отсюда, принимая во вниманіе соотношеніе (1), получаемъ:

$$x_n' = \frac{a'(b' - c')x_n + b'(c' - a')}{(b' - c') + (c' - a')}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (5)$$

Мы видимъ, что формула (4) и при $x^* = \infty, 0, 1$ даетъ правильно соответствующія значенія a', b', c' , такъ что всѣ безъ исключенія индексы съ правой стороны равенства (3) получаются изъ соответствующихъ индексовъ лѣвой по тому же закону (4). Если мы положимъ $x_n' = \frac{px_n^* + q}{rx_n^* + s}$, гдѣ

$$p = a'(b' - c')\omega, \quad q = b'(c' - a')\omega, \quad r = (b' - c')\omega, \quad s = (c' - a')\omega,$$

то эти четыре величины не могутъ быть выбраны совершенно произвольно, ибо количества a', b', c' , очевидно, должны быть различны, что эквивалентно тому, что произведеніе

$$(a' - b')(b' - c')(c' - a') = (ps - qr)\omega^{-1}$$

должно быть отлично отъ нуля. Обозначая теперь точки, о которыхъ идетъ рѣчь, не черезъ C , а черезъ A , мы получаемъ:

Предложеніе 3. Если мы подвергнемъ индексы ряда точекъ n въ проективной скалѣ линейному преобразованію

$$x' = \frac{px + q}{rx + s}, \quad ps - qr \neq 0$$

и точкамъ A_x отнесемъ точки $A_{x'}$, то этимъ будетъ установлено проективное соответствіе.

Формула (5) раскрываетъ искомую зависимость между x_n и x_n' :

Предложеніе 4. Переходъ къ новымъ основнымъ точкамъ всегда осуществляется при помощи одного и того же линейнаго преобразованія индексовъ. Если A_{∞}, A_0, A_1 суть первоначальныя основныя точки, а C_{∞}, C_0, C_1 — новыя, и если въ послѣдней координаціи

$$C_0 A_{\infty} = a', \quad C_0 A_0 = b', \quad C_0 A_1 = c',$$

то между индексомъ x любой точки P , соответствующимъ первой системѣ основныхъ точекъ, и индексомъ x'

той же точки, соответствующимъ второй системѣ, имѣеть мѣсто соотношеніе

$$x' = \frac{a'(b' - c')x + b'(c' - a')}{(b' - c')x + c' - a'}, \quad x = \frac{x' - b'}{x' - a'} : \frac{c' - b'}{c' - a'}. \quad (6)$$

Если мы теперь составим ангармоническое отношеніе $\frac{x_1' - x_2'}{x_1' - x_4'} : \frac{x_3' - x_2'}{x_3' - x_4'}$ четырехъ точекъ

$$x_n' = \frac{p x_n + q}{r x_n + s} \quad (n = 1, 2, 3, 4),$$

то простое вычисленіе обнаруживаетъ, что послѣднее равно $\frac{x_1 - x_2}{x_1 - x_4} : \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_4}$.

Этимъ предложеніе 2 доказано *). Какъ показываетъ примѣръ двухъ точекъ $\infty, 1$ и $0, 2$, дѣлящихъ другъ друга гармонически, ангармоническое отношеніе четырехъ гармоническихъ элементовъ равно -1 ; этими элементами могутъ служить какъ пучки ряда перваго или втораго порядка, такъ и лучи пучка перваго или втораго класса. Формула (6) выражаетъ самый индексъ x въ видѣ гармоническаго отношенія. При $a' = \infty$ имѣемъ $x = (x' - b') : (c' - b')$, а потому

$$(x_1 - x_2) : (x_3 - x_4) = (x_1' - x_2') : (x_3' - x_4');$$

это значить, что отношеніе двухъ отрѣзковъ на прямой зависитъ только отъ выключенной точки, но не зависитъ отъ точекъ, помѣченныхъ въ проективномъ мѣроопредѣленіи индексами 0 и 1 ; индексы x и x' здѣсь относятся къ одной и той же выключенной точкѣ A_∞ .

9. Развитое здѣсь исчисленіе отрѣзковъ даетъ возможность сравнивать только отрѣзки одной и той же прямой; точно такъ же соответствующее по принципу двойственности измѣреніе угловъ даетъ только возможность сравнивать углы, образуемые лучами одного и того же пучка. Остающийся здѣсь пробѣлъ можно было бы восполнить введеніемъ проективной окружности, но мы не имѣемъ возможности здѣсь въ это входить. Изложенное измѣреніе отрѣзковъ и угловъ вполне достаточно для обоснованія метрики въ двухъ неевклидовыхъ геометріяхъ; но мы вынуждены ограничиться гиперболической геометріей, такъ какъ въ настоящемъ сочиненіи мы не имѣли возможности изложить теорію мнимыхъ элементовъ въ проективной геометріи; въ гиперболической же геометріи мы по той же причинѣ вынуждены ограничиться только измѣреніемъ отрѣзковъ. Если развивать гиперболическую геометрію совершенно элементарно по образцу нашей школьной (Евклидовой) геометріи, то она


*) Другое доказательство далъ Пашъ въ своихъ „Лекціяхъ о новой геометріи“, въ § 21.

приводить къ доказательству существованія ряда второго порядка ω , на которомъ лежатъ обѣ бесконечно удаленныя точки любой прямой плоскости. Чисто геометрически этотъ рядъ ω ничѣмъ не отличается отъ другихъ рядовъ; это различіе устанавливается только метрикой, и именно поэтому возможно любой рядъ второго порядка ω принять за „абсолютный“ рядъ второго порядка, т. е. сдѣлать его геометрическимъ мѣстомъ бесконечно удаленныхъ точекъ плоскости. Это мы и намѣрены теперь выполнить. Мы ограничимся „внутренней стороной“ ряда ω , т. е. совокупностью тѣхъ точекъ, изъ которыхъ нельзя провести къ ряду ω касательныхъ. Каждая прямая u этой области встрѣчаетъ рядъ ω въ двухъ точкахъ U_1, U_2 ; мы опредѣлимъ теперь, согласно § 11, (17), длину отрезка AB на прямой u , конечныя точки котораго A, B расположены внутри ряда ω , равенствомъ

$$\langle AB \rangle = k \log \left(\frac{AU_1 \cdot BU_2}{AU_2 \cdot BU_1} \right);$$

за „отрезокъ“ AB мы принимаемъ здѣсь, тотъ изъ двухъ классовъ, опредѣляемыхъ на прямой u точками A и B , всѣ точки котораго расположены внутри ряда ω . Ангармоническое отношеніе здѣсь нужно составлять въ смыслѣ проективной метрики, которая, съ нашей точки зрѣнія, представляетъ собой, такъ сказать, первичную метрику и лежитъ въ основѣ такъ называемой абсолютной метрики гиперболической геометріи.

Впрочемъ, не мѣшаетъ сравнить эти соображенія съ тѣмъ изложеніемъ гиперболической метрики, которое приведено въ § 11 и ставить ее въ зависимость отъ Евклидовой метрики ⁶⁴⁾. Изъ построеній абсолютной системы измѣренія отрезковъ мы приведемъ только самую необходимую, именно — построенія, служащая для передвиженія отрезковъ по прямой линіи, — главнымъ образомъ, съ тою цѣлью,



Фиг. 13.

чтобы вновь показать, что длина отрезка представляетъ собой величину, зависящую только отъ масштаба и отъ опредѣленія равенства. Согласно

⁶⁴⁾ Въ § 11, при изложеніи гиперболической геометріи въ сѣти сферъ, было указано, какъ въ этой геометріи должно выражаться разстояніе между двумя точками; мы пришли тогда къ тому же выраженію, которое приведено здѣсь въ текстѣ. Но самая сѣть была взята въ Евклидовомъ пространствѣ, и все изслѣдованіе предполагало, такимъ образомъ, Евклидову геометрію. Здѣсь вопросъ стоитъ иначе: установивъ проективную координацію, мы выбираемъ произвольно рядъ второго порядка, на которомъ сосредоточиваемъ бесконечно удален-

определению длины $\langle AB \rangle$, отрезок $\langle .AB \rangle$ равен другому отрезку $\langle .A'B' \rangle$ на прямой u , если точки A, B имеют относительно точек U_1, U_2 то же ангармоническое отношение, что и точки A', B' , так что

$$\bar{U}_1.ABU_2 \bar{\cap} U_1.A'B'U_2.$$


Если мы спроектируем отрезок AB из точки S ряда ω на этот самый ряд (см. фиг. 83), а полученные точки $A''B''$ вновь спроектируем из какой-либо точки ряда T на прямую u , то $\langle AB \rangle = \langle A'B' \rangle$, так как точки U_1, A, B, U_2 расположены перспективно относительно пучка S ; этот последний связан проективно с пучком T ⁶³⁾, который, в свою очередь, расположен перспективно относительно точек $U_1A'B'U_2$. Можно без труда убедиться, что к точкам U_1 и U_2 нельзя придти конечным числом равных шагов в смысле этого мѣроопределения. Два отрезка $\langle AB \rangle$ и $\langle A'B' \rangle$ на двух различных прямых u и u' с недоступными точками U_1, U_2 и U_1', U_2' равны, если $\bar{U}_1ABU_2 \bar{\cap} U_1'A'B'U_2'$ (см. фиг. 84).

Чтобы получить точку B' , когда даны точки A, B и A' , мы проектируем точку A' из точки пересечения S прямых U_1U_1' и U_2U_2' на прямую U_1U_2' в точку A'' ; затем находим точку пересечения T прямых U_2U_2' и $A''A$ и точку пересечения B'' прямых TB и U_1U_2' ; прямая SB'' сечет прямую u' в искомой точке B' . Ясно, что

$$\langle AB \rangle = \langle A''B'' \rangle = \langle A'B' \rangle.$$

Легко убедиться, что геометрическое место точек B , имеющих от неподвижной точки A определенное расстояние a ,

воспроизводится пересечением двух проективных пучков; гиперболическая окружность представляет собой, следовательно, ряд второго порядка.



Фиг. 84

ния точки прямых; вместе с тем мы изучаем лишь то многообразие (если угодно, то пространство), которое составлено из точек, расположенных внутри выбранного ряда; расстояние между двумя точками этого пространства мы определяем приведенной в текст формулой. Мы должны, однако, сказать, что этот вопрос изложен автором, на наш взгляд, слишком скато; мы не имеем возможности развить все соображения, которые необходимы, чтобы эту теорию пополнить, а потому ограничиваемся этим замечанием.

⁶³⁾ Ибо мы можем смотреть на наш ряд, которому принадлежат точки U_1, A'', B'', U_2 , как на образованный проективными пучками S и T .

Подробное изложение важнейших элементарных построений двух неевклидовых геометрий с точки зрения проективной геометрии дань М. Гроссманъ^{*)}; авторъ пользуется, правда, координатами, но большинство построений ясно и безъ всякихъ вычислений.

Мы не хотѣли бы опустить случая указать на интересное различіе этой системы гиперболической геометрии по сравненію съ нашимъ осуществленіемъ послѣдней въ сферической сѣти: именно, двѣ прямыя, которая не пересѣкаются со внутренней стороны ряда ω , всегда имѣютъ съ внѣшней стороны ряда точку пересѣченія, къ которой нельзя придти, исходя отъ внутренней точки ряда конечнымъ числомъ шаговъ, равныхъ между собой съ точки зрѣнія проективной метрики. Итакъ, здѣсь идеальными точками пересѣченія служатъ дѣйствительныя точки, между тѣмъ какъ въ сферическомъ типѣ гиперболической геометрии онѣ были мнимыми.

10. Метрика въ параболической геометрии несравненно проще, нежели въ гиперболической. Параболическая (Евклидова) скала на прямой n есть скала проективная, соответствующая такому (воображаемому) выбору недоступной точки U прямой n , которое устанавливается средствами чисто эмпирическаго характера. Именно, мы утверждаемъ прежде всего слѣдующее: если на прямой n даны двѣ пары точекъ A, B и A', B' , то на ней всегда можно установить проективное мѣроопредѣленіе такъ, что отрѣзки AB и $A'B'$, съ точки зрѣнія этой метрики, будутъ равны. Въ самомъ дѣлѣ, прежде всего мы можемъ распорядиться обозначеніями двухъ точекъ A' и B' такимъ образомъ, чтобы двѣ пары A, B' и A', B другъ друга не раздѣляли; пусть далѣе M и X будутъ двѣ точки, которыя, въ этомъ предположеніи дѣлать гармонически какъ пару A, B' , такъ и пару B, A' ; каждая изъ этихъ двухъ точекъ можетъ быть принята за основную бесконечно удаленную точку. Для построения точекъ M и X необходимо располагать рядомъ второго порядка ϵ , находящимся въ какой-либо плоскости, проходящей черезъ прямую n . Пусть $\alpha, \alpha', \beta, \beta'$ будутъ проекціи точекъ A, A', B, B' изъ какой-либо точки S ряда ϵ на этотъ самый рядъ; тогда M и X суть точки пересѣченія прямой n съ прямыми $S\mu$ и $S\nu$, соединяющими точку S съ тѣми двумя точками μ и ν ряда ϵ , которыя дѣлать гармонически какъ пару α, β' , такъ и пару α', β (фиг. 85). Самыя точки μ и ν лежатъ въ пересѣченіи ряда ϵ съ прямой XZ , соединяющей точку пересѣченія X прямыхъ $\alpha\alpha'$ и $\beta\beta'$ съ точкой пересѣченія Z прямыхъ $\alpha\beta$ и $\alpha'\beta'$. Въ самомъ дѣлѣ, согласно предложенію 6 § 17-го, касательныя къ ряду въ точкахъ α' и β пересѣкаются на прямой XZ въ точкѣ γ ; эта точка представляетъ собой полюсъ прямой $\alpha'\beta$ и потому вмѣстѣ съ точкой пе-

*) M. Grossmann. „Die fundamentalen Konstruktionen der Nichteuklidischen Geometrie“, Beilage zum Programm der Thurgauischen Kantonsschule, 1903/04.

ресе́ченія c прямы́х XZ и $a'\beta$ дѣлитъ гармонически пару μ, ν . Двѣ пары точекъ a', β и μ, ν проектируются изъ точки a' двумя парами лучей $a'\gamma, a'\beta$ и $a'\mu, a'\nu$, которыя, слѣдовательно, проходятъ черезъ точки γ, c и μ, ν , а потому дѣлятъ другъ друга гармонически. Такимъ образомъ, точки μ и ν дѣйствительно дѣлятъ гармонически какъ пару a', β , такъ и пару β', a .—Если теперь двѣ пары точекъ A, B и A', B' другъ друга также не раздѣляютъ, то существуетъ и такая пара точекъ K и L , которая дѣлитъ гармонически эти послѣднія пары точекъ. Проектируя эту пару изъ точки S на рядъ второго

порядка, мы вновь получаемъ двѣ точки x и z , которыя дѣлятъ гармонически какъ пару a, β , такъ и пару a', β' и лежатъ на прямой XU , соединяющей точку X съ точкой пересѣченія U прямы́х $a\beta'$ и $a'\beta$. Если бы прямая YZ имѣла съ рядомъ двѣ общія точки λ, ρ , то послѣднія раздѣляли бы гармонически какъ пару a, a' , такъ и пару β, β' ; вмѣстѣ съ тѣмъ на прямой u существовали бы двѣ точки P, R , которыя дѣлили бы гармонически какъ пару A, A' , такъ и пару B, B' . Но это невозможно, ибо точкѣ A отвѣчаетъ только одна изъ



Фиг. 85.

точекъ A, B, B' (скажемъ, A'), которая вмѣстѣ съ нею дѣлитъ остальные двѣ точки; и эти двѣ пары не могутъ дѣлиться гармонически одной и той же третьей парой; напротивъ, на двѣ пары, которыя другъ друга не раздѣляютъ, четыре точки A, B, A', B' распадается двояко, чему соответствуютъ двѣ пары, производящія гармоническое дѣленіе. Такимъ образомъ, на двухъ изъ числа трехъ прямы́хъ XU, YZ, ZX должны лежать точки ряда ϵ , третья же не пересѣкаетъ ряда ϵ вовсе. Такъ какъ XU, YZ есть полярный треугольникъ, то мы попутно получили слѣдующій результатъ: изъ сторонъ полярнаго треугольника нѣкотораго ряда второго порядка всегда имѣется одна, которая не встрѣчаетъ ряда. Возвращаясь теперь къ отрезкамъ AB и $A'B'$, допустимъ, что они были при помощи циркуля взяты „равными“ въ эмпирическомъ

смыслъ слова. Если мы теперь станемъ искать ту пару точекъ M, N , которая дѣлится гармонически какъ пару A, B' , такъ и пару A', B , то лучи $S\mu$ и $S\nu$, направленныя къ точкамъ M, N будутъ существовать и въ этомъ случаѣ, но одинъ изъ этихъ лучей не встрѣтитъ прямой l на доступномъ разстояніи. Эта покаместъ только эмпирически недоступная точка есть „бесконечно удаленная“ точка прямой въ параболической геометріи; если мы примемъ ее за точку A_∞ проективной скалы, то она будетъ бесконечно удаленной точкой также съ точки зрѣнія этого мѣроопредѣленія *). При этомъ нужно обратить вниманіе на то, что для нашихъ построений въ области проективной скалы всегда достаточно имѣть двѣ прямыя v и w , относительно которыхъ извѣстно, что онѣ проходятъ черезъ точку A_∞ ; самая же точка A_∞ можетъ лежать внѣ площади нашего чертежа, ибо при производствѣ сложения и перемноженія отрезковъ мы пользовались точкой A_∞ только чрезъ посредство прямыхъ v и w . Но одинъ лучъ, идущій къ точкѣ A_∞ , представляетъ собой $S\nu$; выбирая же иначе точку S на рядѣ ε , мы легко получимъ второй такой же лучъ. Такимъ образомъ, всѣ условія, необходимыя для практическаго производства построений, налицо.

11. Параболическое измѣреніе отрезковъ, какъ проективное, отличается простотой, пока рѣчь идетъ только объ измѣреніяхъ на одной и той же прямой. Напротивъ, перенесеніе единицы мѣры съ одной прямой на другую, какъ мы видѣли въ § 5, дѣло довольно затѣливое. Какъ мы уже не разъ указывали, любой рядъ второго порядка ε можетъ быть абстрактно принятъ за окружность; пусть это будетъ тотъ рядъ, о которомъ шла рѣчь въ предыдущемъ пунктѣ. Произвольную точку въ плоскости окружности, изъ которой къ ней нельзя провести касательныхъ, нужно принять за центръ: „радіусы“, выходящіе изъ точки O , мы принимаемъ за равные, опредѣливъ предварительно „отрезки“, выходящіе изъ точки O путемъ выключенія той точки, которая совокупно съ O дѣлится гармонически рядъ ε .

Эти выключенныя точки лежатъ, слѣдовательно, на одной прямой — полярѣ ω точки O относительно ряда ε ; она называется „бесконечно удаленной“ прямой плоскости. Она опредѣляетъ на каждой прямой ту точку, которая на ней должна играть роль бесконечно удаленной основной точки (проективнаго) измѣренія отрезковъ. Прямыя, имѣющія одну и ту же бесконечно удаленную точку, называются параллельными. Строго сохраняя понятія и посылки параболической геометріи, можно уста-


*) Сообразно этому, проективная точка зрѣнія на параллелизмъ можетъ быть формулирована такъ: параллельныя прямыя также имѣютъ точку пересѣченія, но послѣдней нельзя достигъ конечнымъ числомъ равныхъ (съ точки зрѣнія параболической метрики) шаговъ.

новить метрику такимъ образомъ, чтобы произвольно выбранная двѣ прямая оказались параллельными. При другомъ выборѣ трехъ основныхъ точекъ „обыкновенная“ бесконечно удаленная точка прямой Евклидовой геометріи естественно имѣетъ конечное разстояніе отъ нулевой точки. Пока мы не вводимъ метрики, нѣтъ „близкихъ“ и „далекихъ“ разстояній, ибо — это суть понятія метрическія, не содержащая въ себѣ ничего абсолютнаго; они имѣютъ только относительное содержаніе, зависящее отъ принятой единицы мѣры и отъ законовъ той метрики, которой мы въ тотъ или въ другой моментъ пользуемся. Въ геометрическомъ представленіи наивнаго человѣка практической жизни вмѣстѣ съ отрѣзкомъ фиксируется и его длина. Но что и въ научной разработкѣ геометріи эмпиризмъ играть гораздо большую роль, чѣмъ мы склонны это признавать, въ этомъ мы убѣждаемся повседневно. — На двухъ параллеляхъ ll , l' двѣ другія параллели той же плоскости, которыя не параллельны первымъ, отсѣкаютъ равные отрѣзки. Это должно служить опредѣленіемъ⁶⁶⁾. Если два параллельныхъ отрѣзка равны третьему параллельному имъ отрѣзку, то они равны между собой; въ этомъ легко убѣдиться, основываясь на теоремѣ Дезарга о перспективныхъ треугольникахъ. Къ построениямъ, служащимъ для передвиженій отрѣзка вдоль прямой и для перенесенія отрѣзка на параллельную прямую, присоединяется, въ качествѣ третьяго основного построенія, вращеніе отрѣзка при помощи окружности ϵ . И здѣсь теорема Дезарга обнаруживаетъ, что два отрѣзка, равные третьему, равны между собой, когда эти три отрѣзка лежатъ на трехъ различныхъ прямыхъ, проходящихъ черезъ центръ O окружности ϵ , а вращеніе опредѣлено приѣмомъ, указаннымъ на фиг. 6.

12. Если измѣреніе отрѣзковъ въ параболической геометріи, по существу своему, представляетъ проективное мѣроопредѣленіе, устанавливающее разъ на всегда выключенныя точки, то измѣреніе угловъ въ Евклидовой геометріи покоится на совершенно иныхъ основныхъ положеніяхъ, которыя только и объясняются живымъ участіемъ непосредственнаго воззрѣнія въ ходѣ развитія геометріи. Что отрѣзки могутъ быть больше *вѣжаго* разстоянія, какое только можетъ охватить нашъ взглядъ, — это одно изъ наиболѣе древнихъ, наиболѣе естественныхъ приобрѣтеній нашего опыта; земля представляется наивному человѣку неизмѣримо большой;

⁶⁶⁾ При помощи предыдущихъ соглашеній установлены условія равенства отрѣзковъ, если таковыя расположены на прямыхъ, проходящихъ черезъ центръ O основной „окружности“; для того, чтобы было возможно сравнивать отрѣзки, лежаще на произвольно выбранныхъ прямыхъ, нужно еще установить условія равенства отрѣзковъ на параллельныхъ прямыхъ, нужно установить „правило параллельнаго перенесенія“. Это и достигается соглашеніемъ, приведеннымъ въ текстѣ, считать отрѣзки, расположенныя на параллельныхъ прямыхъ равными, если они расположены въ то же время между параллельными прямыми.

единица же меры составляет, примерно, один его шаг. Иначе обстоит дело с углом. Все угловое пространство, окружающее точку O , мы охватываем одним взглядом; его величина должна, „следовательно“, быть конечной; и подобно тому, как наивный ум вбрызгивает в абсолютную длину, он вбрызгивает также в абсолютную величину угла. Естественное подразделение углового пространства, окружающего данную точку O на четыре равные части, образуют две взаимно перпендикулярные (в эмпирическом смысле слова) прямые; глаз не обнаруживает никакого преимущества какой-либо одной из этих частей перед другой. Но подобно тому, как угловое пространство подходящей системой измерения углов было сделано конечной величиной, можно было бы и длину прямой линии сделать конечной при соответственном выборе системы измерения. Равенство углов мы определили в § 5 при помощи приема, который ясно виден на фиг. 8. Если, в смысле этого определения, при измерении углов дугами $AB = A''B''$ и $A'B' = A''B''$, т. е. $AB \parallel BA''$ и $A'B'' \parallel B'A'$ (фиг. 86), то в шестиугольнике Паскаля $AB'A''BA''B''$ точки пересечения противоположных сторон AB'' и BA'' , а также $A'B''$ и $B'A''$, лежат на бесконечно удаленной прямой; на той же прямой лежит, следовательно, точка пересечения сторон третьей пары; поэтому и угол $AB = A'B'$; иными словами: если из трех углов, имеющих общую вершину, два равны третьему, то они равны между собой.



Фиг. 86.

Чтобы остаться при фигуре § 5-го, мы пользовались действительной окружностью и действительным центром. Но уже самое то обстоятельство, что доказательство дала нам теорема Паскаля, обнаруживает, что и при помощи любого ряда второго порядка можно было бы установить систему измерения углов, по принципам Евклидовой системы, свободную от всякого противоречия, но с той разницей, что углы, „равные“ в смысле этой метрики, не были бы равны в эмпирическом смысле слова.

Как мы видим, научно обосновать Евклидову метрику не так просто, как гиперболическую (и эллиптическую). Но недостаток симметрии этой системы, обусловливаемый тем, что она отказывается от принципа двойственности, щедро возмещается ей большим практическим значением. Деление отрезка на произвольное число равных частей в Евклидовой геометрии, благодаря проективному характеру системы измерения отрезков одной и той же прямой, с точностью вы-

...

полняется циркулемъ и линейкой; между тѣмъ въ обѣихъ неевклидовыхъ геометріяхъ эта задача столь же сложна, какъ дѣленіе на произвольное число равныхъ частей угла въ Евклидовой геометріи. Но зато въ Евклидовой геометріи исчисленіе угловъ представляетъ собой предметъ особой дисциплины, тригонометріи, между тѣмъ какъ въ чисто проективной метрикѣ отръзки и углы измѣряются по совершенно одинаковымъ законамъ.

Этимъ мы должны закончить настоящее изслѣдованіе и относительно другихъ напрашивающихся здѣсь вопросовъ ограничиться указаніемъ литературы.

§ 19. Приложение: литературныя указанія.

Такъ какъ статья большой „Энциклопедіи Математическихъ наукъ“ объ основаніяхъ геометріи еще не появилась, то нижеслѣдующія литературныя указанія, полагаемъ, будутъ полезны ⁶⁷⁾. Впрочемъ, эти указанія, отнюдь не претендуютъ на полноту. Сочиненій, цитированныхъ въ текстѣ, мы здѣсь уже не называемъ.

1. Сочиненія библиографическія.

Libellus post saec. quam Jo. Bolyai de Bolya anno 1802, a D. Claudiopoli natus est ad celebrandam memoriam eius immort. . . editus, Claudiopoli, 1902. (перечень всѣхъ сочиненій по неевклидовой геометріи).

Bonola, Bibliografia sui fondamenti della geometria noneuclidea. Bollettino di bibliografia e storia delle scienze matematiche, съ 1899 г.

E. Wölffing, Mathematischer Bücherschatz, I. Teil, Leipzig 1903. (Keine Zeitschriften!).

См. въ частности: Abt. 2. Philosophie der Mathematik. Abt. 139. Prinzipien der Geometrie. Abt. 140. Parallelen-theorie. Abt. 141. Nichteuclidische Geometrie. Abt. 142. *n*-dimensionale Geometrie.

2. Исторія и изслѣдованія основъ геометріи.

Tropfke, Geschichte der Elementar-Mathematik, 1902 и 1903.

Simon, M., Euklid und die sechs planimetrischen Bücher. Leipzig 1901.

Reye, Th., Die synthetische Geometrie im Altertum u. in der Neuzeit. Strassburg 1899. (2. Aufl.).

Kewitsch, G., Zweifel an der astronomischen u. geometrischen Grundlage des 60-Systems. Zeitschr. f. Assyriologie, 18, (1904), S. 73.

Stäckel u. Engel, Die Theorie der Parallellinien von Euklid bis Gauss. Leipzig 1895.

Stäckel u. Engel, Urkunden zur Geschichte der Nichteuclidischen Geometrie. Leipzig. 1899.

Schmidt u. Stäckel, Briefwechsel zwischen Gauss u. Bolyai. Leipzig. 1899.

Stäckel, P., Untersuchungen a. d. absoluten Geometrie. Aus Joh. Bolyais Nachlass Math. u. Nat. Ber. Ungarn, 18. Bd. 1902.

Baltzer, R., Die Elemente der Mathematik. Leipzig. 1883. Цѣнныя историческія замѣтки.

⁶⁷⁾ Въ настоящее время эта статья уже вышла въ свѣтъ; но въ виду того, что большой энциклопедіей въ Россіи имѣютъ возможность воспользоваться лишь немногіе, мы сочли нужнымъ всѣ эти указанія сохранить.

3. Теорія познання математики съ философской точки зрѣнія.

- Wundt, W., Logik. 2 Aufl. Stuttgart. 1893.
 Cassirer, E., Leibniz, System in seinen wissenschaftlichen Grundlagen. Marburg. 1902.
 Stumpf, Über den psychologischen Ursprung der Raumvorstellung. 1873.
 Lipps, G. F., Untersuchungen über d. Grundlagen der Mathematik. Wundts Philos. Studien, Bd. 9.
 Erdmann, Die Axiome der Geometrie, eine philos. Untersuchung der Riemann-Helmholtzschen Raumtheorie. Leipzig. 1877.
 Baumann, Die Lehren von Raum, Zeit u. Mathematik. 1868/69.
 De Tilly, Sur divers points de la philosophie des Sciences mathématiques. Classe des sciences de l'Ac. R. de Belgique (1901).
 De Tilly, Essai sur les principes fondamentaux de la géométrie et de la mécanique, Mémoires de la Société des sciences phys. et nat. de Bordeaux, 2^{ème} série, t. 3. 1878.

4. Теорія познання математики съ математической точки зрѣнія.

- Ricci, Greg., Anfänge u. Entwicklung der neueren Auffassungen der Grundlagen der Geometrie. Jahresber. d. Deutschen Math.-Ver. 1902.
 Rosanes, J., Charakteristische Züge in der Entwicklung der Mathematik des 19. Jahrhunderts. Breslau. 1903.
 Wilson, E. B., The so-called Foundations of Geometry. Arch. d. Math. u. Phys. (3) 6, 104—123.
 Klein, F., Anwendung der Differential- und Integralrechnung auf Geometrie; eine Revision der Prinzipien. Autograph. Vorlesung (1902).
 См. также рецензію: Th. Vahlen, Arch. d. Math. u. Phys. (3), 7, 166—170.
 Klein, F., Gutachten betreffend den dritten Band der Theorie der Transformationsgruppen von S. Lie. Phys.-math. Ges. Kasan 1897. Abgedruckt: Math. Ann. 50.
 Klein, F., Über Arithmetisierung der Mathematik. Göttinger Nachr. 1895.
 Hölder, Anschauung und Denken in der Mathematik. Leipzig 1900.
 Hessenberg, G., Über die kritische Mathematik. Arch. d. Math. u. Phys. (3), 7, Anhang, p. 21.
 Poincaré, H., Wissenschaft u. Hypothese. Deutsch von F. und L. Lindemann. Leipzig. 1904.
 Въ оригиналь: „La Science et l'hypothèse“. Въ русскомъ переводѣ: Г. Пуанкаре, „Наука и гипотеза“. СПб. 1906.
 Poincaré, H., Der Wert der Wissenschaft Deutsch von E. und H. Weber. Leipzig. 1906.
 Въ оригиналь: H. Poincaré La valeur de la Science. Въ русскомъ переводѣ: Г. Пуанкаре. „Цѣнность науки“.
 Liebmann, H., „Nichteuklidische Geometrie“. Leipzig. 1905. (Sammlung Schubert. XLIX).
 Vahlen, K. Th. Abstrakte Geometrie. Leipzig. 1905.
 Couturat, E., Principes des mathématiques. Paris. 1906.

5. Работы въ направленіи Больэ и Лобачевского.

- Stäckel, P., Johann Bolyais Raumlehre. Math. u. Nat. Ber. Ungarn. 19. Bd. 1903.
 Kúrschák, J. u. Stäckel, P., Johann Bolyais Bemerkungen über Nicolaus Lobatschewskys geometrische Untersuchungen zur Theorie der Parallellinien. Math. u. Nat. Ber. Ungarn, 18. Bd., 1902.
 Engel, Fr. N. I. Lobatschewsky, Zwei geometrische Abhandlungen, aus dem Russischen übersetzt, mit Anmerkungen u. einer Biographie des Verfassers, Leipzig. 1898/99.
 Simon, M., Zu den Grundlagen d. Nichtenklidischen Geometrie. Strassburg. 1891.

- Здѣсь обращено особенное вниманіе на физиологическую сторону этой задачи, а потому эта книга можетъ быть отнесена также и къ отдѣлу № 6.
- Simon, M., Die Elemente der Geometrie mit Rücksicht auf absolute Geometrie. Strassburg. 1890.
- Simon, M., Elementargeometrische Ableitung der Parallelenkonstruktion in der abs. Geometrie. Journ. f. r. u. a. Math. Bd. 107, Heft 1.
- Simon, M., Die Geometrie der Zwischenebene. Jahresber. d. Math.-Ver. VII, 1.
- Simon, M., Die Trigonometrie der abs. Geom. Journ. f. r. u. a. Math. Bd. 109, Heft 3.
- Liebmann, H., Winkel und Streckenteilung in der Lobatschewskyschen Geometrie. Arch. d. Math. u. Phys. (3), 5, p. 213.
- Liebmann, H., Рядъ важныхъ статей въ журналѣ: „Leipziger Sitzungsberichte“.
- Stäckel, P., Zur Nichteuclidischen Geometrie. Arch. d. Math. u. Phys. (3), 3, p. 187.
- Engel, Fr., Zur Nichteuclidischen Geometrie. Leipzig. 1898.
- Gauss, Werke, Bd. 8.

6. Работы въ направленіи Римана-Гельмольца.

- Riemann, B., Über die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen. Göttingen. 1854 (Werke, 2. Aufl. XIII, см. также XXII).
- Helmholtz, Über die Tatsachen, die der Geometrie zu Grunde liegen. Nachr. Kgl. Ges. Wiss. Göttingen, Bd. 2. Braunschweig 1868.
- Helmholtz, Über den Ursprung u. d. Bedeutung der geometrischen Axiome. Vorträge u. Reden, Bd. 2. Braunschweig. 1884.
- Beltrami, Saggio di interpretazione della geometria noneuclidea. 1868.
- Beltrami, Teoria fondamentale degli spazii di curvatura costante. Annali di Mat., ser. II, 2. Bd. (1868).
- Lie, S., Theorie der Transformationsgruppen. 3. Absch., V. Abt. Leipzig 1893.
- Russell, R. A. W., An. Essay on the foundations of geometry, Cambridge 1897; см. принадлежащую Штекелю (Stäckel) рецензію французскаго перевода, сдѣланнаго A. Cadenat Arch. f. Math. u. Phys., (3) IV, S. 140 ff.
- Brill, Bemerkungen über pseudosphärische Mannigfaltigkeiten von drei Dimensionen. Math. Ann. 26.
- Schur, F., Über die Deformation der Räume konstanten Riemannschen Krümmungsmasses. Math. Ann. 27, S. 163—176 u. 537—567.
- Schur, F., Über den Zusammenhang der Räume konstanten Riemannschen Krümmungsmasses mit den projektiven Räumen. Math. Ann. 27, S. 537 ff.
- Voss, Zur Theorie des Riemannschen Krümmungsmasses. Math. Ann. 16.
- Monro, S., On flexure of spaces. Proc. Lond. Math. Soc. 9, p. 171 ff.
- Schwarzchild, Über das zulässige Krümmungsmass des Raumes. Vortrag auf der Versammlung der Astr. Ges. Heidelberg. 1900.

7. Системы Евклидовой геометріи (Руководства)⁶⁶⁾.

- Veronese, Elementi di Geometria. Padova 1897.
- Veronese, Grundzüge der Geometrie, deutsch von Schepp.
- Peano, Sui fondamenti della Geometria. Rivista di Matematica, vol. IV (1894).
- Ingrami, Elementi di Geometria per le scuole secondarie superiori. Bologna 1899.

⁶⁶⁾ См. также В. Каганъ. Основанія геометріи Томъ I. Опытъ обоснованія Евклидовой геометріи. Томъ II. Историческій очеркъ развитія ученія объ основаніяхъ геометріи (изданіе распродано).

- Pieri, Della geometria elementare come sistema ipotetico deduttivo. Mem. della Acc di Torino 1899.
- Enriques, Questioni riguardanti la geometria elementare. Bologna. 1900.
- G. Veronese, Nozioni elementari di Geometria intuitiva ad uso dei ginnasi inferiori. Verona-Padova. 1901.
- Thieme, Die Umgestaltung der Elementargeometrie. Progr.-Abh. Posen. 1900
- Литературная указания относительно теории подобия и учения объ измѣреніи поверхностей и объемовъ мы считаемъ болѣе подходящимъ привести при изложеніи планиметрии и стереометрии.

8. Проективная геометрія и проективная метрика.

- Sauley, A sixth memoir upon quantities. Phil. Trans., vol. 149 (1859); Coll. pap. vol. 2
- Salmon-Fiedler, Analytische Geom. d. Kegelschnitte, II. Bd., Kap. XX.
- Klein, F., Arbeiten über Nichteuclidische Geometrie: Math. Ann. 4 (1871), S. 573 — 625; 5 (1873), S. 112—145; 6 (1873), S. 112; 7 (1874), S. 531—537; 37 (1890). S. 544—572.
- Darboux, Math. Ann. 17.
- Klein, Vorlesungen über Nichteuclidische Geometrie (литографированныя лекціи).
- Killing, Die Nichteuclidischen Raumformen in analytischer Behandlung. Leipzig 1885.
- Полное изложеніе всѣхъ трехъ геометрій съ проективной точки зрѣнія даетъ:
- Clebsch-Lindemann, Vorlesungen über Geometrie, Bd. II, Teil 1. Leipzig 1891.
- Schor, D. Neuer Beweis eines Satzes aus den „Grundlagen der Geometrie“ von Hilbert. Math. Ann. 58, S. 427.
- Wiener, H., Über die Grundlagen u. den Aufbau der Geometrie. Jahresber. Deutsch. Math.-Ver. Bd. I, S. 45 ff. u. Bd. III, S. 70 ff.
- Schur, F., Über den Fundamentalsatz der projektiven Geometrie. Math. Ann. 51.
- Schur, F., Lehrbuch der analytischen Geometrie. Leipzig 1898.
- Zeuthen, Sur le fondement de la Géometrie projective. Comptes rendus. 1898, p. 213.
- Hessenberg, G., Desarguesscher Satz u. Zentralkollincation. Arch. d. Math. u. Phys. (3), 6, S. 123—128.
- Hessenberg, G., Über die projektive Geometrie. Arch. d. Math. u. Phys. (3), 5, Anhang, S. 35.
- Hessenberg, G., Über Beweise von Schnittpunktsätzen. Arch. d. Math. u. Phys. (3), 3, S. 121 u. S. 316.

ГЛАВА IV. Планиметрия.

§ 20. Основные предложенія.

1. Геометрія, по Платону *), есть „познаніе вѣчно сущаго“, т. е., въ противоположность механикѣ, астрономіи и физикѣ, это есть познаніе того пространственнаго распорядка, который сохраняется при всѣхъ происходящихъ перемѣнахъ. Это познаніе мы почерпаемъ работой чистой мысли изъ немногихъ основныхъ законовъ и аксіомъ, при посредствѣ которыхъ между основными пространственными образами,—именно, между точками, прямыми и плоскостями,—устанавливаются основныя регулирующія соотношенія. Этихъ основныхъ образовъ достаточно, чтобы при ихъ посредствѣ, помощью чисто отвлеченныхъ опредѣленій, однозначно описывать формы чувственно воспринимаемыхъ нами образовъ и надѣлать ихъ закономѣрностью такъ, чтобы каждый, кому эти формы не были извѣстны, имѣлъ возможность ихъ воспроизвести, исходя только изъ опредѣленій, совершенно независимо отъ опыта; но чувственно воспринимаемая нами форма самихъ основныхъ образовъ не поддается опредѣленію средствами чистаго мышленія. Представленіе о точкѣ, прямой и о плоскости можетъ быть вызвано и передано намъ только при помощи подходящихъ моделей и осуществлять эти идеи лишь весьма несовершенно. — Воззрѣніе, по Платону, есть параклетъ, возбуждающій мышленіе, его подвижной, наводящій помощникъ, часто превосходящій результатъ. Оно находится въ такомъ же отношеніи къ чистому мышленію, какъ, напримѣръ, искусство къ наукѣ; подобно задаткамъ къ искусству, оно поддается развитію и усовершенствованію и уже именно поэтому не представляетъ собой послѣдней инстанціи въ дѣлѣ установленія геометрической истины. Воззрѣніе не можетъ замѣнить мышленія посредствомъ понятій; напротивъ, такое мышленіе должно регулировать воззрѣніе, дѣлать его болѣе точнымъ. Постояннымъ упражненіемъ можно развить въ себѣ способность къ воз-

*) Politeia VII, 527 b; τοὐ γὰρ αἰὲ ὄντος ἡ γεωμετρικὴ γνῶσις ἴστιν.

зрѣнію не только въ области геометріи, но и въ области ариѳметики, графической статики, и физики; безъ него мышленіе было бы безпомощнымъ и бесплоднымъ.

2. Построеніе учебной системы Евклидовой геометріи существенно зависитъ отъ того, какую позицію мы займемъ относительно понятія о параллелизмѣ. Античному опредѣленію, согласно которому параллельными просто называются такія прямыя на плоскости, которыя вовсе не пересѣкаются, въ настоящее время все настойчивѣе противопоставляется проективная точка зрѣнія, согласно которой всѣ безъ исключенія прямыя, расположенныя въ одной плоскости, другъ друга пересѣкаютъ, но что въ случаѣ параллельныхъ линий точка пересѣченія не можетъ быть достигнута конечнымъ числомъ шаговъ, имѣющихъ конечную длину и равныхъ между собой съ точки зрѣнія Евклидовой метрики. Эти двѣ точки зрѣнія старается примирить третья, номиналистическая, которая приписываетъ параллельнымъ прямымъ „несобственную“ точку пересѣченія и этимъ оборотомъ рѣчи достигаетъ законченной закономерности проективной точки зрѣнія, не принимая собственно существованія (въ понятіи) точки пересѣченія. Къ этому нужно прибавить, что признавать абсолютное отсутствіе пересѣченія параллельныхъ линий въ геометріи нѣтъ необходимости, и нигдѣ мы этимъ не пользуемся; всюду мы опираемся только на недоступность точки пересѣченія въ смыслѣ метрики ¹⁾. Съ чисто научной стороны проективная точка зрѣнія на параллелизмъ имѣетъ несомнѣнное преимущество, ибо она проще античной и дѣлаетъ законъ, по которому двѣ прямыя на плоскости всегда пересѣкаются, справедливымъ безъ всякихъ исключеній. Законы же, не допускающіе исключеній, должны, конечно, всегда составлять идеаль науку, основанной на чистыхъ понятіяхъ. Съ проективной точки зрѣнія, параллелизмъ теряетъ всякую тѣнь таинственнаго и непонятнаго, онъ становится одной изъ внутреннихъ составныхъ частей метрики, противъ которой критика теоріи познанія не въ состояніи ничего возразить; аксіома о параллельности спускается на стень правила—установить метрику такимъ образомъ, чтобы нѣкоторой опредѣленной плоскости невозможно было достигъ, слѣдуя прямолинейному пути и исходя изъ какой бы то ни было точки, не принадлежащей этой плоскости, конечнымъ числомъ шаговъ, имѣющихъ при этой метрицѣ равныя длины. Абстрактно такое исключительное положеніе можетъ быть присвоено любой плоскости; въ частности, на каждой прямой за „безконечно удаленную“ можетъ быть принята любая точка, которая съ точки зрѣнія метрики, согласованной съ тѣмъ, что доступно нашему зрѣнію и нашему осозанію, лежитъ на конечномъ отъ насъ раз-

¹⁾ Мы рѣшительно не можемъ съ этимъ согласиться; во всякомъ случаѣ, пужна совершенно иная постановка всей дисциплины, чтобы эта точка зрѣнія была пріемлемою.

стоянии (ср. фиг. 76 въ гл. III). Метрику можно всегда установить такъ, чтобы любое тѣло, ограниченное шестью плоскостями, въ понятіи представляло собой „кубъ“; если заданъ такой „кубъ“, то этимъ конструктивно уже установлена метрика, такъ что мы абстрактно можемъ выполнять совершенно точныя построенія метрическаго характера. Если мы положимъ въ основу послѣднихъ „дѣйствительный“ кубъ, то мы получимъ дѣйствительное Евклидово мѣроопредѣленіе.

3. Съ изложенной точки зрѣнія, аксіома о параллельности представляетъ собой какъ бы вторженіе въ свободу проективной геометріи, отдающее параболической метрику предпочтеніе передъ гиперболической и эллиптической. Какъ было уже выяснено выше въ главѣ III, проективная геометрія имѣетъ возможность собственными средствами воспроизвести всѣ три мѣроопредѣленія. Такимъ образомъ, съ чисто научной точки зрѣнія, проективная геометрія могла бы считаться единственно истинной элементарной геометріей, и ее можно было бы также, пользуясь непрерывностью, изложить вполне элементарно. Но по настоящее время всѣ попытки водворить проективную геометрію на мѣсто традиціонной системы потерпѣли крушеніе; мы вынуждены вслѣдствіе этого отказаться отъ строго научной точки зрѣнія. Въ частности, мы должны отказаться отъ того, чтобы смотрѣть на конгруэнтность и на параллелизмъ, какъ на проблемы, которыя геометрія должна разрѣшить собственными средствами, путемъ построенія собственной метрики; напротивъ, мы всѣ эти вещи постулируемъ, принимая аксіомы Гильберта; строго говоря, требовать при помощи аксіомъ слѣдовало бы только то, чего нельзя ввести, какъ положенія, которыя наша мысль сама ставитъ. При помощи аксіомъ конгруэнтности мы требуемъ того, что можно было бы дать при помощи аксіомъ сопряженія, расположенія (въ проективной модификаціи) и непрерывности; что особенно важно, въ аксіомахъ конгруэнтности, въ частности, коренится основная теорема геометріи положенія. Это отнюдь не находится въ противорѣчій съ тѣмъ, что Гильбертъ въ § 11 своихъ „Основаній геометріи“ доказалъ независимость аксіомъ конгруэнтности. Въ указанномъ мѣстѣ Гильбертъ показываетъ только, что по введеніи его аксіомъ I, II, IV и V, мы еще сохраняемъ почти полную свободу въ выборѣ метрики; если бы мы опустили также аксіому IV, то мы могли бы еще выбирать, между прочимъ, между параболической, эллиптической и гиперболической метрикой. Именно аксіомы III и IV Гильберта подчиняютъ проективную геометрію такимъ требованіямъ, которыя заставляютъ изъ многообразныхъ мѣроопредѣленій, какія могутъ быть построены при помощи остальныхъ аксіомъ, принять одну опредѣленную. Только въ этомъ смыслѣ аксіомы конгруэнтности не зависятъ отъ остальныхъ.

4. Въ аксіомахъ конгруэнтности коренится далѣе и теорема Дезарга, единственное предложеніе плоской проективной геометріи, которое

можетъ быть доказано только при помощи пространственныхъ соображеній. Поэтому планиметрію, къ которой мы теперь обращаемся, возможно обосновать при помощи аксіомъ Гильберта, не покидая плоскости. При этомъ выборъ аксіомъ геометрія оказывается въ такой мѣрѣ подчиненной идеѣ измѣренія, что ее часто опредѣляютъ, какъ науку о пространственныхъ величинахъ. Въ дѣйствительности же, метрическая геометрія представляетъ собой только частный случай чисто проективной геометріи. — Такъ, напримѣръ, въ „Геометріи положенія“ Рейэ предложенія Евклидовой геометріи, опирающіяся на метрическія соображенія, появляются только въ видѣ приложений, и то въ видѣ частныхъ случаевъ гораздо болѣе общихъ теоремъ. Синтетическая геометрія въ своихъ неметрическихъ предложеніяхъ пользуется числомъ, только какъ количествомъ предметовъ (*multitudo*), а не какъ результатомъ измѣренія (*magnitudo* *)); между тѣмъ какъ проективная метрика приводитъ къ высшей, наиболѣе чистой точкѣ зрѣнія на „число“, къ точкѣ зрѣнія строго качественной, которая подчиняетъ себѣ, съ одной стороны, обыкновенное число, а, съ другой стороны, — величину отрѣзка; проективная метрика воспроизводитъ „сумму“, „разность“, „произведеніе“ и „частное“ отрѣзковъ чисто конструктивно, безъ посредства измѣряющихъ ихъ чиселъ, какъ это было показано въ § 18.

5. Гильбертовы аксіомы Евклидовой геометріи перечислены и подробно разобраны въ двухъ первыхъ главахъ. Было бы слишкомъ утомительно, если бы мы попытались развить здѣсь для учебныхъ цѣлей систему элементарной геометріи, удовлетворяющую болѣе строгимъ требованіямъ и основанную только на понятіяхъ; для этого неизбѣжно пришлось бы повторять предложенія, изложенныя въ предыдущихъ параграфахъ, — да и самая система необходимо была бы пространствѣ обыкновенныхъ учебниковъ элементарной геометріи. Къ тому же и самое изслѣдованіе основаній геометріи еще находится въ полномъ ходу, а предложенныя системы еще недостаточно элементарны. Вслѣдствіе этого мы дадимъ лишь краткій рефератъ объ основныхъ предложеніяхъ и только мѣстами, гдѣ это неизбѣжно, войдемъ въ бѣльшія подробности.


Наиболѣе важнымъ слѣдствіемъ аксіомъ расположенія является слѣдующее предложеніе.

Предложеніе 1. Плоскость раздѣляется каждой прямой a , въ ней расположенной, на двѣ области, которыя называются двумя „сторонами“ прямой и обладаютъ слѣдующими свойствами: каждая точка плоскости, кото-

*) Это различіе ведетъ свое начало отъ Лейбница и Ньютона. Лейбницъ подошелъ очень близко къ той качественной точкѣ зрѣнія на число, какъ на систему положеній для выраженія взаимоотношеній, которую мы встрѣтили въ § 18. Ср. *Newton, Arithm. univ., Sect. 1, cap. 2* и сочиненіе Кассирера, цитированное въ § 19.

рая не лежит на прямой a , принадлежит одной и только одной из этих областей; отрезок, соединяющий две точки, принадлежащая одной и той же области, не встречает прямой a ; отрезок же, соединяющий любую точку одной области с любой точкой другой области, встречает прямую a в одной точке.

В самом деле, пусть P_1 будет произвольная точка плоскости, не лежащая на прямой a , и пусть A будет точка этой прямой; в таком случае, согласно аксиоме Π_2 Гильберта, отрезок AP_1 содержит такую точку Q_1 , что точка A не принадлежит отрезку P_1Q_1 . Мы утверждаем, что точки P_1 и Q_1 , в смысле предложения 1-го, принадлежат одной и той же области. Действительно, если R_1 есть такая точка, что отрезок P_1R_1 не встречает прямой a , то и отрезок Q_1R_1 не может встретиться этой прямой (аксиома Π_4 в применении к треугольнику $P_1Q_1R_1$). Если теперь B есть произвольная точка прямой a , хотя бы даже и совпадающая с A , то на прямой P_1B , в силу аксиомы Π_2 , имеется также такая точка P_2 , что точка B принадлежит отрезку P_1P_2 . Такая точка P_2 принадлежит второй области, ибо отрезок P_2R_1 , например, должен встречать прямую a в некоторой точке C , в силу аксиомы Π_4 в ее применении к треугольнику $P_1P_2R_1$; если же точка Q_2 принадлежит той же области, что и P_2 , а, следовательно, отрезок P_2Q_2 не содержит ни одной точки прямой a , то отрезок R_1Q_2 должен иметь с прямой a общую точку (аксиома Π_4 в применении к треугольнику $P_2Q_2R_1$). Таким образом, точки P_1, Q_1, R_1 принадлежат одной, P_2, Q_2 и т. д. — другой области.



Фиг. 87.

В эллиптической геометрии это предложение уже несправедливо; эллиптическая плоскость представляет собой поверхность, возвращающуюся в себя самое, которая прямой линией не разлагается на две раздельные области.

6. Как из аксиом конгруэнтности вытекают основные предложения о конгруэнтности, можно прочесть у Гильберта. Эти предложения гласят:

Два треугольника конгруэнтны, если следующие элементы одного треугольника равны соответственным элементам другого треугольника:


- I. либо две стороны и заключенный между ними угол;
- II. либо сторона и прилежащие два угла;

III. либо три стороны;

VI. либо две стороны и угол, противолежащий большей из них.

Интересное обоснование геометрии без помощи понятия об угле недавно дал Моллеруп (Mollerup)^{*)}; оно сравнительно просто приводит к предложениям о конгруэнтности треугольников. Естественно всего выводить конгруэнтность из симметрии, так как последние имеют происхождение более первичное, нежели конгруэнтность. Мы встречаем ее, как основной принцип строительства у наиболее первобытных народов. На аксиомах симметрии обосновать, между прочим, Пеано^{**)}. Лейбниц вывел теоремы о конгруэнтности треугольников из „аксиомы“, что две фигуры конгруэнтны, если соответственно конгруэнтны части, которыми эти фигуры определяются^{***)}.

7. Параллелизм может быть введен следующими соображениями. В двух точках A и B прямой u возставим перпендикуляры a и b . Если бы последние пересеклись в точке C , которая определяла бы на прямых a и b конечные отрезки CA и CB , то в Евклидовой и



Фиг. 87.

гиперболической геометрии можно было бы подобрать точку C' на прямой a таким образом, чтобы точка A принадлежала отрезку CC' , и чтобы в то же время $AC' \cong AC$. Треугольники BAC и BAC' были бы в таком случае конгруэнтны, ибо $C'A \cong CA$, $AB \cong AB$, $\sphericalangle BAC \cong \sphericalangle BAC'$. Вследствие этого мы имели бы также

$\sphericalangle C'BA \cong \sphericalangle CBA$; эти углы были бы прямыми, а потому отрезок $C'B$ лежал бы на прямой BC . Прямая a и b имели бы в таком случае две точки пересечения, что противоречит Гильбертовой аксиоме I_2 . Однако, этого противоречия не было бы, если бы точка C' совпала с точкой C , так что прямая a и не разделяла бы плоскости, как того требует предложение I п. 6 (эллиптическая геометрия), а также I) если бы точки C и C' были бесконечно удалены²⁾, и наконец, II) если бы прямая a и b вовсе

*) Mollerup, J., Studier over den plane Geometris Aksiomer (Diss.), Kjöbenhavn 1903 und Math. Ann. 58, 479.

**) Peano, Sui fondamenti della Geometria, Rivista di Matematica, vol. IV, 55 (1894).

***) Si determinantia sunt congrua, talia erunt etiam determinata posito scilicet eodem determinandi modo (C. J. Gerhardt, Leibnizens Math. Schriften, V, 172).

²⁾ Мы вынуждены повторить здесь то, на что указывали в предыдущем примечании; вдь Гильберт в аксиомах сопряжения ничего не говорит о конечных и бесконечно больших расстояниях; да он и не может об этом

не пересѣкались. Если точка C лежитъ безконечно далеко, такъ что точки A и C уже не опредѣляютъ отрезка на прямой a , который можно было бы строить по аксиомамъ конгруэнтности, то точку C' нельзя ввести. Случай I) и II) свойственны параболической и гиперболической геометріи. Смотря по тому, положимъ ли мы въ Евклидовой геометріи въ основу ученія о параллелизмѣ проективную или античную точку зрѣнія, будетъ имѣть мѣсто соответственно случай I) или II), а другой будетъ исключенъ. Мы получаемъ, такимъ образомъ, въ Евклидовой геометріи предположеніе:

Предположеніе 2. Двѣ прямыя a и b (въ одной плоскости), перпендикулярныя къ третьей, параллельны.


Это предположеніе допускаетъ въ Евклидовой геометріи обращеніе:

Предположеніе 3. Если изъ двухъ параллельныхъ прямыхъ a и b (въ одной плоскости), первая перпендикулярна къ третьей прямой u , то и вторая перпендикулярна къ послѣдней.

Въ самомъ дѣлѣ, такъ какъ, по аксіомѣ о параллельности, черезъ точку A прямой a не могутъ быть проведены двѣ прямыя a и u , параллельныя прямой b , а между тѣмъ прямая a параллельна послѣдней, то прямая u должна пересѣкать прямую b въ метрически доступной точкѣ B ; вмѣстѣ съ тѣмъ перпендикуляръ b' , возставленный изъ точки B къ прямой u , согласно предположенію 2, параллеленъ прямой a , а потому, согласно аксіомѣ о параллельности, долженъ совпасть съ прямой b .

Предположеніе 4. Двѣ прямыя a и b , перпендикулярныя къ третьей прямой c той же плоскости, параллельны,

ибо онѣ имѣютъ общій перпендикуляръ u . Если поэтому прямыя a и b расположены въ одной и той же плоскости и параллельны, а третья прямая t встрѣчаетъ прямую a въ точкѣ A (см. фиг. 89), то она встрѣчаетъ также прямую b въ нѣкоторой точкѣ B . Если мы опустимъ изъ середины O отрезка AB перпендикуляръ OX на прямую a , то послѣдній, согласно предположенію 3, будетъ также перпендикулярнъ къ прямой b ; пусть Y будетъ точка пересѣченія прямыхъ OX и b . Вмѣстѣ съ тѣмъ прямоугольные треугольники OXA и OYB будутъ конгруэнтны, а потому $\sphericalangle XAO$ (или α) будетъ равенъ $\sphericalangle YBO$ (или β). Эти углы, вслѣдствіе своего расположенія относительно прямыхъ a , b , t , называются внутренними накрестъ лежащими углами.



Фиг. 89.

говорить, такъ какъ для установленія самаго этого понятія уже нужна разработанная метрика. Вообще, такое легкое отношеніе къ безконечно удаленнымъ элементамъ представляеть собой весьма скользкій путь.

Предложение 5. Две параллельныя прямыя при пересѣченіи съ третьей, образуютъ равныя внутренне накрестъ лежащія углы.

Обратно:

Предложение 6. Если углы α и β равны, то линіи параллельны.


Въ самомъ дѣлѣ, если мы черезъ середину O отрезка AB проведемъ прямую и X, Y будутъ точки ея пересѣченія съ прямыми a и b , то

$$\sphericalangle XOA = \sphericalangle YOB, \alpha = \beta, OA = OB;$$

потому $\triangle OXA = \triangle OYB$, $\sphericalangle OXA = \sphericalangle OYB$; если прямая OX перпендикулярна къ прямой a , то она перпендикулярна также къ прямой b , а потому прямыя a и b параллельны (пред. 2.).

Это основныя предположенія ученія о параллельныхъ линіяхъ; непосредственнымъ слѣдствіемъ изъ нихъ является характерное для Евклидовой геометріи предположеніе:

Предложение 7. Сумма угловъ въ треугольникѣ равна $2d$.



Фиг. 90.

Въ самомъ дѣлѣ, черезъ вершину C треугольника ABC (фиг. 90) проведемъ прямую, параллельную основанію AB ; въ такомъ случаѣ углы α и β при вершинѣ C будутъ накрестъ лежащими относительно угловъ CAB и CBA , а потому сумма угловъ, какъ это видно при вершинѣ C , будетъ дѣйствительно равна выпрямленному углу. Если вмѣсто угла α при вершинѣ C

возьмемъ уголъ HCY , вертикальный относительно α , то получимъ:

Предложение 8. Каждый внѣшній уголъ треугольника равенъ суммѣ внутреннихъ, съ нимъ несмежныхъ угловъ:


$$\sphericalangle YCB = \alpha + \beta.$$

8. Чтобы имѣть возможность строить геометрическіе образы, Евклидова геометрія должна стараться возможно скорѣе придти къ окружности, между тѣмъ какъ чисто проективная геометрія выполняетъ основныя свои построенія линейкой, т. е. исключительно при помощи прямой линіи. Окружность опредѣляется, какъ геометрическое мѣсто точекъ на плоскости, отстоящихъ на одно и то же разстояніе отъ нѣкоторой неподвижной точки—ея центра. Графически невозможно воспроизвести окружность исключительно на основаніи этого опредѣленія³⁾. Для этого нужно располагать особымъ инструментомъ,

³⁾ Вообще графически нельзя, конечно, построить ничего, опираясь, исключительно на опредѣленія; для этого всегда потребуется инструментъ.

при помощи которого можно переносить равные отрезки, — циркулем. Однако, выше мы видели, что в плоскости циркуль безусловно необходим только для нанесения одной единственной окружности, при помощи которой остальные окружности воспроизводятся уже исключительно при помощи прямых линий; но даже и в этой окружности циркуль необходим лишь для того, чтобы установить два „взаимно перпендикулярных“ и „равных“ диаметра. По этим частям при помощи одной только линейки можно уже построить окружность; иными словами, по данным диаметрам возможно исключительно при помощи прямых линий построить произвольное число точек и касательных кривой. Если бы мы захотели при развитии геометрии действительно ограничить себя этими требованиями, то мы были бы вынуждены сильно уклониться от установившегося учебного плана геометрии. Мы останемся, поэтому, при приемах Евклида, который предполагает равенство отрезков повсюду на плоскости данным вместо того, чтобы его устанавливать на основании понятий. Окружность „пересекается“ каждой прямой, проходящей через ее центр, в двух точках; это значит, что прямая содержит две точки окружности (аксиома III_1); ограниченный ими отрезок называется „диаметром“, или „поперечником“, окружности, а отрезок от центра до одной из точек окружности называется „радиусом“, или „полупоперечником“.

Прямая u , не проходящая через центр окружности M , также может иметь с окружностью не более двух общих точек. В самом деле, положим, что точка A окружности (фиг. 91) лежит на прямой u , а D есть любая другая точка той же прямой; рассмотрим треугольник $AM'D$, конгруэнтный треугольнику AMD , вершина которого M' расположена по другую сторону прямой u . Существование этого треугольника легко доказать, основываясь на аксиомах конгруэнтности; легко также обнаружить, что прямая MM' перпендикулярна к прямой u ; пусть B будет точка, в которой она пересекает последнюю. Если теперь C есть точка прямой u , отличная от A и расположенная таким образом, что $BC \cong AB$ (аксиома III_1), то треугольник $M'CB \cong M'AB$, а потому $MC = MA$, т. е. C также представляет собою точку окружности, совпадающую с A лишь в том случае, если последняя в свою очередь совпадает с основанием B перпендикуляра MM' . Если бы на прямой u лежала еще одна точка окружности, — скажем, D , — то мы бы имели: $MD \cong MC$, $M'D \cong M'C$,



Фиг. 91.

$MM' \cong MM'$; поэтому треугольник $MCM' \cong MDM'$ по третьему предложению о конгруэнтности треугольников; но въ такомъ случаѣ оказалось бы, что $\sphericalangle BMC \cong \sphericalangle BMD$, что противорѣчитъ аксіомѣ Ш₄, если только точка D не совпадаетъ ни съ A ни съ C . Этимъ, помимо высказаннаго утвержденія, еще доказано, что каждая прямая, которая перпендикулярна къ радіусу въ конечной его точкѣ B , т. е. въ той точкѣ радіуса, которая принадлежитъ окружности, не имѣетъ съ окружностью другихъ общихъ точекъ. Такого рода прямая называется „касательными“, а точка B называется „точкою касанія“. Для окружности (а также и для всѣхъ вообще кривыхъ второго порядка) касательныя могутъ быть опредѣлены просто, какъ прямая, имѣющая съ окружностью одну общую точку. Трудности, съ которыми связано опредѣленіе понятія о касательной, выступаютъ только, когда рѣчь идетъ о кривыхъ болѣе высокаго порядка.

Если бы на нашей фигурѣ отрѣзокъ MB былъ больше радіуса окружности r , то для каждой точки A прямой u , отличной отъ B , во всякомъ случаѣ было бы $MA > r$ ^{*}); это значить: если разстояніе (такъ называютъ перпендикуляръ MB) прямой u отъ центра окружности больше радіуса, то прямая не имѣетъ съ окружностью вовсе общихъ точекъ; если же это разстояніе равно радіусу, то прямая касается окружности. Такимъ образомъ, пересѣченіе можетъ имѣть мѣсто только, если разстояніе меньше радіуса; что въ этомъ послѣднемъ случаѣ пересѣченіе дѣйствительно всегда происходитъ, это доказать не такъ просто. Пусть M будетъ центръ окружности, O основаніе перпендикуляра, опущеннаго изъ точки M на данную прямую u (фиг. 92); положимъ, что $OM < r$. Если K_0 есть конечная точка радіуса MO , и мы отложимъ на прямой u отрѣзокъ $OJ_0 \cong OK_0$, то MJ_0 будетъ больше MO , но все же $MJ_0 < r$, согласно предложению, которое также попутно получается при доказательствѣ о конгруэнтности треугольниковъ и заключается въ томъ, что каждая сторона треугольника меньше суммы двухъ другихъ сторонъ и больше ихъ разности. Если такимъ же образомъ K_1 есть конечная точка радіуса MJ_0 , и на прямой u на продолженіи отрѣзка OJ_0 мы отложимъ отрѣзокъ $J_0J_1 \cong J_0K_1$, то въ силу той же вспомогательной теоремы $MJ_1 > MJ_0 > MO$, но все еще $MJ_1 < r$. Повторяя этотъ рядъ заключеній, мы получимъ на окружности точки K_2, K_3, \dots , а на прямой u отрѣзки $J_1J_2 \cong J_1K_2, J_2J_3 \cong J_2K_3, \dots$, а вмѣстѣ съ тѣмъ

$$MO < MJ_0 < MJ_1 < MJ_2 < MJ_3 < \dots < r. \quad (a)$$

^{*}) Въ силу предложенія, что въ треугольникѣ противъ большаго угла лежить также и большая сторона; это предложеніе выводится совмѣстно съ предложеніями о конгруэнтности треугольниковъ въ качествѣ леммы.

Точно такъ же и для любой другой точки S отрезковъ OJ_0, OJ_1, OJ_2, \dots имѣть мѣсто соотношение $MS < r$. Съ другой же стороны не трудно показать существованіе на прямой u и такихъ точекъ, разстояніе которыхъ отъ M больше, нежели r ; въ самомъ дѣлѣ, прямая, проходящая черезъ точку M параллельно прямой u , какъ диаметръ, должна имѣть съ окружностью двѣ общія точки P и Q ; если мы изъ послѣднихъ опустимъ перпендикуляры PP' и QQ' на прямую u , то въ силу вспомогательнаго предположенія, которымъ мы выше пользовались, $MP' > r$, $MQ' > r$. Если A_0 есть точка прямой u , для которой $OA_0 > OQ'$, то тѣмъ болѣе $MA_0 > r$. На прямой u оказываются, такимъ образомъ, двѣ группы точекъ: „внутреннія“ точки, которыхъ разстоянія отъ M меньше, чѣмъ r , и „внѣшнія“ точки, разстоянія которыхъ отъ M больше, чѣмъ r . Если мы на отрезкѣ OA_0 отложимъ отрезокъ $A_0A_1 \cong A_0I_0$, гдѣ I_0 есть точка окружности, лежащая на радиусѣ MA_0 , то MA_1 будетъ также больше, нежели r , но $MA_1 < MA_0$. Повторяя это построеніе, мы получимъ на прямой u точки A_0, A_1, A_2 , для которыхъ


$$MA_0 > MA_1 > MA_2 > \dots > r \quad (b)$$

Такимъ образомъ, точки J_n и A_n съ возрастаніемъ индекса n приближаются къ одной и той же предѣльной точкѣ λ , для которой $M\lambda = r$. Этотъ результатъ можно съ точностью вывести изъ соотношеній (a) и (b), какъ на основаніи аксіомы Архимеда ⁴⁾, такъ и на основаніи аксіомы Дедекинда.

Но такъ какъ точки пересѣченія прямой съ окружностью въ томъ случаѣ, когда не имѣетъ мѣста касаніе, должны быть парныя, то каждая прямая въ плоскости окружности, разстояніе которой отъ центра меньше радиуса, встрѣчаетъ послѣднюю въ двухъ точкахъ.


9. Двѣ окружности не могутъ имѣть болѣе двухъ общихъ точекъ. Въ самомъ дѣлѣ, если O_1 и O_2 суть центры двухъ окружностей (фиг. 93), а A есть общая точка обѣихъ окружностей, то можно тотчасъ же указать другую общую точку A' : согласно аксіомѣ III_4 , по другую

⁴⁾ Мы полагаемъ, что это можно вывести только при помощи аксіомы Дедекинда, при помощи аксіомы Архимеда этого сдѣлать нельзя.



Фиг. 92.

сторону прямой O_1O_2 существует угол, конгруэнтный углу O_2O_1A ; на его стороне, отличной от O_1O_2 , имеется такая точка A' , что $O_1A' \cong O_1A$. В таком случае, согласно первой теореме о конгруэнтности треугольников, имеем $O_1A'O_2 \cong O_1AO_2$, и потому не только



Фиг. 93.

$O_1A' \cong O_1A$, но и $O_2A' \cong O_2A$; иными словами, точка A' лежит на обеих окружностях. Этот вывод теряет свою силу только в том случае, если O_1AO_2 не есть треугольник; если, следовательно, точка A лежит на прямой O_1O_2 . Обратно, если A'' есть произвольная точка, которая одновременно принадлежит обеим окружностям (сверх точек A и A'), то, в силу третьей теоремы о конгруэнтности треугольника, должны быть конгруэнтны треугольники O_1AO_2 , $O_1A'O_2$, $O_1A''O_2$. Точка

A'' должна лежать по одну сторону прямой O_1O_2 либо с точкой A , либо с точкой A' (предложение 1). Мы можем принять первое; тогда равенства

$$\sphericalangle O_2O_1A'' \cong \sphericalangle O_2O_1A \quad \text{и} \quad \sphericalangle O_1O_2A'' \cong \sphericalangle O_1O_2A$$

возможны только в том случае, если прямая O_1A'' совпадает с прямой O_1A , а прямая O_2A'' — с прямой O_2A , что и требовалось доказать. Если точка A лежит на прямой O_1O_2 , то перпендикуляр, возставленный из точки A к этой прямой, перпендикулярен к радиусам O_1A и O_2A , а потому касается обеих окружностей; в этом случае говорят, что обе окружности соприкасаются в точке A . Обратно, если две окружности соприкасаются, т. е. имеют одну и только одну общую точку, то точка соприкосновения лежит на прямой, соединяющей центры, — на «линии центров», и общая касательная перпендикулярна к линии центров. В силу известной теоремы о сторонах треугольника мы получаем:

Предложение 9. Если две окружности пересекаются, то линия центров меньше суммы и больше разности радиусов обеих окружностей и обратно.

Не так легко, однако, доказать обратную теорему. Если линия центров C_1C_2 меньше суммы радиусов r_1 и r_2 двух окружностей C_1 , C_2 , но больше их разности $r_1 - r_2$ ($r_1 > r_2$), то, хотя в этом случае на прямой c имеются такие точки J и A второй окружности, что $C_1J < r_1$ и $C_1A > r_1$, но здесь мы не имеем возможности доказать, не опираясь на аксиомы о непрерывности, что обе окружности необходимо должны пересекаться. Входить здесь в подробности этого доказательства нет нужды, но не безынтересно будет указать на то, что основная постройка элементарной геометрии, относящаяся к отложению отрезков и

угловъ, къ дѣленію послѣднихъ пополамъ можно выполнить, не опираясь на обращеніе предыдущаго предложенія. Достаточно будетъ выяснитъ это на задачѣ о дѣленіи на двѣ равныя части даннаго отрѣзка AB (фиг. 94). Пусть C будетъ произвольная точка плоскости, не лежащая на прямой AB . Согласно аксіомамъ о конгруэнтности, на плоскости той стороны прямой AB , съ которой точка C не лежитъ, имѣется уголъ $C'AB \cong ABC$, а на его сторонѣ, отличной отъ AB , имѣется отрѣзокъ $AC' \cong CB$. Въ такомъ случаѣ треугольникъ $AC'B \cong ABC$, а потому $BC' \cong AC$; следовательно, окружности, имѣющія центры A и B и радіусы соответственно BC и AC , должны проходить черезъ несомнѣнно существующую точку C' , т. е. должны пересѣкаться.

Изъ двухъ точекъ пересѣченія этихъ окружностей для нашей цѣли пригодна лишь та, которая расположена относительно точки C по другую сторону прямой AB . Согласно предложенію 1, отрѣзокъ CC' имѣетъ съ прямой BA общую точку M . Эта точка представляетъ собою середину отрѣзка BA , т. е. $AM \cong MB$. Въ самомъ дѣлѣ, если бы отрѣзку MB былъ равенъ не отрѣзокъ AM , а отрѣзокъ AN , то изъ конгруэнтности треугольниковъ ANC и BMC , BMC и ANC' вытекало бы, что $CN \cong C'M$, $C'N \cong CM$; но въ такомъ случаѣ въ треугольникѣ CNC' сторона CC' была бы равна суммѣ двухъ другихъ, — обстоятельство, которое можетъ имѣть мѣсто безъ противорѣчія съ другими известными предложеніями только въ томъ случаѣ, когда точка M совпадаетъ съ N . Этимъ доказано существованіе и построеніе середины отрѣзка.

Когда намъ известно, что отрѣзокъ AB имѣетъ середину, то мы можемъ себѣ представить въ послѣдней вершину прямого угла, одна сторона котораго лежитъ на прямой AB ; существуетъ, следовательно, перпендикуляръ, возставленный изъ середины отрѣзка AB . Если мы теперь изъ точекъ A и B опишемъ двѣ окружности однимъ и тѣмъ же радіусомъ, большимъ, нежели половина отрѣзка AB , то каждая изъ этихъ окружностей должна пересѣчь упомянутый выше перпендикуляръ, и при томъ въ тѣхъ же самыхъ точкахъ. Въ самомъ дѣлѣ, если Z есть точка пересѣченія первой окружности съ перпендикуляромъ, то $ZB \cong ZA$. Этимъ доказано и обычное построеніе середины отрѣзка, но лишь во вторую очередь.

10. Принимая теперь обращеніе предложенія 9, мы имѣемъ въ виду изложить рѣшеніе задачи о проведеніи изъ точки S касательныхъ къ окружности O ; это рѣшеніе, ведущее свое начало, по существу, отъ Евклида*), тѣмъ болѣе замѣчательно, что оно остается

*) «Начала», III, 7.


Воберъ. Энциклоп. элемент. геометрія.




Фиг. 94.

справедливым и в неевклидовой геометрии. Пусть SA (фиг. 95) будет касательная к окружности O ; она будет, следовательно, перпендикулярна к прямой OA . Если мы примем во внимание, что, опуская перпендикуляр из точки O на прямую SA , нам всегда приходится пользоваться точкой O' , симметричной с точкой O относительно прямой SA , то мы придем к мысли, что целесообразно ввести в нашу фигуру также точку O' . Так как OSO' есть равнобедренный треугольник, то $SO = SO'$ и $OO' = 2OA$; поэтому точка O' лежит как на окружности, имеющей центр в точке S и радиус SO , так и на окружности, которая имеет центр в точке O и радиус которой равен диаметру данной окружности. Таких точек будет две — O' и O'' , которым соответствуют две точки соприкосновения A и B , а следовательно, и две касательные SA и SB .

Другое весьма распространенное решение этой задачи сводится непосредственно к разысканию геометрического места точек A и B



Фиг. 95.



Фиг. 96.

(независимо от радиуса данной окружности). Согласно предложению, которое через Евклида восходит к Фалесу Милетскому (около 600 г. до Р. X.), геометрическое место вершин прямых углов, стороны которых проходят через две неподвижные точки S и O , есть окружность, имеющая отрезок SO своим диаметром. Сообразно этому, точка A лежит на окружности, имеющей центр в середине M отрезка SO и радиус MO . И действительно, если Z есть произвольная точка этой окружности (фиг. 96), то $MS = MZ = MO$; ZMS и ZMO суть равнобедренные треугольники, а потому

$$\sphericalangle MSZ \sphericalangle MZS, \sphericalangle MOZ \sphericalangle MZO;$$

если мы, поэтому, обозначим общую величину первых двух углов через x , а величину вторых двух через y , то, по теореме о внешнем

углѣ, $\sphericalangle SMZ' \simeq 2x$, $\sphericalangle Z'MO \simeq 2y$, а слѣдовательно, $2x + 2y = 2d$, $x + y = d$; поэтому SZO есть прямой уголъ, что и требовалось доказать. Данная окружность пересѣкаетъ окружность M въ точкахъ A и B , и задача, такимъ образомъ, разрѣшена.

11. Предложеніе Thalеса содержитъ, какъ частный случай, въ предложеніи, которое извѣстно подъ названіемъ теоремы о вписанномъ углѣ и заключается въ слѣдующемъ: вписанные углы, опирающіеся на одну и ту же дугу, равны между собою. На понятіяхъ, входящихъ въ эту теорему, а также и на ея доказательствахъ, которое можно вести совершенно аналогично доказательству теоремы Thalеса, мы не станемъ здѣсь останавливаться, такъ какъ все это не представляетъ никакихъ затрудненій. Напротивъ, опредѣленіе „равенства“ дугъ окружности представляеть нѣкоторое затрудненіе, если мы не хотимъ опираться при этомъ на эмпирическое наложеніе этихъ фигуръ. Говорятъ: равнымъ центральнымъ угламъ окружности отвѣчаютъ равныя дуги. Что это — теорема или опредѣленіе? Эмпирики „доказываютъ“ это предложеніе, ссылаясь на воззрѣніе (движеніе). Но въ геометріи, основанной на понятіяхъ, сущность ученія о величинѣ и объ ея измѣреніи именно и заключается въ самомъ установленіи понятія о равенствѣ при помощи понятій же, какъ мы это видѣли въ § 15, 8 и въ § 18, 2, гдѣ мы опредѣленнымъ конструктивнымъ приемомъ установили равенство отрезковъ. Предложеніе, о которомъ идетъ теперь рѣчь, очевидно, присваиваетъ и тутамъ характеръ величины; и этимъ характеромъ онѣ дѣйствительно обладаютъ, ибо мы легко можемъ перенести на дуги соображенія, изложенныя въ § 15, 8 относительно понятія „между“. Но, чтобы установить это вполне, намъ не хватаетъ еще конструктивнаго приема, устанавливающаго равенство. Ясно, что естественнѣе всего было бы опредѣлить равенство тѣмъ, что равнымъ центральнымъ угламъ должны соответствовать равныя дуги. Можно было бы приведенное выше на стр. 266 положеніе Лейбница возвести на степень опредѣленія равенства. Если же отклонить оба эти предложенія, то остается только путь, ведущій черезъ общее понятіе о длинѣ дуги кривой линіи; это понятіе, въ свою очередь, должно быть опредѣлено, но это настолько трудно, что мы вынуждены были отказаться отъ включенія его въ настоящей критической очеркъ основъ геометріи, хотя мы не всегда ограничивались здѣсь строго элементарными вопросами. Поэтому въ элементарной геометріи предложеніе, о которомъ идетъ рѣчь, должно служить опредѣленіемъ.

12. О ближайшихъ слѣдствіяхъ изъ перечисленныхъ выше предложеній и объ ихъ примѣненіяхъ къ рѣшенію задачъ на построеніе мы не намѣрены здѣсь распространяться. Обыкновенные учебники геометріи и сборники задачъ даютъ для этого обширный матеріалъ и многочисленныя указанія.

§ 21. Подобіе.


1. Чтобы отъ болѣе или менѣе яснаго представленія, которое мы связываемъ со словомъ „подобіе“ въ примѣненіи къ плоскимъ фигурамъ, перейти къ точному понятію, мы замѣтимъ прежде всего, что подобіе представляетъ собою нѣкоторое отображеніе: двѣ подобныя фигуры въ силу именно своего подобія поставлены другъ къ другу въ такое соотвѣтствіе, такъ „отображены“ другъ въ другѣ, что каждой точкѣ одной фигуры отвѣчаетъ одна опредѣленная точка другой фигуры. Но этого, конечно, недостаточно для опредѣленія подобія, ибо двѣ фигуры, связанные круговымъ сопряженіемъ (или инверсіей, § 8, 4), также приведены въ однозначное соотвѣтствіе другъ съ другомъ; онѣ однако не обладаютъ тѣмъ, что называютъ подобіемъ. При инверсіи прямой линіи можетъ отвѣчать окружность и обратно. Поэтому мы будемъ ближе къ цѣли, если скажемъ, что подобіе есть коллинеація, т. е. точкамъ прямой въ подобной фигурѣ опять-таки отвѣчаютъ точки, расположенныя на одной прямой, и обратно. Однако, примѣры аффинныхъ сопряженій, съ которыми мы познакомимся въ начертательной геометріи, показываютъ, что и коллинеація не охватываетъ понятія о подобіи: прямоугольный треугольникъ не всегда преобразуется коллинеаціей въ прямоугольный же треугольникъ. Подобіе предполагаетъ еще одно свойство, которое коренится въ этомъ представленіи и которое съ нимъ соединяетъ и математикъ, — именно, преобразование при посредствѣ подобія сохраняетъ тѣ же углы ²⁾. Сообразно этому мы прежде всего установимъ слѣдующее опредѣленіе: подобнымъ преобразованиемъ одной плоскости въ другую называется такая коллинеація, которая не мѣняетъ угловъ ³⁾.

2. Прежде всего необходимо доказать, что подобіе, требуемое этимъ опредѣленіемъ, дѣйствительно возможно. Мы попытаемся осуществить это сопряженіе, или соотвѣтствіе, такимъ образомъ, чтобы всѣ прямая, соединяющія двѣ соотвѣтствующія другъ другу точки, проходили черезъ постоянную точку O , отвѣчающую себѣ самой. Положимъ, что эта точка выбрана совершенно произвольно, и что такъ же произвольно выбрана одна пара соотвѣтствующихъ другъ другу точекъ A и A_1 на прямой, проходящей черезъ точку O . Если теперь B есть еще одна точка, не лежащая на прямой OA (фиг. 97), то соотвѣтствующая ей точка B_1 должна, во всякомъ случаѣ, лежать на прямой OB и при томъ такъ, чтобы $B_1A_1O \sim \sphericalangle BAO$, а это значить, что прямая B_1A_1 параллельна

) По крайней мѣрѣ, сохраняетъ прямые углы.

³⁾ Т. е. углы между двумя прямыми равны угламъ между соотвѣтственными прямыми преобразованной фигуры.

прямой VA . Точка V_1 этим вполне определяется, а вместе с тем углы треугольника OV_1B конгруэнтны соответствующим углам треугольника OA_1V_1 . В этих предѣлах наше опредѣленіе, таким образомъ, выполняется; но спрашивается, если мы возьмемъ еще третью точку C , не лежащую ни на одной изъ прямыхъ OA , AB , BO , то не приведемъ ли это построение соответствующей точки C_1 къ противорѣчію? Въ самомъ дѣлѣ, въ виду равенства соответственныхъ угловъ должно быть, съ одной стороны, $V_1C_1 \parallel BC$, а съ другой стороны, $A_1C_1 \parallel AC$. Но эти два требованія дѣйствительно выполняются въ силу предложенія Дезарга, которое мы формулировали въ § 10 и которое мы здѣсь будемъ принимать. Итакъ, подобіе въ смыслѣ установленнаго нами опредѣленія существуетъ, и именно въ томъ болѣе широкомъ смыслѣ слова, что не только двѣ какія-нибудь фигуры, но вся плоскость отображена подобно на самой себѣ или на другой плоскости. Въ самомъ дѣлѣ, какъ бы ни была расположена точка C въ плоскости треугольника OAB , указанное построение однозначно относитъ ей соответствующую точку C_1 ; тотъ случай, когда точка C какъ разъ лежитъ на одной изъ прямыхъ OA , AB , BO послѣ всего сказаннаго легко исчерпать.



Фиг. 97.

3. Конгруэнтность представляетъ собою лишь частный случай подобія, ибо конгруэнтность всегда можетъ быть опредѣлена, какъ коллинеація, сохраняющая углы (г. е. подобіе), и требующая кромѣ того конгруэнтности соответственныхъ отрезковъ. Но, такъ какъ, съ другой стороны, конгруэнтныя фигуры не всегда имѣютъ то взаиморасположеніе, которое указано въ предыдущемъ пунктѣ, то ясно, что тамъ мы имѣли дѣло съ частнымъ случаемъ подобія, именно со случаемъ подобія при подобномъ расположеніи. Точка O , отвѣчающая при такихъ условіяхъ самой себѣ, называется центромъ подобія, и при томъ внѣшнимъ или внутреннимъ, смотря по тому, расположены ли двѣ соответствующія другъ другу точки по одну сторону точки O или по разныя (аксіома Π_1). Сообразно этому, подобіе при подобномъ расположеніи однозначно опредѣлено, если заданы: I. либо центръ подобія и, сверхъ того, пара соответствующихъ другъ другу точекъ, либо II. двѣ пары соответствующихъ другъ другу точекъ. Если въ случаѣ II должны другъ другу соответствовать точки A и A' , B и B' , которыя не всѣ расположены на одной прямой, то центръ подобія опредѣляется пересѣченіемъ прямыхъ AA' и BB' , но

при этомъ прямыя $A'B'$ и AB , конечно, должны быть параллельнымъ. Однако, это наше условіе можетъ быть выполнено еще и такимъ образомъ, что всѣ четыре точки A, B, A', B' лежать на одной прямой u . Если мы тогда построимъ треугольникъ ABC и подобный ему треугольникъ $A'B'C'$, то точки C и C' будутъ соответствовать другъ другу и въ первоначальномъ подобномъ соответствіи⁶⁾; поэтому прямыя AA' и CC' пересѣкутся въ центрѣ подобія. Такимъ образомъ случай II приводится къ случаю I.

Изъ опредѣленія подобія вытекаетъ непосредственно: если двѣ фигуры подобны третьей, то онѣ подобны другъ другу. Положимъ теперь, что фигуры $O.ABC \dots$ и $O'.A'B'C' \dots$ подобны другъ другу; положимъ дальѣ, что фигуры $O'.A_1B_1C_1 \dots$ и $O'.A'B'C' \dots$ не только подобны, но и подобно расположены (при центрѣ подобія O'); въ такомъ случаѣ фигуры $O'.A_1B_1C_1 \dots$ и $O.ABC \dots$ подобны. Это же соотношеніе переходитъ въ конгруэнтность, если $O'.A_1 \cong OA$; но, если даны точки O' и A_1 , то фигура $O'.A_1B_1C_1 \dots$, конгруэнтная фигурѣ $O.ABC \dots$, опредѣлена, если не вполне, то во всякомъ случаѣ настолько, что возможно еще только отраженіе относительно прямой $O'A_1$; это значитъ: существуютъ двѣ фигуры, конгруэнтныя фигурѣ $O.ABC \dots$, — скажемъ, $O'.A_1B_1C_1 \dots$ и $O'.A_1B_1C_1^* \dots$, — расположенныя симметрично относительно прямой $O'A_1$; но по каждой изъ этихъ двухъ фигуръ мы однозначно получаемъ фигуру $O'.A'B'C' \dots$, если даны точки O' и A' , и если еще установлено, по какую сторону прямой $O'A'$ должна лежать точка B' . Отсюда слѣдуетъ: фигура $P'Q' \dots$, подобная фигурѣ $PQ \dots$, двумя парами соответственныхъ точекъ P и P' , Q и Q' опредѣляется въ такой мѣрѣ, что остается возможнымъ только еще отраженіе отъ прямой $P'Q'$. Этимъ вмѣстѣ съ тѣмъ доказано: 1) что установленное нашимъ опредѣленіемъ понятіе о подобіи имѣетъ полный смыслъ и не содержитъ въ себѣ ничего несогласнаго съ Евклидовой геометрией, и 2) что всякое подобное сопряженіе плоскости съ собою самой или съ другою плоскостью можетъ быть осуществлено при посредствѣ одного конгруэнтнаго сопряженія и одного подобного сопряженія, сохраняющаго подобное расположеніе фигуръ⁷⁾; поэтому подобіе по существу можно изучать на этомъ послѣднемъ частномъ случаѣ.

4. Если два соответственныхъ отрезка двухъ подобныхъ фигуръ конгруэнтны, то и всѣ соответственные отрезки попарно равны. Если одинъ

⁶⁾ Ибо оно сохраняетъ углы.

⁷⁾ Иначе говоря: всякое преобразование фигуры въ подобію ей фигуру можно произвести, если перенести первую фигуру въ нѣкоторое другое положеніе, а затѣмъ подвергнуть ее подобному преобразованію съ сохраненіемъ подобнаго расположенія, т. е. относительно нѣкотораго центра O .

отрѣзокъ въ три раза больше соответствующаго ему отрѣзка, то и каждый отрѣзокъ первой фигуры въ три раза больше соответствующаго ему отрѣзка второй фигуры. Вообще имѣеть мѣсто слѣдующее положеніе: если одинъ отрѣзокъ одной фигуры составляетъ рациональное кратное соответствующаго отрѣзка второй фигуры, то и каждый отрѣзокъ первой фигуры конгруэнтенъ такому же рациональному кратному *) соответствующаго отрѣзка подобной фигуры; если, стало быть, a, b, c суть отрѣзки одной изъ такихъ двухъ фигуръ, a', b', c', \dots соответствующіе отрѣзки другой фигуры, то $a' \simeq \omega a$, $b' \simeq \omega b$, $c' \simeq \omega c, \dots$, гдѣ ω —рациональное и положительное число. Все это можно доказать, не пользуясь аксіомой о непрерывности. Съ другой стороны, можно обнаружить, что діагональ квадрата не представляетъ собой рациональнаго кратнаго его стороны; если, поэтому, мы примемъ сторону и діагональ квадрата за соответственные отрѣзки двухъ подобныхъ фигуръ, то наше предложеніе не можетъ непосредственно найти себѣ примѣненія къ этимъ фигурамъ; можно только обнаружить, что діагонали a и стороны a' квадрата съ любымъ приближеніемъ отвѣчаютъ такое рациональное число ω , что $a' \simeq \omega a$. Но отъ этихъ приближенійныхъ равенствъ теорія подобія переходитъ къ предложеніямъ, которыя справедливы въ точности. Въ этомъ есть нѣчто, логически не удовлетворительное; устранить это удалось лишь въ послѣднее время путемъ совершенно новаго построенія теоріи подобія. Если $a' \simeq \omega a$ и ω есть рациональное число, т. е. частное двухъ цѣлыхъ чиселъ m и n , то отрѣзокъ a' представляетъ собой m -кратную величину отрѣзка a/n , который мы будемъ обозначать черезъ μ ; тогда a есть n -кратное отрѣзка μ . Этотъ отрѣзокъ μ , котораго кратны оба отрѣзка a и a' , называется общей мѣрой двухъ отрѣзковъ. Отрѣзки же a и a' называются „соизмѣримыми“. Если же предыдущее соотношеніе при рациональномъ ω можетъ существовать только приближенно, то нѣтъ и точной общей мѣры μ , отрѣзки a и a' „несоизмѣримы“. Рѣчь идетъ, слѣдовательно, о томъ, чтобы устранить изъ геометріи тѣ трудности, которыя связаны съ понятіемъ о соизмѣримости и объ общей мѣрѣ. Этого можно достигнуть только такимъ образомъ, что мы либо разоведемъ самое ученіе о дѣйствіяхъ надъ отрѣзками на основаніи чисто геометрическихъ построеній, какъ это уже и было намѣчено для проективной геометріи въ § 18, либо же постараемся охватить чисто геометрически весь относящійся сюда матеріалъ; послѣднее всегда должно быть возможно, ибо число, поскольку ими пользуется геометрія въ своей метрицѣ, можетъ быть разсматриваемо,

*) Подъ рациональнымъ кратнымъ отрѣзка a разумѣютъ отрѣзокъ a' , составленный изъ m отрѣзковъ, каждый изъ которыхъ составляетъ n -ую часть отрѣзка a , при чемъ m и n суть цѣлыя числа.


только как система, служащая лишь для выражения различных соотношений съ чисто качественной стороны.

5. Метрика въ теоріи подобія основана на подобіи „системъ прямолинейныхъ отрезковъ“; мы разумѣемъ подъ этимъ слѣдующее: положимъ, что на двухъ прямыхъ u и u' даны отрезки x, y, z, \dots и соответственно x', y', z', \dots въ одинаковомъ числѣ (но, по крайней мѣрѣ, по два на каждой прямой), которые мы отнесемъ другъ къ другу въ качествѣ соответственныхъ, какъ это видно уже по обозначеніямъ. Мы будемъ говорить, что системы отрезковъ $u(x, y, z, \dots)$ и $u'(x', y', z', \dots)$ подобны, или символически

$$u(x, y, z, \dots) \sim u'(x', y', z', \dots),$$

если мы можемъ разсматривать u и u' , какъ соответственныя прямыя двухъ подобныхъ фигуръ, въ которыхъ отнесенные другъ къ другу выше отрезки x и x' , y и y' , z и z' также являются соответственными. Этимъ мы расширяемъ прежнее опредѣленіе подобія, которое терять содержаніе, когда обѣ фигуры состоятъ исключительно изъ отрезковъ, соответственно расположенныхъ на двухъ прямыхъ, такъ какъ въ этомъ случаѣ нѣтъ никакихъ угловъ.

Пусть S будетъ точка, не лежащая на прямой u (фиг. 98), а A, B, C, D, \dots точки, ограничивающія отрезки x, y, z, \dots на прямой u ;




Фиг. 98.

A', B', C', D', \dots суть соответствующія точки на прямой u' ; если мы построимъ треугольникъ $S'A'B'$, подобный треугольнику SAB , то треугольники SAC и $S'A'C'$, SBC и $S'B'C'$ и т. д. должны быть соответственно подобны: отсюда можно сдѣлать двоякій выводъ: 1) если на прямой u даны всѣ отрезки, то на прямой u' можно выбрать произвольно только одинъ отрезокъ $A'B'$, ибо подобіе треугольниковъ SAB и $S'A'B'$ опредѣляетъ точку S' , а чрезъ ея посредство, опять-таки вслѣдствіе подобія треугольниковъ SAC и $S'A'C'$, опредѣляется точка C' и т. д.; 2) если существуетъ одна такая пара точекъ S и S' , что съ присоединеніемъ ихъ мы получаемъ подобныя фигуры ($SABC \dots$ и $S'A'B'C' \dots$)

то любой точкѣ S можно (двоимъ образомъ) отнести точку S' , такъ что упомянутыя фигуры окажутся подобными. Наше расширеніе понятія о подобіи является, слѣдовательно, допустимымъ. Два положенія точки S' симметричны относительно прямой u' .

Таким образом, из четырех отрезков x, y и x', y' на прямых u и u' в силу подобия этих систем один всегда определяется тремя остальными; этот четвертый отрезок по величине и положению не зависит от выбора вспомогательной точки S : он зависит, следовательно, только от взаимного расположения определяющих его отрезков на прямых u и u' . Если две фигуры подобны третьей фигуре и подобно относительно нее расположены, то они также подобны между собой и подобно расположены одна относительно другой, как это легко получается из теоремы Дезарга ⁹⁾. Положим теперь (фиг. 98), что фигуры $S.ABC\dots$ и $S'.A'B'C'\dots$, а также $SAB\dots$ и $S_0.A_0B_0C_0\dots$ соответственно подобны и имеют подобное расположение. Если сверх того фигура $A_0B_0\dots$ конгруэнтна фигуре $AB\dots$, то и фигура $S.ABC\dots$ конгруэнтна фигуре $S_0.A_0B_0C_0\dots$, ибо отрезки $SS_0, AA_0, BB_0, CC_0, \dots$ параллельны; следовательно, величины отрезков x, y, x', y' не зависят от расстояния между прямыми u и u' и от точки O ¹⁰⁾. Но больше того: если мы совместим прямую u_0 с прямой u (фиг. 99), не совмещая точки A_0 с точкой A , то согласно установленному выше предложению ^{*}), прямая SS_0 будет параллельна прямой u ; если поэтому Q есть центр подобия фигур $S'.A'B'C'\dots$ и $S_0.A_0B_0C_0\dots$, то и прямая OQ будет параллельна прямой SS_0 ¹¹⁾, а, следовательно, и прямой u . Если мы еще проведем прямую OA_1 параллельно QA_0 , прямую OB_1 па-



Фиг. 98

⁹⁾ На фиг. 98 каждая из фигур $S_0.A_0B_0$ и SAB подобна и подобно расположена относительно фигуры $S'.A'B'$. Стороны треугольников $S_0.A_0B_0$ и SAB соответственно параллельны сторонам треугольника $S'.A'B'$, а потому $S_0.A_0, SA, S_0B_0, SB$ и A_0B_0, AB . Это тот частный случай теоремы Дезарга, когда точки пересечения соответственных сторон лежат на бесконечно удаленной прямой. Поэтому прямые $S.S, A_0.A, B_0.B$ проходят через одну точку — центр подобия фигур SAB и $S_0.A_0B_0$.

¹⁰⁾ Если $A'B'$ и $B'C'$ суть, скажем, отрезки x' и y' , а AB есть отрезок x , то BC есть отрезок y , определяемый подобием двух систем; но если $A_0B_0 \cong AB$, то $B_0C_0 \cong BC$. Иначе говоря, отрезок y остается один и тот же, возьмем ли мы x на прямой u или на прямой u_0 .


¹¹⁾ Справедливость этого предложения в настоящем частном случае легко обнаружить при помощи предложения Дезарга.

¹²⁾ Если мы возьмем треугольники $A.P.A_0$ и SS_0 , то прямые, соединяющие соответственные вершины, пересекаются в одной и той же бесконечно-удаленной

параллельно QB_0 , OC_1 , параллельно QC_0 и т. д. и найдем проекции A_1' , B_1' , C_1' , ... точек A_1 , B_1 , C_1 , ... из точки O на прямую u' , то фигура $O.A_1B_1C_1.A_1'B_1'C_1'$... будет конгруэнтна фигуре $Q.A_0B_0C_0.I'B'C'$..., так что

$$.A_1'B_1' \sim A'B', \quad .B_1'C_1' \sim B'C' \dots$$

Этим во 1) доказано построение, которое было указано в § 5 (фиг. 5) для передвижения фигуры вдоль по прямой и которое может быть выражено следующим образом: каждая прямая, параллельная основанию трапеции, пересекает боковые стороны и диагонали последней в четырех точках, которые служат концами равных отрезков ($AB \cong A_0B_0$ на фиг. 100); во 2) мы замечаем, что и расширенные системы отрезков $.AA_1$, BB_1 , CC_1 , ... и $.A'A_1$, $B'B_1$, $C'C_1$, ... взаимно-подобны; если поэтому $.AB \cong x$, $.CD \cong y$, и отрезок $.A_1B_1$, как выше, конгруэнтен отрезку $.AB$, то и отрезок $.A_1'B_1'$



Фиг. 100.

конгруэнтен отрезку $.A'B'$, конгруэнтен, следовательно, отрезку $.y'$. Таким образом, каждый из четырех отрезков x , x' , y , y' определяется не только соотношением $u(.AB, CD) \sim u'(.A'B', C'D')$, но также и соотношением: $u(.A_1B_1, CD) \sim u'(.A_1'B_1', C'D')$; это значит: подобием двух

систем отрезков $u(x, y)$ и $u'(x', y')$ между величинами четырех отрезков x , x' , y , y' устанавливается такое соотношение, которое совершенно не зависит от выбора прямых u и u' и от того положения, которое отрезки занимают на этих прямых; это соотношение определяется, следовательно, исключительно величинами трех из этих отрезков. То именно обстоятельство, что величина отрезков зависит исключительно от трех из них, мы будем выражать следующим образом: пара отрезков x, y подобна паре x', y' , или символически $(x, y) \sim (x', y')$; равнозначным этому мы будем также считать соотношение $(y, x) \sim (y', x')$. Но мы еще раз подчеркиваем, что это должно иметь только следующее значение: если мы отложим на прямой u отрезки $.AB \cong x$ и $.CD \cong y$, а на прямой u' , параллельной первой, отложим отрезок $.A'B' \cong x'$, найдем точку пересечения O лучей $.AA'$ и $.BB'$, а загнем точки пересечения

точек; поэтому точки пересечения соответственных сторон: $.A\Gamma$ и $.S\Gamma$ (O), $.A'A_0$ и $.S'S_0$ (Q), а также бесконечно удаленные точки пересечения прямых $.AA_0$ и $.S'S_0$, лежат на одной прямой; иными словами, прямая OQ проходит через бесконечно удаленную точку пересечения параллелей $.AA_0$ и $.S'S_0$, т. е. параллельна им.

ченія C' и D' прямых OC и OD съ прямой u' , то $C'D' \sim y'$ и при томъ независимо во 1) отъ разстоянія прямых u и u' и во 2) отъ расположенія трехъ опредѣляющихъ отрезковъ на этихъ прямыхъ. Теперь мы можемъ дать общее опредѣленіе: „свободную“ систему отрезковъ (x, y, z, \dots) мы будемъ считать подобной „свободной“ же системѣ отрезковъ (x', y', z', \dots) , если въ смыслѣ прежняго опредѣленія существуютъ двѣ „связанныя“ системы отрезковъ $u(x, y, z, \dots)$ и $u'(x', y', z', \dots)$, подобныя между собой; связанными же мы будемъ называть наши прежнія системы отрезковъ въ томъ смыслѣ, что отрезки каждой системы должны лежать на одной прямой, и мы рассматриваемъ взаиморасположеніе отрезковъ на этихъ прямыхъ¹²⁾.

6. Намъ нужно теперь показать, что мы дѣйствительно выдѣлили ядро тѣхъ предложеній, которыя обычно выражаются съ помощью пропорцій, при посредствѣ метрическихъ соотношеній, между тѣмъ какъ мы старались дать этимъ соотношеніямъ качественное выраженіе; это вытекаетъ теперь непосредственно изъ того, что мы можемъ, исходя изъ нашихъ опредѣленій, придти къ обычнымъ предложеніямъ о подобіи и къ относящимся сюда построеніямъ.

Предложенія о подобіи треугольниковъ: два треугольника подобны, если выполняется одно изъ слѣдующихъ четырехъ условий; и обратно, если треугольники подобны, то имѣютъ мѣсто слѣдующіе четыре предложенія.


- I. Два угла одного треугольника равны двумъ угламъ другого треугольника.
- II. Одинъ уголъ одного треугольника равенъ углу другого треугольника, а стороны, заключающія эти углы, образуютъ двѣ пары подобныхъ отрезковъ.

¹²⁾ Хотя основное опредѣленіе уже дважды формулировано въ текстѣ, мы считаемъ полезнымъ еще разъ пояснить сущность дѣла. Авторъ показываетъ слѣдующее: если мы возьмемъ двѣ параллели u и u' , на одной изъ нихъ отложимъ два отрезка $x(AB)$ и $y(CD)$, а на другой возьмемъ отрезокъ $x'(A'B')$ и произведемъ построеніе, указанное выше въ текстѣ, то мы получимъ отрезокъ $y'(C'D')$, не зависящій ни отъ разстояній между параллелями, ни отъ того, какъ мы расположили наши отрезки на соответственныхъ параллеляхъ; отрезокъ $C'D'$ однозначно опредѣляется тремя остальными, и только то обстоятельство, что онъ именно этимъ путемъ получается по тремъ остальнымъ отрезкамъ, мы и будемъ впредь разумѣть, говоря, что пара (AB, CD) подобна парѣ $(A'B', C'D')$ или $(x, y) \sim (x', y')$; но болѣе того: если отрезки x, y, x' и y' расположены какъ угодно, но, будучи перпендикулярны на двѣ параллели, три изъ нихъ указаннымъ построеніемъ даютъ четвертый, то мы все же будемъ говорить, что пара (x, y) подобна парѣ (x', y') ; наконецъ, мы будемъ говорить, что система (x, y, z, \dots) подобна системѣ (x', y', z', \dots) , если каждая пара одной системы подобна соответствующей парѣ другой системы.

- III. Две стороны одного треугольника образуютъ съ двумя сторонами другого подобныя пары отрезковъ, уголь же, противолежащій большому отрезку одной пары, равенъ углу, противолежащему большому отрезку другой пары.
- IV. Три стороны одного треугольника образуютъ съ тремя сторонами другого треугольника подобную систему отрезковъ.

Къ предложению I. Для доказательства предложения I достаточно замѣтить, что въ этомъ случаѣ и третій уголь одного треугольника равенъ третьему углу другого, такъ какъ сумма угловъ какъ въ одномъ, такъ и въ другомъ треугольникѣ равна $2d$. Значитъ, по опредѣленію треугольники подобны, и обратно.

Для доказательства обращеній остальныхъ предложений мы построимъ два треугольника, конгруэнтные даннымъ подобнымъ треугольникамъ, и притомъ такъ, чтобы они имѣли также подобное расположение; именно вершину C одного треугольника ABC мы примемъ за центръ подобія, такъ что вершина C'



Фиг. 101

подобнаго треугольника $A'B'C'$ должна будетъ совпасть съ C (фиг. 101). Тогда точки A' и B' будутъ лежать на прямыхъ CA и CB , а прямая $A'B'$ будетъ параллельна прямой AB . На прямой AB мы отложимъ отрезки

$AX \sim AC$, $BY \sim BC$. Пусть X' , Y' будутъ точки пересѣченія прямыхъ CX , CY съ прямою $A'B'$. Въ такомъ случаѣ треугольники $X'A'C$ и $X'AC$ будутъ подобны, равно какъ и треугольники $Y'B'C$ и $Y'BC$; поэтому $X'A'C$ и $Y'B'C$ суть равнобедренные треугольники, и потому $A'X' \sim AC$, $B'Y' \sim BC$. Если мы обозначимъ стороны треугольника ABC , противолежащія вершинамъ A , B , C , черезъ a , b , c и аналогично стороны треугольника $A'B'C'$ обозначимъ черезъ a' , b' , c' , то $B'Y' \sim a$, $A'X' \sim b$, $A'B' \sim c$ и $B'Y' \sim a'$, $A'X' \sim b'$, $A'B' \sim c'$, такъ что (a, b, c) и (a', b', c') суть подобныя системы (обращеніе предложений II, III, IV).

Къ предложению II. Обращаясь теперь къ прямой теоремѣ II, положимъ, что $\triangle ACB \sim \triangle A'C'B'$. На сторонѣ CA мы отложимъ отъ точки C отрезокъ, равный $C'A'$, и конечную точку его опять-таки обозначимъ черезъ A' ; затѣмъ на прямой CB мы выберемъ точку B' такъ, чтобы прямая $A'B'$ была параллельна прямой AB ; наконецъ мы

отложим на прямой AB отрезок AX , конгруэнтный AC , и отрезок BY , конгруэнтный BC ; точку пересечения прямых AB^* и CX мы обозначим через X' , точку же пересечения прямых AB^* и CY — через Y' . В таком случае треугольники $X'A'C$ и $X'AC$ будут подобны (I), равно как и треугольники $Y'B^*C$ и YBC ; поэтому $A'X' \approx AC \approx b'$, $B^*Y' \approx B^*C$; с другой стороны, (a, b, c) и $(B^*Y', A'X', A'B^*)$ суть подобные системы, или, что нас собственно здесь только интересует, $(a, b) \approx (B^*Y', A'X')$, так что $(a, b) \approx (B^*Y', b')$, но по условию прямой теоремы II $(a, b) \approx (a', b')$; следовательно, $B^*Y' \approx a'$, а так как мы уже нашли, что $B^*Y' \approx B^*C$, то $B^*C \approx a'$. Таким образом, точка B^* совпадает с точкой B' , где $B^*C \approx a'$, и треугольник $A'B^*C$ действительно подобен треугольнику ABC ; так как треугольник $A'B^*C$ не только подобен треугольнику ABC , но и имеет с ним подобное расположение.


Къ предложению III. Положим, что $c > b$, $c' > b'$, $\therefore ACB \approx A'C'B'$ и $(b, c) \approx (b', c')$. Мы можем принять, что оба треугольника имеют общую вершину C , что точка A' лежит на прямой AC , точка B' на прямой BC . Нужно только доказать, что прямая $A'B'$ параллельна прямой AB . Положим, что прямая, проходящая через точку A' параллельно AB , встречает прямую CB в точке B^* ; тогда дело сводится к тому, чтобы обнаружить, что точка B^* совпадает с B' . Если мы вновь отложим отрезок $A'X \approx AC \approx b$, и если X' будет точка пересечения прямых $A'B^*$ и CX , то $X'A' \approx A'C \approx b'$. Поэтому $(X'A', AB) \approx (X'A', A'B^*)$, т. е. $(b, c) \approx (b', A'B^*)$; так как по условию $(b, c) \approx (b', c')$, то $(A'B^*) \approx c'$. Треугольник $A'B^*C$ имеет с треугольником $A'B^*C$ два соответственно равных стороны ($A'C \approx A'C$, $A'B^* \approx A'B^*$) и общий угол γ , противоположный как в одном, так и в другом треугольнике большей стороне. Эти треугольники, следовательно, конгруэнтны, и точка B^* совпадает с B' . Но так как треугольники $A'B^*C$ и ABC подобны и подобным образом расположены, то прямая теорема III доказана.

Къ предложению IV. Дано, что $(a, b, c) \approx (a', b', c')$. Из отрезков a, b, c мы построим треугольник ABC и по прежнему отложим $AX \approx b$, $BY \approx a$, $CA' \approx b'$ и через точку A' проведем прямую, параллельную XU , которая пересечет прямую CX в точке X' , прямую CB в точке B' , наконец, прямую CY в точке Y' . Мы должны доказать, что $CB' \approx a'$ и $A'B' \approx c'$. Из параллельности прямых $X'A'$ и $X'A$ следует, что $X'A'C$ и $X'AC$ суть равнобедренные треугольники, а потому $X'A' \approx b'$; но вследствие подобия систем $(X'A', AB)$ и $(X'A', A'B')$ имеем, с одной стороны, $(b, c) \approx (b', A'B')$; а с другой стороны, по условию, $(b, c) \approx (b', c')$; поэтому $A'B' \approx c'$. Далее, с одной стороны, $(AB, BY) \approx (A'B', B'Y')$, или $(c, a) \approx (c', B'Y')$;


съ другой стороны, по условию $(c, a) \sim (c', a')$, а потому $B'Y' \cong a'$: вместе съ тѣмъ $B'C \cong a'$, что и требовалось доказать.

Изъ изложеннаго доказательства видно также, какъ нужно строить треугольникъ $A'B'C'$ въ каждомъ изъ четырехъ случаевъ.

7. Какъ бы странной ни казалась эта система изложения, можно съ полною точностью доказать, что она вполне передаетъ содержание тѣхъ предложеній, которыя обыкновенно излагаются въ метрической формѣ. Мы переведемъ еще только важныя предложенія Пифагора и Аполлонія на языкъ нашей качественной метрики. Пусть ABC (фиг. 102) будетъ треугольникъ съ прямымъ угломъ при вершинѣ C . Пусть a, β, a, b, c



Фиг. 102.



Фиг. 103.

имѣють обычныя значенія. На прямой AB отложимъ отрезки $AX \cong AC$ и $AZ \cong AC$; въ такомъ случаѣ углы $\sphericalangle CXA$ и $\sphericalangle ZCB$ равны каждый $\alpha/2$, а потому, согласно первой теоремѣ о подобіи треугольниковъ, треугольникъ XCB подобенъ треугольнику CZB . Следовательно, $(XB, BC) \sim (CB, BZ)$, т. е.

$$(c + b, a) \sim (a, c - b). \quad (1)$$

Изъ точки C (фиг. 103) мы опустимъ перпендикуляръ h на прямую AB ; основание его F дѣлитъ гипотенузу AB на отрезки AF и FB , которые мы будемъ обозначать черезъ p и q . Въ такомъ случаѣ треугольникъ $AFC \sim CFB$, а потому

$$(b, p) \sim (q, b), \quad (2)$$

и треугольникъ $AFC \sim ACB$, а потому

$$(p, b) \sim (b, c). \quad (3)$$

Эти три соотношенія воспроизводятъ предложенія Пифагора съ ихъ слѣдствіями, которыя въ старой системѣ обозначеній гласятъ:


$$(c + b) : a = a : (c - b), \quad \text{или} \quad c^2 = a^2 - b^2, \quad (1')$$

$$b : p = q : b, \quad \text{или} \quad b^2 = pq, \quad (2')$$

$$b : b = b : c, \quad \text{или} \quad b^2 = pc. \quad (3')$$

Здѣсь нужно, однако, замѣтить слѣдующее: въ соотношеніяхъ (1), (2), (3) a, b, c, p, q, b представляютъ собою не болѣе, какъ соотношенія, обозначающіе отрѣзки, и „формулы“ (1), (2), (3) выражаютъ только извѣстные соотношенія въ расположеніи отрѣзковъ при надлежащихъ построеніяхъ. Напротивъ, въ соотношеніяхъ (1'), (2'), (3') a, b, c, p, q, b выражаютъ не отрѣзки, а измѣряющія ихъ числа; упомянутыя же формулы содержать утвержденія, касающіяся только этихъ чиселъ.

Въ видахъ другого примѣненія теоріи подобія системъ отрѣзковъ мы построимъ въ треугольникѣ ABC (фиг. 104) равнодѣляща угловъ при вершинѣ C и обозначимъ черезъ W и W' точки пересѣченія ихъ съ противоположащей стороной; на прямой CA отложимъ отрѣзки $CY \cong CY' \cong CB$; въ такомъ случаѣ $CW \perp BY, CW' \perp BY'$; поэтому $CW \parallel Y'B, CW' \parallel Y'B$, а потому $ACW \sim AY'B$ и $ACW' \sim AY'B$, т. е. 1) $(AW, AB) \sim (AC, AY')$ и 2) $(AW', AB) \sim (AC, AY)$.



Фиг. 104.

Такъ какъ далѣе изъ соотношенія $(x, y) \sim (x', y')$ всегда вытекаетъ также $(x, y, x + y, x - y) \sim (x', y', x' + y', x' - y')$, какъ это легко усмотрѣть изъ построенія, дающаго передвиженіе отрѣзка по прямой (фиг. 92)¹³⁾, то вслѣдствіе соотношенія 1) $(AW, AB - AW) \sim (AC, AY' - AC)$ или $(W'A, W'B) \sim (b, a)$; вслѣдствіе же соотношенія 2) $(AW', AW' - AB) \sim (AC, AC - AY)$, или $(W'A, W'B) \sim (b, a)$. Соединяя полученные результаты, получаемъ:

$$(W'A, W'B) \sim (W'A, W'B) \sim (b, a), \text{ иными словами:}$$

Равнодѣляща угловъ при вершинѣ C треугольника ABC встрѣчаютъ противоположную сторону AB въ такихъ двухъ точкахъ W и W' , что

$$(W'A, W'B) \sim (W'A, W'B) \sim (CA, CB).$$

Такъ какъ равнодѣляща CW и CW' двухъ смежныхъ угловъ при вершинѣ C взаимно перпендикулярны, то черезъ точки C, W и W' проходитъ окружность, имѣющая отрѣзокъ WW' своимъ діаметромъ. Если мы, кромѣ точекъ A и B , закрѣпимъ также точки W и W' , то точка C

¹³⁾ На этомъ чертежѣ $(A_1B_1, B_1C_1) \sim (A_1'B_1', B_1'C_1')$, а въ то же время $(A_1B_1, A_1C_1) \sim (A_1'B_1', B_1'C_1')$ и $(B_1C_1, A_1C_1) \sim (B_1'C_1', A_1'C_1')$.

можесть перемищаться только по названной окружности. Это приводить къ слѣдующему предложению:

Если между точками A, B, P , расположенными на одной прямой, имѣеть мѣсто соотношение $(P'A, P'B) \sim (P''A, P''B)$, то окружность, имѣющая своимъ діаметромъ отрезокъ $P'P''$, представляетъ собою геометрическое мѣсто точекъ C , для которыхъ

$$(CA, CB) \sim (P'A, P'B).$$

Это такъ называемая Аполлоніева окружность.

8. Какъ было уже сказано выше, понятіе о подобіи системъ отрезковъ было бы вполнѣ достаточно, чтобы установигь, основываясь чисто качественныхъ понятіяхъ исключительно на чисто качественныхъ понятіяхъ, свойства плоскихъ фигуръ, облакаемая обыкновенно въ метрическую форму; тѣмъ не менѣ эта система изложенія представляла бы слишкомъ большое отступление отъ обычной и была бы мало примѣнима для вычислений, относящихся къ практическимъ примѣрамъ. Однако, можно безъ труда свести принятую нами здѣсь символистику къ обычной системѣ пропорцій: это выполняется чисто формально, вѣдшимъ образомъ, при чемъ подъ знаками $a, b, c \dots$ все-таки не приходится разумѣть ничего, кромѣ отрезковъ. Съ этою цѣлью достаточно только, какъ это уже выяснилось въ § 7 при доказательствѣ теоремы Пифагора, соотношение

$$(x, y) \sim (x', y') \text{ выразить черезъ } x : y = x' : y' \text{ }^{14}). \quad (1)$$

Такъ какъ подобіе представляетъ собою взаимное свойство фигуръ, то мы можемъ, когда имѣеть мѣсто соотношение (1), писать также:

$$x' : y' = x : y \text{ соотвѣтственно прежнему обозначенію: } (x', y') \sim (x, y). \quad (2)$$

Въ виду п. 5 и соотношенія (1) отсюда вытекаетъ также:

$$(y, x) \sim (y', x'), \text{ т. е. } y : x = y' : x'. \quad (3)$$

Тамъ же было доказано, что изъ соотношенія (1) слѣдуетъ также


$$(x, y, x + y, x - y) \sim (x', y', x' + y', x' - y'), \quad (4)$$

или въ новыхъ обозначеніяхъ

$$x : (x + y) = x' : (x' + y'), \quad (x \pm y) : (x \mp y) = (x' \pm y') : (x' \mp y') \quad (5)$$

¹⁴⁾ Иными словами, отвлекаясь отъ того содержанія, которое мы раньше соединяли съ пропорціей $x : y = x' : y'$, мы условимся впредь подъ этимъ знакоположеніемъ разумѣть лишь то соотношение четырехъ отрезковъ, которое мы до сихъ поръ выражали знакоположеніемъ $(x, y) \sim (x', y')$.

Очень легко доказать, что перпендикуляры, возставленные из середины трех сторон треугольника, проходят через одну точку. Применяя это предложение к треугольнику, который получим, если через три вершины данного треугольника проведем прямые, параллельные противолежащим сторонам, получаем предложение: три высоты треугольника (т. е. перпендикуляры, опущенные из вершин на противолежащую сторону) пересекаются в одной точке, в так называемой точке „высот“ (фиг. 105).



Фиг. 105.

Если обозначим через H эту точку в треугольнике ABC , а основания перпендикуляров обозначим через X, Y, Z , то

- а) $AZC \sim HZB$, а потому $(ZC, ZA) \sim (ZB, ZH)$;
 б) $BZC \sim HZA$, а потому $(ZC, ZB) \sim (ZA, ZH)$.

С другой стороны, мы можем совершенно произвольно отложить отрезки $ZA \cong x$, $ZB \cong y'$, затем провести прямую $ZH \perp AB$ и на ней отложить отрезок $ZH \cong x'$, из точек A и B опустить перпендикуляры AU и BX на прямые PH и HA и определить точку пересечения C этих перпендикуляров. Тогда H есть точка высот треугольника ABC ; а потому, если мы обозначим отрезок CZ через y , то

- а): $(y, x) \sim (y', x')$; б): $(y, y') \sim (x, x')$.

Отсюда вытекает важная формула, выражающая закон перестановления членов:

$$\text{Если } (x, y) \sim (x', y'), \text{ то } (x, x') \sim (y, y'), \text{ или: } (6)$$

$$\text{Если } x : y = x' : y', \text{ то } x : x' = y : y'.$$

Для полноты мы еще отметим:

$$\text{Если } x : y = x' : y', \quad y : z = y' : z', \text{ то } x : z = x' : z'. \quad (7)$$

В самом деле, так как по условию $(x, y) \sim (x', y')$ и $(y, z) \sim (y', z')$, то, как было выяснено в п. 5 (фиг. 99), $(x, y, z) \sim (x', y', z')$.

9. Соотношением $a : b = x : c$ длина отрезка x однозначно определяется. Мы будем рассматривать ее, как „преобразование“ „доби“ $a : b$ или a/b к „знаменателю“ c ¹⁵⁾. Так как при „одноименных“

¹⁵⁾ Дробь вида a/b вводится здесь просто, как некоторый символ, составляемый из двух отрезков, для которого формально устанавливаются правила сравнения и операций. Так, условие равенства двух дробей $\frac{a}{b}$ и $\frac{a'}{b'}$ заключается в

дробяхъ a/c и b/c опредѣленіе сложения и вычитанія направивается само собой:

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}, \quad \frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}, \quad (8)$$

то мы имѣемъ возможность въ силу этого складывать и вычитать любыя дроби. Въ виду соотношенія (7) мы имѣемъ возможность опредѣлить умноженіе и дѣленіе равенствами:

$$\frac{x}{y} \cdot \frac{y}{z} = \frac{x}{z}, \quad \frac{x}{z} : \frac{y}{z} = \frac{x}{y}. \quad (9)$$

Напримѣръ, чтобы образовать произведеніе $a/b \cdot c/d$, мы полагаемъ $a = x$, $b = y$, $c/d = y/z$; этимъ отрезкомъ z однозначно опредѣляется; тогда $a/b \cdot c/d = x/z$, такъ что вспомогательный отрезокъ y совершенно выключается.

Для нашихъ цѣлей этихъ указаній достаточно. Изъ сказаннаго уже совершенно ясно, что этой символической системѣ операций надъ отрезками можно вполне присвоить законы сопряженія чиселъ; не хватаетъ только еще опредѣленія, согласно которому производилось бы сравненіе этихъ „дробей“, но это достигается положеніемъ, которое само собою разумѣется: $a/c < b/c$, если $a < b$; можно также устранить знаменателей путемъ введенія отрезка „единицы“, e или 1; этотъ послѣдній отрезокъ не долженъ мѣняться въ предѣлахъ одного и того же изслѣдованія, и въ качествѣ знаменателя, который всегда подразумѣвается, его всегда можно ставить или опускать по желанію. Изъ соотношенія $a/b = c/d$ слѣдуетъ, напримѣръ:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{e} = \frac{c}{d} \cdot \frac{b}{e}, \quad \frac{a}{e} = \frac{c}{d} \cdot \frac{b}{e} \quad (9), \quad \frac{a}{e} \cdot \frac{d}{e} = \frac{d}{e} \cdot \frac{c}{d} \cdot \frac{b}{e}, \quad \frac{a}{e} \cdot \frac{d}{e} = \frac{b}{e} \cdot \frac{c}{e} \quad (9),$$

или, наконецъ, $ad = bc$; при этомъ, правда, принимается, что законъ перемѣстительный при умноженіи дробей совмѣстимъ съ остальными нашими опредѣленіями; это, впрочемъ, легко доказать.

Доказательство законовъ сопряженія мы здѣсь оставимъ; намъ нужно еще только возвратиться къ теоремѣ Дезарга, которая составляетъ основу всего нашего системы конструктивнаго исчисленія. Какъ мы видѣли въ § 10, 1, это предложееніе легко доказать, опираясь на аксіомы I и II и принимая также аксіому о параллельности; но при этомъ приходится пользоваться трехмѣрнымъ пространствомъ. Однако, тотъ, кто принципиально

томъ, чтобы $(a, b) \sim (a', b')$. Привести дробь a/b къ знаменателю c значитъ составить дробь a'/c , равную дроби a/b . Остальныя критеріи сравненія и правила дѣйствій въ общихъ чертахъ намѣчены въ текстѣ; полная теорія этого исчисленія требуетъ довольно продолжительныхъ разсужденій.

желать бы, чтобы планиметрия была предоставлена своимъ собственнымъ силамъ, естественно будетъ искать такого доказательства, которое было бы построено только на аксиомахъ плоскости; но, повидимому, врядъ ли существуетъ такого рода доказательство, которое такъ или иначе не было бы связано съ исчисленіемъ отрезковъ; если мы, поэтому, желаемъ ограничить себя аксиомами плоскости, то для этого необходимо поставить учение о подобии на совершенно другую основу. Но для этого необходима болѣе сложная система исчисления отрезковъ, какъ, напримеръ, система, предложенная Гильбертомъ; это задача, надъ упрощеніемъ которой въ настоящее время много работаютъ *).

Тригонометрія съ формальной своей стороны также можетъ быть построена независимо отъ понятія объ общей мѣрѣ, т. е. независимо отъ Архимедовой аксиомы, какъ это обнаруживаетъ исчисленіе отрезковъ съ помощью „проекціоннаго параметра“, предложенное Моллеруномъ **). Собственно, только въ примѣненіи геометріи къ специальнымъ случаямъ, представляемымъ практической жизнью или естествознаніемъ, можетъ быть интересно обращаться къ измѣренію и къ числамъ, къ которымъ оно приводитъ; но во всѣхъ этихъ случаяхъ можно всегда удовольствоваться приближенной общей мѣрой μ двухъ отрезковъ, которая должна существовать въ силу аксиомы Архимеда. Въ этихъ предѣлахъ геометріи, какъ область чистаго мышленія, можетъ собственно, совершенно отказать отъ ирраціональнаго, что дословно означаетъ, „не имѣющее отношенія (къ единицѣ)“; это сдѣлало бы ея развитіе при помощи понятій гораздо болѣе элементарнымъ, нежели то, которое дается обычно. Для нашего воззрѣнія же ирраціональность часто несомнѣнно представляется натуральнѣе и яснѣе; и рѣшительно нельзя утверждать, что въ школьномъ обученіи геометрія, основанная на понятіяхъ, должна замѣнить собой наглядное изложеніе. Напротивъ того, было бы очень жаль, если бы вздумали ввести въ школу чисто абстрактную геометрію; это было бы лучшимъ средствомъ задуть въ зародышѣ непосредственную радость отъ творчества созерцающей фантазій, столь свойственную юношеству, и воспитать людей, бѣдныхъ духомъ. Развѣ только въ старшихъ классахъ, когда производится повтореніе элементарной геометріи, въ связи съ введеніемъ въ теорію познанія, было бы уместно указать на логическое построеніе геометріи, ибо арифметика и геометрія, построенныя на чистыхъ

*) Важнѣйшая литература:

Hilbert, Grundlagen, § 13 ff., § 22 ff.

J. Møllerup, Studien over den plane geometrie axiomer, Kopenhagen 1903, также Math. Ann. 56 и 58;

F. Schur, Math. Ann. 57;

A. Kneser, Arch. für Math. u. Phys. (3. Reihe) Bd. 2.

***) См. ссылку на стр. 266.

понятіяхъ, именно и могутъ дать ключъ къ пониманію теоріи познанія, въ особенности той, которую создали Платонъ, Декартъ, Лейбницъ, Кантъ.

§ 22. Измѣреніе площадей.

1. Периферія треугольника, квадрата, прямоугольника, а также окружность представляютъ собой простѣйшіе примѣры линий, которая разлагаютъ плоскость на двѣ „раздѣльныя части“ такимъ образомъ, что всякая точка плоскости, не лежащая на соответствующей линіи λ , всегда принадлежитъ одной и только одной изъ этихъ двухъ частей; кромѣ того, точка одной части не можетъ быть соединена съ точкой другой части такой ломаной линіей, которая не встрѣчаетъ линіи λ , производящей это дѣленіе; двѣ же точки, принадлежащія одной и той же части, всегда могутъ быть соединены отрѣзкомъ или ломанной линіей, не встрѣчающей этой линіи λ . Этотъ фактъ представляетъ собой непосредственное слѣдствіе аксіомъ сопряженія и выведеннаго изъ нихъ предложенія 1-го § 20. Линія λ , обладающая указаннымъ свойствомъ, называется „однократной замкнутой“ линіей *); двѣ же части, о которыхъ идетъ рѣчь, обладаютъ тѣмъ свойствомъ, что одна изъ нихъ — „внѣшняя“ — содержитъ цѣликомъ безчисленное множество прямыхъ линій; другая же — „внутренняя“ — не содержитъ цѣликомъ ни одной прямой. Внутренняя часть „оказывается“ линіей λ ; она образуетъ „ограниченную площадь“ — „плоскую фигуру“.

2. Потребности практической жизни, какъ, напримѣръ, опредѣленіе стоимости участка земли, окрашивание или золоченіе стѣны и т. п. вынудили присвоить каждой ограниченной плоской фигурѣ величину [которая въ случаѣ поля можетъ измѣняться временемъ, потребнымъ для обработки (Morgen), или числомъ необходимыхъ вспомоgetельныхъ силъ (lugera, loch, Ochsen), въ случаѣ окрашивания стѣны — вѣсомъ затраченнаго матеріала и т. п.]; лишь гораздо позже это наглядное представленіе претворилось въ точное понятіе. Только въ самое послѣднее время, въ особенности благодаря изслѣдованіямъ Шура и Гильберта, удалось овладѣть понятіемъ о площади, по крайней мѣрѣ, въ гѣхъ предѣлахъ, въ какихъ это необходимо для элементарной геометріи.

Всякое опредѣленіе величины относительно; именно, оно всегда зависитъ отъ точки зрѣнія, съ которой намъ угодно производить сравненіе. Для измѣренія величины площадей имѣло рѣшающее значеніе то практическое требованіе, что площади фигуръ, ограничиваемыхъ конгруэнтными линіями, должны считаться равными, между тѣмъ какъ площадь ограниченной фигуры A , которая цѣликомъ принадлежитъ другой


*) Въ противоположность n -кратно замкнутымъ линіямъ, раздѣляющимъ плоскость на $n + 1$ частей.

фигурѣ B , не охватывая послѣдней цѣликомъ, должна считаться меньше, нежели площадь фигуры B . Если фигура B , въ свою очередь, принадлежитъ цѣликомъ третьей фигурѣ C , не охватывая послѣдней цѣликомъ, то и фигура A содержится въ фигурѣ C ; если, слѣдовательно, $A < B$ и $B < C$, то $A < C$, какъ этого требуетъ общее понятіе о величинѣ. Сравнимъ теперь совершенно аналогичное положеніе дѣла, исходя отъ котораго мы пришли въ проективной геометріи къ синтезу понятія о величинѣ отрѣзковъ; тамъ, какъ и здѣсь, мы могли сравнивать A съ B только въ томъ случаѣ, когда A составляетъ часть B ; и подобно тому, какъ тамъ мы получили возможность сравнивать два отрѣзка, не имѣющіе общихъ точекъ, лишь послѣ того, какъ условно ввели приѣмъ, которымъ устанавливалось равенство отрѣзковъ въ понятіи и въ (чистомъ) возрѣніи, такъ и здѣсь, чтобы сообщить замкнутымъ фигурамъ характеръ величины, мы должны прежде всего установить законъ, который опредѣлялъ бы равенство площадей. По Гильберту („Основанія геометріи“, § 18) для этого необходимо понятіе „о равносоставленныхъ фигурахъ“*. Два „многоугольника“, т. е. фигуры, ограниченныя прямыми линиями**), мы будемъ называть равносоставленными, если они могутъ быть разбиты каждый на конечное число треугольниковъ такимъ образомъ, чтобы каждому составляющему треугольнику въ одномъ многоугольникѣ отвѣчалъ конгруэнтный ему составляющій треугольникъ въ другомъ многоугольникѣ. Послѣ этого опредѣленіе равенства площадей, или равновеликости, по Гильберту, гласитъ: два многоугольника называются равновеликими, если къ нимъ можно присоединить два равносоставленныхъ многоугольника, такимъ образомъ, чтобы полученные послѣ этого многоугольники въ свою очередь, оказались равносоставленными. Трудность сравненія площадей заключается въ томъ произволѣ, который оставляетъ это опредѣленіе. При проективномъ сравненіи отрѣзковъ мы имѣли вполне опредѣленное построеніе, которое разрѣшаетъ вопросъ о равенствѣ ихъ. Въ настоящемъ же случаѣ совершенно нельзя обозрѣть всѣхъ возможныхъ разложеній; а ригорі неѣтъ даже увѣренности въ томъ, что опредѣленія равносоставленныхъ и равновеликихъ фигуръ имѣютъ смыслъ, такъ какъ можно даже предположить, что, согласно этимъ опредѣленіямъ, всѣ многоугольники окажутся равновеликими между собою. Устранить это сомнѣніе невоз-

*) Понятіе о равносоставленныхъ фигурахъ впервые введено В. Болъэ (W. Bolyai) въ его „Tentamen“. Къ задачѣ о равносоставленныхъ фигурахъ возвратился потомъ Шѣнеманъ (Schönemann. Soest, Pg. 1884 и 1888). Основательно вопросъ разобранъ въ журналѣ „Mathem. Annalen“ Рети (Réthy; т. т. 38, 42 и 45 названнаго журнала), Раузенбергеромъ (Rausenberger; т. 43 названнаго журнала) и Добринеромъ (Dobriner; т. 42 названнаго журнала); см. также сочиненіе послѣдняго „Leitfaden der Geometrie“, Leipzig, 1898.

**) Мы принимаемъ, что многоугольникъ ограниченъ однократною замкнутой ломанной.

можно без довольно пространных подготовительных разсуждений, по крайней мѣрѣ, если мы желаемъ, какъ мы это дѣлали въ теоріи подобія,



Фиг. 106.

на треугольники $\Delta_1', \Delta_2', \Delta_3', \dots, \Delta_p'$, которые въ другой группировкѣ составляютъ многоугольникъ P''^* , а, съ другой стороны, — на треуголь-

*) О конгруэнтныхъ треугольникахъ мы здѣсь говоримъ, что это тѣ же треугольники.

обойтись безъ прямого примѣненія аксіомы о непрерывности; съ этимъ послѣднимъ требованіемъ съ точки зрѣнія идеальной геометріи безусловно необходимо считаться, если это только возможно, потому что иначе, ссылаясь на непрерывность, мы безъ нужды вводимъ болѣе сложное понятіе объ иррациональномъ.

3. Изъ опредѣленій Гильберта слѣдуетъ: Предложеніе 1. Если два многоугольника равноставлены съ третьимъ, то они равноставлены также другъ съ другомъ; если два многоугольника равновелики третьему, то они и другъ съ другомъ равновелики.

Въ самомъ дѣлѣ, если многоугольники P' и P'' равноставлены каждый съ многоугольникомъ P (фиг. 106), то послѣдній разбивается, съ одной стороны,


ники $\Delta_1'', \Delta_2'', \Delta_3'', \dots, \Delta_k''$, которые в иной группировке воспроизводят многоугольник P'' . Если мы себя теперь представим, что в многоугольнике P одновременно произведены оба эти разложения, то это вообще говоря уже не будет разложение на треугольники; но, присоединяя новые отрезки мы можем обратить его в разложение на треугольники ¹⁶⁾; при этом, как каждый из треугольников Δ' , так и каждый из треугольников Δ'' разложится на меньшие треугольники δ . Это разложение соответственных треугольников Δ' и Δ'' мы произведем также на многоугольниках P' и P'' ; тогда как многоугольник P' , так и многоугольник P'' представлять собою агрегат треугольников δ , из которых составляется также многоугольник P . Этим доказана первая часть предложения I.

На фиг. 106, которая предназначена еще и для другой цели, стороны треугольников Δ' отмечены жирными линиями; стороны треугольников Δ'' отмечены штриховым пунктиром, когда он не принадлежит периферии многоугольников P' или P'' ; конгруэнтные треугольники δ помечены одним и тем же номером, арабскими цифрами.

Во второй части предложения I-го нам даны два многоугольника p' и p'' , которые равновелики третьему многоугольнику p ; это значит: если мы к многоугольникам p' и p одновременно присоединим некоторые треугольники $\Delta_1', \Delta_2', \Delta_3', \dots, \Delta_k'$, то „расширенные“ таким образом многоугольники P' и P_1 равносторонны; следовательно, они могут быть составлены из одних и тех же треугольников D_1', D_2', \dots . Точно так же к многоугольникам p'' и p можно одновременно присоединить треугольники $\Delta_1'', \Delta_2'', \Delta_3'', \dots, \Delta_k''$ таким образом, чтобы расширенные многоугольники P'' и P_2 разлагались на одни и те же треугольники D_1'', D_2'', \dots . Мы представим себя теперь, что к многоугольнику p одновременно присоединены как треугольники $\Delta_1', \Delta_2', \dots, \Delta_k'$, так и треугольники $\Delta_1'', \Delta_2'', \Delta_3'', \dots, \Delta_k''$ в таком виде, в каком они расположены соответственно в многоугольниках P' и P'' . Может случиться, что ни один из треугольников Δ' не покрывает ни одного из треугольников Δ'' ; может, конечно, иметь место и обратное. Если бы некоторые треугольники Δ' и Δ'' друг друга покрывали, то фигуру II , которая образуется при их взаимном наложении, мы разобьем на семь треугольников; но в таком случае фигура II может быть получена как из многоугольника P' путем присоединения некоторых треугольников $\delta_1, \delta_2, \dots$ этой семи, так и из многоугольника P'' присоеди-

¹⁶⁾ Если мы нанесем на многоугольник P как одну, так и другую семь треугольников, P то периферии тех и других треугольников разложат многоугольник на многоугольники, которые мы диагоналями может вновь разбить на треугольники.

неніемъ нѣкоторыхъ треугольниковъ $\delta_r, \delta_{r+1}, \dots$ той же сѣти. Если мы присоединимъ первые треугольники къ многоугольнику P' , а вторые къ многоугольнику P'' , то расширенныя фигуры Π_1 и Π_2 равноставлены съ фигурой Π , а, слѣдовательно, и другъ съ другомъ; поэтому многоугольники p' и p'' равновелики, что и требовалось доказать.




Фиг. 107.

Если два параллелограмма $ABCD$ и $ABEF$ (фиг. 107) имѣютъ общее основаніе AB , а верхнія основанія CD и EF расположены на одной прямой, то мы можемъ получить изъ нихъ одну и ту же трапецію $ABCF$, разъ присоединяя къ первому параллелограмму треугольникъ DBF , а другой разъ присоединяя ко второму параллелограмму треугольникъ CAE , конгруэнтный треугольнику DBF ; слѣдовательно, оба параллелограмма равновелики. Очень простое обобщеніе этого результата даетъ намъ, такимъ образомъ:

Предложеніе 2. Параллелограммы, имѣющіе равныя основанія и равныя высоты, равновелики.

Если мы чрезъ середину E стороны CB треугольника ABC проведемъ прямую, параллельную основанію AB (фиг. 108), то она, согласно аксіомѣ Π_4 , должна встрѣтить сторону CA въ нѣкоторой точкѣ D ; эта точка представляетъ собой середину этой стороны,



Фиг. 108.

такъ какъ треугольники CED и CBA подобны и $CB = 2 \cdot CE$. Если теперь точка F расположена на прямой DE такимъ образомъ, что E есть середина отрезка DF , то треугольники CDE и BEF конгруэнтны, $ABDF$ есть параллелограммъ. Если мы къ параллелограмму присоединимъ треугольникъ DEC или же къ треугольнику ABC присоединимъ треугольникъ FEB , конгруэнтный предыдущему, то мы въ томъ и въ другомъ случаѣ получаемъ многоугольникъ $CAFBFC$; отсюда слѣдуетъ:

Предложеніе 3. Каждый треугольникъ равноставленъ съ нѣкоторымъ параллелограммомъ, имѣющимъ такое же основаніе и вдвое меньшую высоту.

Предложеніе 4. Треугольники, имѣющіе равныя основанія и равныя высоты, равновелики, ибо они равновелики параллелограммамъ, которые также имѣютъ равныя основанія и равныя высоты.

Отсюда слѣдуетъ:

Предложеніе 4. Треугольники, имѣющіе равныя основанія и равныя высоты, равновелики, ибо они равновелики параллелограммамъ, которые также имѣютъ равныя основанія и равныя высоты.

Предложение 5. При наличности Архимедовой аксіомы параллелограммы, имѣющіе одинаковыя основанія и одинаковыя высоты, равноставлены.

Въ самомъ дѣлѣ, пусть (фиг. 106) P и P' суть данныя параллелограммы и точки E, D, T, S пусть будутъ расположены на одной и той же прямой; проведемъ $A_1A_2 \parallel BE, A_2A_3 \parallel A_0A_1, A_3A_4 \parallel BE, A_4A_5 \parallel A_0A_1, \dots, A_{2n}A_{2n+1} \parallel A_0A_1, A_{2n+1}A_{2n+2} \parallel BE, \dots$; такимъ образомъ, мы получимъ на прямой A_0T конгруэнтныя отрезки $A_0A_2, A_2A_4, A_4A_6, \dots$. Согласно аксіомѣ Архимеда между этими отрезками долженъ быть одинъ $A_{2n}A_{2n+2}$, который содержитъ точку T . Положимъ сначала, что $n > 1$; напримеръ, на фиг. 106 $n = 2$. Если мы теперь черезъ точку A_{2n+1} проведемъ прямую, параллельную BE , то послѣдняя встрѣтитъ уже не отрезокъ A_0T , а отрезокъ TS въ точкѣ, которую мы обозначимъ черезъ R . Аналогично этому въ параллелограммѣ P проведемъ отрезки CK, LM, NQ , параллельные A_0T . Въ такомъ случаѣ $QM \parallel TA_{2n+1}(TA_5)$ параллелограммы же P и P' оказываются равноставленными, если мы примемъ за составляющіе треугольники t_1 , которые обведены жирными штрихами, ибо $A_0A_1A_2 \cong CBK, A_1A_2A_3 \cong CKL, \dots$ ¹⁷⁾. Можно было бы думать, что намъ здѣсь пришлось прибѣгнуть къ аксіомѣ Архимеда только вслѣдствіе особенности нашей фигуры, такъ что при другомъ построеніи мы, быть можетъ, могли бы этого избѣгнуть. Однако, Гильбертъ въ § 18 своихъ „Основаній“ строго доказалъ, что это не такъ. Изъ предложеній 3 и 5 безъ труда выводится.

Предложение 6. При наличности аксіомы Архимеда треугольники, имѣющіе одинаковыя основанія и одинаковыя высоты, равноставлены.


4. Такъ какъ мы не желаемъ пользоваться аксіомой Архимеда въ теоріи площадей, то мы здѣсь не будемъ пользоваться предложеніями 5 и 6. Изъ различныхъ слѣдствій, которыя вытекаютъ изъ предложеній 1—4, мы упомянемъ наиболѣе важное, а именно теорему Пивагора:

Квадратъ, построенный на гипотенузѣ прямоугольнаго треугольника, равенъ суммѣ квадратовъ, построенныхъ на его катетахъ.

Для доказательства построимъ (фиг. 109) на гипотенузѣ AB квадратъ ABB_3A_3 и квадраты ACB_2A_2 и BCC_1B_1 на катетахъ. Проведемъ также прямую B_2C_1 и при сторонѣ A_3B_3 построимъ треугольникъ $A_3B_3C_3$, конгруэнтный ABC , такимъ образомъ, чтобы онъ былъ расположенъ внѣ квадрата, построеннаго на гипотенузѣ. Если мы повернемъ четырехугольникъ A_2ABB_1 вокругъ вершины A такимъ образомъ, чтобы точка A_2 упала въ точку C , то точка B упадетъ въ точку A_3 , точка B_1 — въ точку C_3 . Такимъ же образомъ четырехугольникъ A_2ABB_1

¹⁷⁾ Въ послѣдней части $A_4TA_5 \cong MQN, A_4RS \cong NDQ, TA_5R \cong QME$.

вращением вокруг точки B может быть приведен в совмещение с четырехугольником C_3B_3BC . Так как, далее, четырехугольник $A_1A_2B_1B$ конгруэнтен четырехугольнику $A_2B_2C_1B_1$, то шестиугольник $A_2A_1BB_1C_1B_2$ конгруэнтен шестиугольнику $CA_3A_3C_3B_3B$; но каждый из этих шестиугольников содержит по два данных прямоугольных треугольника Δ , ибо $\Delta \cong ABC \cong B_2CC_1 \cong A_3B_3C_3$. Отнимая по 2Δ



Фиг. 109.

отъ обоихъ шестиугольниковъ, мы получаемъ равновеликія фигуры, именно, съ одной стороны, сумму квадратовъ, построенныхъ на катетахъ, а съ другой стороны, — квадратъ, построенный на гипотенузѣ*).

П. Эпштейнъ (P. Epstein) замѣтилъ, что это доказательство легко превратить въ такое, которое даетъ самое разложение**). Достаточно только продолжить прямыя A_1A_3 и BB_3 до пересѣченія съ прямою A_2CB_1 и принять во вниманіе точки U и V , съ которыми совмѣстится вершина C при упомянутыхъ выше вращеніяхъ четырехугольника A_2ABB_1 ; какъ легко усмотрѣть по соотношеніямъ

между углами, отмѣченными на фигурѣ, эти точки лежатъ на прямой CC_3 ; тѣ части фигуръ, которыя отмѣчены пунктиромъ, теперь, конечно, можно опустить. Если мы еще проведемъ $UX \parallel A_2CB_1 \parallel VY$, то квадратъ, построенный на гипотенузѣ, распадается на 8 попарно конгруэнтныхъ треугольниковъ, которые въ другомъ расположеніи составляютъ также сумму квадратовъ, построенныхъ на катетахъ.

5. Хотя основныя предложенія теории площадей такимъ образомъ легко доказываются, въ особенности, если мы пользуемся аксіомой Архимеда, мы все же не должны себя обманывать; нельзя думать, что одно лишь только опредѣленіе равенства и неравенства площадей, а также сложения (посредствомъ приложенія), уже претворяетъ совокупности площадей въ величину; напротивъ, для этого требуется еще, чтобы было

*) Пифагоръ жилъ въ VI столѣтіи до Р. X., но уже приблизительно за 1200 лѣтъ до этого времени египтянамъ былъ извѣстенъ частный случай, именно, прямоугольный треугольникъ со сторонами 3, 4 и 5; весьма вѣроятно, что имъ пользовались для нанесенія прямыхъ угловъ. Ср. M. Cantor, „Über die älteste indische Mathematik (Archiv der Math. u. Phys., [3] 8, 63—72).

**) Ср. „Zeitschr. f. math. u. naturw. Unterr.“ XXXVII (1906).

возможно определить и „умножение“; требуется также доказательство, что операции, названные сложением и умножением, подчиняются тѣмъ же законамъ сопряжения, какъ и въ ариѳметикѣ; наконецъ, нужно еще, чтобы существовало по одному и только одному значенію, представляющему аналогію нуля и единицы. Въ проективной системѣ измѣренія отрезковъ мы строго провели всѣ эти требованія. Въ настоящемъ случаѣ прямой путь въ этомъ отношеніи привелъ бы къ слишкомъ большимъ трудностямъ. Гильбертъ въ своихъ „Основаніяхъ“ (§ 20) далъ гораздо болѣе простой приемъ, который, правда, на первый взглядъ представляется нѣсколько страннымъ ¹⁸⁾.

Если a, b, c суть стороны треугольника Δ , а h_a, h_b, h_c суть соотвѣтственные высоты, то $a : h_b = b : h_a$, $a : h_c = c : h_a$, такъ что

$$a \cdot h_a = b \cdot h_b = c \cdot h_c \text{ }^{19)}.$$

Произведеніе изъ стороны треугольника на соотвѣтствующую ей высоту не зависитъ отъ выбора стороны; точно такъ же и половина этого произведенія. Это послѣднее мы назовемъ мѣрой площади треугольника Δ и будемъ обозначать черезъ $J(\Delta)$, такъ что:

$$J(\Delta) = \frac{1}{2} a \cdot h_a = \frac{1}{2} b \cdot h_b = \frac{1}{2} c \cdot h_c.$$

Умѣстность коэффиціента $\frac{1}{2}$ вскорѣ обнаружится. Теперь мы многоугольникамъ присвоимъ характеръ величины такимъ путемъ, что мы и имъ, какъ и треугольнику, присвоимъ мѣру площади. Доказательство же того, что площади дѣйствительно имѣютъ характеръ величины, необходимо для того, чтобы обнаружить допустимость опредѣленія равновеликихъ многоугольниковъ, такъ какъ *à priori* не лишено возможности и такое предположеніе, что всѣ многоугольники, быть можетъ, равновелики. Когда Евклидъ при доказательствѣ обращенія предложеній 2 и 4 пользуется общимъ положеніемъ *καὶ τὸ ὅλον τοῦ μέρους μείζον ἐστὶ* (цѣлое больше части), то этимъ именно онъ и постулируетъ, какъ указываетъ Гильбертъ, что площади имѣютъ характеръ величины.

6. Отрезокъ, который соединяетъ вершину S треугольника Δ съ точкой противоположной стороны g , называется трансверсалью треугольника. Трансверсаль производитъ трансверсальное дѣленіе треугольника на два составляющихъ треугольника, которые имѣютъ точку S общей

¹⁸⁾ См. дополнение II „Объ измѣреніи площадей и объемовъ“ въ концѣ книги.

¹⁹⁾ На каждое изъ этихъ произведеній можно смотрѣть двояко: либо какъ на произведеніе чиселъ, измѣряющихъ соотвѣтствующіе отрезки,— и тогда это равенство гласитъ, что три произведенія даютъ одно и то же число, либо какъ на произведеніе отрезковъ въ смыслѣ указанного выше исчисленія отрезковъ,— въ такомъ случаѣ это равенство гласитъ, что указанные три произведенія выражаются однимъ и тѣмъ же отрезкомъ. Авторъ указываетъ ниже, что онъ предпочитаетъ послѣднюю точку зрѣнія.

вершиной, а основания которых g_1 и g_2 лежат на прямой g . Оба составляющих треугольника имѣютъ одну и ту же высоту b , вслѣдствіе чего мы получаемъ:

$$J(\Delta) = \frac{1}{2}bg = \frac{1}{2}b(g_1 + g_2) = J(\Delta_1) + J(\Delta_2).$$

Повторное примѣненіе этой формулы даетъ:

Вспомогательное предположеніе. Если треугольникъ Δ раздѣленъ на составляющіе треугольники такимъ образомъ, что всѣ вершины послѣднихъ расположены на двухъ сторонахъ даннаго треугольника, то мѣра площади треугольника Δ равна суммѣ мѣръ площадей составляющихъ треугольниковъ (фиг. 110).

Если, напротивъ, треугольникъ Δ разложенъ на составляющіе треугольники α такимъ образомъ, что нѣкоторыя вершины послѣднихъ A_1, A_2, \dots, A_n расположены внутри треугольника Δ , а не на его сторонахъ (тогда



Фиг. 110.



Фиг. 111.

какъ другія вершины расположены на сторонахъ треугольника Δ), то мы соединимъ вершину S треугольника Δ съ точками A_1, A_2, \dots, A_n и продолжимъ эти прямыя до пересѣченія съ основаніемъ треугольника Δ въ точкахъ B_1, B_2, \dots, B_n . Вслѣдствіе этого треугольникъ Δ разбивается на $n+1$ треугольниковъ $\delta, \delta_1, \dots, \delta_n$, имѣющихъ ту же вершину и ту же высоту; поэтому, согласно нашему вспомогательному предположенію, мѣра площади треугольника Δ равняется суммѣ мѣръ площадей этихъ составляющихъ треугольниковъ. Обозначеніе вершинъ A_1, A_2, \dots, A_n могло быть выбрано такимъ образомъ, чтобы ни въ одномъ изъ $n+1$ треугольниковъ δ не было внутри вершинъ A . Каждый изъ треугольниковъ δ разобьется поэтому на треугольнички и четырехугольнички, вершины которыхъ лежатъ на его сторонахъ (фиг. 111). Если мы каждый изъ четырехугольничковъ при помощи діагонали разобьемъ на треугольнички, то мѣра площади треугольника δ , согласно вспомогательному предположенію, равняется суммѣ мѣръ площадей составляющихъ треугольниковъ ϵ . Такимъ образомъ, $J(\Delta)$ можетъ быть представлено въ видѣ суммы мѣръ площадей всѣхъ треугольниковъ ϵ , которые въ совокупности образуютъ треугольники δ . Но изъ тѣхъ же треугольниковъ ϵ составляются также треугольники α первоначальнаго разложенія, и при томъ по типу фигуры 106, ибо трансверсали SB_1, SB_2, \dots , выходящія

изъ вершины S , не лежащей внутри какого либо изъ треугольниковъ α , производить дѣленіе именно по типу фигуры 106. Слѣдовательно, сумма мѣръ площадей всѣхъ треугольниковъ α равняется суммѣ мѣръ площадей всѣхъ составляющихъ треугольниковъ ϵ . Вмѣстѣ съ тѣмъ мы получаемъ окончательно:

Предложеніе 7. Если треугольникъ какимъ бы то ни было образомъ раздѣленъ на конечное число составляющихъ треугольниковъ, то мѣра площади этого треугольника равняется суммѣ мѣръ площадей составляющихъ треугольниковъ; $J(\Delta) = \sum J(\alpha)$.

Если многоугольникъ разбивается разъ на треугольники $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_p$, другой разъ на треугольники $\Delta'_1, \Delta'_2, \dots, \Delta'_q$, и мы одновременно произведемъ оба разложенія, то треугольники Δ и Δ' , какъ показано на фиг. 106, могутъ быть разбиты на одни и тѣ же составляющіе треугольники $\delta_1, \dots, \delta_n$; вслѣдствіе этого

$$\sum J(\Delta) = \sum J(\delta) = \sum J(\Delta').$$

Если мы поэтому опредѣлимъ мѣру площади $J(P)$ многоугольника P , какъ сумму мѣръ площадей всѣхъ составляющихъ треугольниковъ Δ , на которые послѣдніе разбиваются при какомъ-либо одномъ опредѣленномъ разложеніи, то $J(P)$ не зависитъ отъ характера разложенія: $J(P) = \sum J(\Delta) = \sum J(\Delta')$; оно вполне опредѣляется самимъ многоугольникомъ. Для многоугольника $X + Y$, состоящаго изъ частей X и Y , $J(X + Y) = J(X) + J(Y)$. Въ виду же предложенія 7 мы получаемъ:

Предложеніе 8. Равносоставленные многоугольники имѣютъ одинаковую мѣру площади.

Пусть далѣе P и Q будутъ равновеликіе многоугольники; въ такомъ случаѣ, согласно опредѣленію равновеликихъ многоугольниковъ, существуютъ два такихъ равносоставленныхъ многоугольника P' и Q' , что многоугольникъ $(P + P')$, состоящій изъ многоугольниковъ P и P' , равносоставленъ съ многоугольникомъ $(Q + Q')$, состоящимъ изъ многоугольниковъ Q и Q' . Поэтому, согласно предложенію 7:

$$J(P') = J(Q'), \quad J(P + P') = J(Q + Q');$$

такъ какъ, съ другой стороны, $J(X + Y) = J(X) + J(Y)$, то отсюда слѣдуетъ:

$$J(P) = J(Q), \text{ т. е.}$$

Предложеніе 9. Равновеликіе многоугольники имѣютъ одинаковую мѣру площади.


7. Теперь не трудно доказать обращенія предложеній 2 и 4:

Предложение 10. Равновеликіе параллелограммы съ равными основаниями имѣютъ равныя высоты.

Предложение 11. Равновеликіе треугольники съ равными основаниями имѣютъ равныя высоты.

Въ самомъ дѣлѣ, если g обозначаетъ общее основаніе, b и b_1 — высоты, то, въ случаѣ предложения 10, $gb = gb_1$, а, въ случаѣ предложения 11, $\frac{1}{2}gb = \frac{1}{2}gb_1$. Въ томъ и въ другомъ случаѣ, слѣдовательно, $b = b_1$.

Если мы черезъ вершину B многоугольника $ABCD \dots$ (фиг. 112) проведемъ прямую p , параллельную прямой AC , соединяющей несмежныя вершины A и C , то наймъ многоугольникъ равновеликъ всякому другому многоугольнику $ABCDE \dots$, вершина котораго B лежитъ на прямой p (предложение 4). Если, поэтому, точка B лежитъ одновременно также на сторонѣ многоугольника DC или на ея продолженіи, то многоугольникъ $AB'CDE \dots$ или $AB'DE \dots$ имѣетъ одной вершиной (C) меньше. Повторяя этотъ же самый приемъ достаточное число разъ, мы необходимо придемъ къ треугольнику Δ , который равновеликъ данному многоугольнику, а потому имѣетъ съ нимъ одинаковую мѣру площади (предл. 9).



Фиг. 112.

Двумъ многоугольникамъ P и P' , имѣющимъ одинаковую мѣру площади J , отвѣчаютъ въ такомъ случаѣ два треугольника Δ и Δ' , имѣющіе одинаковую мѣру площади. Пусть A, B, C будутъ вершины одного изъ этихъ треугольниковъ, A', B', C' — вершины другого. Изъ точекъ A и A' радиусомъ g , болѣе, нежели стороны AC и $A'C'$, мы опишемъ окружности. Въ такомъ случаѣ каждая изъ этихъ окружностей пересѣчетъ прямую p и соответственно p' , проходящую черезъ вершину C и соответственно черезъ C' , параллельно основанію треугольника; если Z есть одна изъ точекъ пересѣченія на прямой p , а Z' одна изъ точекъ пересѣченія на прямой p' , то треугольники AZB и $A'Z'B'$ имѣетъ ту же мѣру площади J ; но, такъ какъ сверхъ того ихъ стороны AZ и $A'Z'$ также равны между собой, именно, равны числу g , то при соответствующихъ этимъ сторонамъ высотахъ b и b' , $\frac{1}{2}gb = \frac{1}{2}gb'$, а потому $b = b'$; треугольники AZB и $A'Z'B'$, такимъ образомъ, равновелики (предложение 4), а вмѣстѣ съ тѣмъ равновелики треугольники Δ и Δ' , а, слѣдовательно, и многоугольники P и P' . Мы получаемъ, такимъ образомъ, слѣдующее обращеніе предложения 9.


Предложение 12. Многоугольники, имѣющіе одинаковую мѣру площади, равновелики.

Произведение gb и $\frac{1}{2}gb$ мы здѣсь постоянно понимаемъ въ смыслѣ символическаго исчисленія § 21, оперирующаго надъ самыми отрѣзками, а не надъ измѣряющими ихъ числами. Такимъ образомъ, доказано важное предположеніе 9 и его обращеніе 12, откуда явствуетъ тождество равно-великости съ равенствомъ мѣры площади; вмѣстѣ съ тѣмъ этимъ вполне установлено, что площадь многоугольника имѣетъ характеръ величины. Терминъ, введенный Гильбертомъ, — мѣра площади, — нужно понимать, конечно, не въ метрическомъ смыслѣ этого слова, т. е. не какъ измѣряющее число, а какъ произведеніе въ смыслѣ исчисленія отрѣзковъ, развитаго въ § 21. $\frac{1}{2}gb$ является, слѣдовательно, равнозначимымъ съ $\frac{1}{2} \cdot g'e \cdot b/e$, гдѣ e есть отрѣзокъ, принятый за единицу. Коэффициентъ $\frac{1}{2}$ введенъ въ выраженіе мѣры площади треугольника, очевидно, съ той цѣлью, чтобы мѣра площади квадрата, имѣющаго сторону e , выражалась черезъ e^2 . Символическія формулы геометрическихъ операций надъ отрѣзками при этихъ условіяхъ вполне совпадаютъ съ тѣми формулами, которыя мы получаемъ, оперируя, какъ обыкновенно, надъ числами, измѣряющими отрѣзки. Если въ какомъ-либо треугольникѣ мы увеличимъ всѣ длины въ какомъ-нибудь отношеніи, то его площадь возрастетъ въ отношеніи, равномъ квадрату этого числа. Разлагая многоугольникъ на треугольники, мы отсюда получаемъ: въ подобныхъ многоугольникахъ мѣры площадей относятся, какъ квадраты сходственныхъ длинъ.

§ 23. Правильные многоугольники и окружность.

1. Изъ различныхъ примѣненій, которыя находятъ понятіе о подобіи площади, мы изложимъ здѣсь лишь самую важную, именно тѣ, которыя относятся къ дѣленію окружности на равныя части и къ ея измѣренію.

Многоугольникъ называется правильнымъ, если всѣ его стороны равны и заключаютъ равные углы. Мы разумѣемъ при этомъ углы, содержащіеся между послѣдовательными сторонами: $\sphericalangle ABC = \sphericalangle BCD = \sphericalangle CDE = \dots$ (фиг. 113). Если O есть точка пересѣченія биссектрисъ угловъ при вершинахъ A и B , то вслѣдствіе равенства этихъ угловъ $\sphericalangle OAB = \sphericalangle OBA$, а потому $OA = OB$; вмѣстѣ съ тѣмъ треугольники COB и COA конгруэнтны, такъ какъ они имѣютъ общую сторону OB , $BC = BA$ и углы, содержащіеся между равными сторонами, равны; поэтому $OC = OB$ и $\sphericalangle OCB = \sphericalangle OBC$. Теперь мы такимъ же



Фиг. 113.

образом обнаруживаем равенство треугольников BOC и COD, \dots ; отсюда слѣдуетъ, что точка O одинаково удалена отъ вершинъ многоугольника. Изъ конгруэнтности треугольниковъ AOB, BOC, \dots вытекаетъ также равенство перпендикуляровъ, опущенныхъ изъ точки O на стороны AB, BC, \dots . Эти факты мы можемъ выразить такъ:

Предложеніе 1. Каждому правильному многоугольнику соответствуетъ „описанная окружность“ (на которой лежатъ его вершины) и вписанная окружность (которой касаются ея стороны); эти окружности имѣютъ общій центръ O .

Точка O называется центромъ многоугольника. Отрѣзки, соединяющіе центръ съ вершинами правильного n -угольника, дѣлятъ его на n равныхъ равнобедренныхъ треугольниковъ. Если данъ одинъ изъ этихъ треугольниковъ, то мы можемъ воспроизвести весь многоугольникъ. Сообразно этому его называютъ „опредѣляющимъ треугольникомъ“. Уголъ при вершинѣ O опредѣляющаго треугольника въ правильномъ n -угольничкѣ составляетъ n -ую часть четырехъ прямыхъ, т. е. $\frac{4d}{n}$, гдѣ d , по обыкновенію, обозначаетъ прямой уголъ; за вершину мы всегда будемъ принимать центръ многоугольника. Дѣля углы при вершинѣ O пополамъ, мы изъ правильного n -угольника получаемъ правильный $2n$ -угольничкъ; изъ него получаемъ $4n$ -угольничкъ и т. д. Съ древнихъ временъ извѣстны 4 ряда правильныхъ многоугольниковъ, которые получаютъ путемъ послѣдовательнаго удвоенія отъ правильныхъ треугольника, четырехугольника, пятиугольника и 15-угольника.

Рядъ треугольника. Изъ правильного треугольника получается путемъ удвоенія прежде всего правильный 6-угольничкъ, въ которомъ опредѣляющій треугольничкъ имѣетъ при вершинѣ уголъ, равный $4d/6 = 2d/3$. Такъ какъ $2d/3 + 2d/3 + 2d/3 = 2d$, то $2d/3$ есть уголъ равносторонняго треугольника. Сторона правильного шестиугольника равна, слѣдовательно, радіусу, — обстоятельство, благодаря которому этотъ многоугольничкъ легко построить. Это было уже извѣстно древнимъ ассирианамъ. Первая, третья и пятая вершины правильного шестиугольника опредѣляютъ правильный треугольничкъ.

Рядъ квадрата. Уголъ при вершинѣ опредѣляющаго треугольника прямой. На этомъ рядѣ многоугольниковъ не приходится поэтому долго останавливаться. Правильные 4-угольнички (квадраты) очень часто встрѣчаются у древнихъ египтянъ въ орнаментахъ, а также въ качествѣ формы различныхъ предметовъ обихода.

2. Рядъ пятиугольника. Какъ и въ случаѣ треугольника, для построенія этого ряда мы исходимъ не отъ перваго его многоугольника,

а отъ второго, на что мы обратили уже вниманіе при алгебраической разработкѣ ученія о дѣленіи угла на равныя части. (Томъ I, § 97). Опредѣляющій треугольникъ AOB правильного 10-угольника имѣетъ при вершинѣ O уголъ $\omega = 4d/10 = 2d/5$. Углы при вершинахъ A и B (фиг. 114) составляютъ въ совокупности $2d - 2d/5 = 8d/5$; каждый же изъ нихъ въ отдѣльности равенъ $4d/5 = 2\omega$. Равнодѣлящая угла BAO встрѣчаетъ поэтому сторону OB въ нѣкоторой точкѣ C такимъ образомъ, что треугольникъ BAC , какъ и треугольникъ AOB , имѣетъ углы ω , 2ω и 2ω . Какъ треугольникъ BAC , такъ и треугольникъ ACO оказываются равнобедренными; слѣдовательно, $OC = CA = AB = s_{10}$, если s_n вообще обозначаетъ сторону правильного n -угольника. Радиусъ описанной окружности мы будемъ постоянно обозначать черезъ r . Изъ подобія треугольниковъ BAC и AOB вытекаетъ подобіе системъ отрѣзковъ (BC, AB) и (AB, OA) , или:

$$(r - s_{10}, s_{10}) \sim (s_{10}, r), \quad \text{откуда} \quad (r, s_{10}) \sim (s_{10} + r, r), \quad (1)$$

или въ обычныхъ обозначеніяхъ:

$$r : s_{10} = (s_{10} + r) : r, \quad r^2 = s_{10}(s_{10} + r). \quad (2)$$


Эти подобныя пары отрѣзковъ тотчасъ же напоминаютъ намъ доказательство Пифагоровой теоремы, приведенное въ § 21, и наводятъ на мысль воспользоваться той же фигурой для построенія стороны s_{10} *). Приспосабливая эту фигуру къ даннымъ настоящаго случая, мы получаемъ слѣдующее построеніе стороны s_{10} по радиусу r . Изъ точки O проводимъ перпендикуляръ OV къ прямой OY , откладываемъ на немъ отрѣзокъ $OV = r/2$ и изъ точки V , какъ центра, описываемъ окружность радиусомъ, равнымъ VO . Эта окружность встрѣчаетъ отрѣзокъ OY въ нѣкоторой точкѣ X (а его продолженіе въ точкѣ Y); въ такомъ случаѣ OX есть искомая сторона правильного 10-угольника. Дѣйствительно, треугольники OXO и VOY имѣютъ равныя углы, а потому подобны. Вмѣстѣ съ тѣмъ $(VO, OX) \sim (OY, VO)$, или $(r, s_{10}) \sim (r + s_{10}, r)$. Связь этого построенія съ построеніемъ правильного десятиугольника видна на фиг. 114.

По поводу этой фигуры слѣдуетъ еще замѣтить, что точка C дѣлитъ радиусъ OB на двѣ части, обладающія слѣдующимъ свойствомъ: пара отрѣзковъ, состоящая изъ большей и меньшей части, подобна парѣ, состоящей изъ большей части и всего отрѣзка OB или, согласно равенству (1), въ формулахъ:

$$(r - s_{10}, s_{10}) \sim (s_{10}, r), \quad (r - s_{10}) : s_{10} = s_{10} : r.$$

*) Здѣсь можно было бы воспользоваться предложеніемъ о сѣкущихъ и касательной, выходящихъ изъ одной точки; однако, это предложеніе будетъ выведено только въ слѣдующемъ параграфѣ.

Такъ какъ при чтеніи послѣдней пропорціи къ члену s_{11} правой части перваго отношенія примыкаетъ также членъ s_{10} лѣвой части втораго отношенія, то въ такихъ случаяхъ говорятъ о непрерывной пропорціи, каковая въ общемъ случаѣ имѣетъ слѣдующій видъ: $x : y = y : z$; подъ пропорціей мы разумѣемъ, какъ и въ ариметикѣ, равенство двухъ дробей или „отношеній“, — понятіе, совершенно утратившее важное значеніе, которое оно прежде имѣло, такъ какъ новая элементарная геометрія обходится безъ метрическихъ соотношеній отрезковъ. Часто говорятъ также, что точка C



Фиг. 114.

дѣлитъ отрезокъ OB непрерывно, или что она производитъ золотое сѣченіе (sectio aurea): золотымъ это сѣченіе (дѣленіе отрезка) называется вслѣдствіе того значенія, которое оно имѣетъ въ геометріи и въ эстетикѣ: утверждаютъ, что эллипсъ или же прямоугольникъ производить на глазъ наиболее пріятное впечатлѣніе, если оси или, соответственно, стороны выбраны такимъ образомъ, что, будучи приложены другъ къ другу на одной прямой, онѣ образуютъ золотое сѣченіе того отрезка, которое онѣ совместно составляютъ. Нѣкоторые утверждаютъ, что и въ другихъ случаяхъ наиболее пріятныя метрическія соотношенія находятся въ связи съ непрерывнымъ дѣленіемъ отрезковъ (ср. томъ I, стр. 111, 112).

Мы займемся еще определением численного отношения частей OC и CB на фиг. 114. Из соотношения $s_{10}^2 = r(r - s_{10})$ слѣдует:

$$s_{10} = -1/2 \cdot r + \sqrt{r^2/4 + r^2} = 1/2 \cdot r(\sqrt{5} - 1);$$

$$(r - s_{10}) : s_{10} = (3 - \sqrt{5}) : (\sqrt{5} - 1) = (\sqrt{5} - 1) : 2.$$

Сообразно этому имѣемъ приближенно:

$$(r - s_{10}) : s_{10} = 0,618 = 3/5.$$

Сравнениемъ угловъ на фиг. 114 можно обнаружить много весьма изящныхъ свойствъ правильного десятиугольника. Такъ, напримеръ, прямая AC должна проходить черезъ вершину I 10-угольника; при золотомъ сѣченіи радиуса r отрѣзокъ $I'Y = r + s_{10}$, появляющийся одновременно съ отрѣзкомъ $I'X = s_{10}$, равенъ отрѣзку UA , а потому представляеть собой сторону правильного звѣзднаго десятиугольника. Треугольничковъ съ углами ω , 2ω , 2ω и ω , ω , 3ω можно найти на этой фигурѣ почти неисчислимое количество: то же самое относится и къ правильному 5-угольнику, въ которомъ уголъ при вершинѣ опредѣляющаго треугольника равенъ 2ω .

3. Рядъ 15-угольника. Уголъ при вершинѣ опредѣляющаго треугольника въ правильномъ 15-угольникѣ составляетъ $1/15$ четырехъ прямыхъ или, такъ какъ $1/15 = 1,6 - 1/10$, $2d/3 - 2d/5$. Это есть разность угловъ при вершинѣ, которые соотвѣтствуютъ правильнымъ 6-угольнику и 10-угольнику. Отсюда непосредственно вытекаетъ самое построение. Путемъ удвоения мы получаемъ правильные 30-угольникъ, 60-угольникъ и т. д.

Математикамъ естественно представлялось заманчивымъ найти, помимо этихъ четырехъ рядовъ правильныхъ многоугольниковъ, построение циркулемъ и линейкой и другихъ правильныхъ многоугольниковъ и прежде всего правильного 7-угольника. Напрасивалась также мысль пользоваться при этомъ не только дѣленіемъ угла пополамъ, но и дѣленіемъ его на 3 части. Лишь послѣ обоснованія современной алгебры, даннаго Гауссомъ и Абелемъ, можно строго доказать, что дѣленіе угла на 3 части, а также построение правильныхъ многоугольниковъ выполняется циркулемъ и линейкой только въ немногихъ исключительныхъ случаяхъ. Въ частности, 7-угольникъ и 11-угольникъ не могутъ быть построены; напротивъ того, правильный 17-угольникъ, какъ показалъ Гауссъ, можетъ быть построенъ. Отсылаемъ читателей къ XVIII и XX главамъ I-го тома.

4. Какъ теоретическая геометрія не нуждается въ постоянномъ масштабѣ, такъ она не нуждается и въ постоянной мѣрѣ угловъ, тѣмъ болѣе, что тригонометрія, а также указанное въ § 21 изслѣдованіе Моллеруна, обнаруживаютъ, что измѣреніе угловъ можетъ быть вовсе исключено изъ геометріи. Перешедшее къ намъ отъ грековъ дѣленіе

окружности на 360 градусовъ и прямого угла на 90 градусовъ исходить изъ Вавилона; еще незадолго до Евклида писателю астроному Аутолику оно было неизвестно и введено, повидимому, Гипсиклесомъ Александрийскимъ (между 200 и 100 годами). Дѣленіе окружности на $360 = 6 \cdot 60$ частей, или градусовъ, изъ которыхъ каждый дѣлится на 60 меньшихъ подраздѣлений (минутъ), каковыя вновь дѣлятся даѣе на 60 секундъ, — это подраздѣленіе имѣетъ во всякомъ случаѣ искусственное происхождение; по весьма вѣроятнымъ соображеніямъ М. Кантора, оно принадлежитъ астрономамъ. Весьма возможно, что мы имѣемъ здѣсь грубое приближеніе числа дней въ году. Съ подраздѣленіемъ зекстанта на 60 частей должна, повидимому, находиться въ какой-то связи 60-ричная система вавилонянъ; послѣдніе представляютъ цѣлыя числа въ формѣ: $a + a_1 \cdot 60 + a_2 \cdot 60^2 + \dots$, гдѣ a, a_1, a_2, \dots суть цѣлыя числа, меньшія 60-ти. Какъ цѣлому числу, написанному въ десятиричной системѣ: $\chi = b + b_1 \cdot 10 + b_2 \cdot 10^2 + \dots$ ($b, b_1, b_2 \dots < 10$) натурально отвѣчаетъ десятиричная дробь, точно такъ же и 60-ричной системѣ въ томъ же порядкѣ идей отвѣчаетъ представление дробей въ видѣ:

$$\xi = \dots + c_3 60^3 + c_2 60^2 + c_1 60 + c + \gamma_1 60^{-1} + \gamma_2 60^{-2} + \dots$$

по убывающимъ степенямъ числа 60. Однако, это изображеніе чиселъ врядъ ли произошло отъ практиковавшагося приема счета *), ибо въ такомъ случаѣ и названія чиселъ у вавилонянъ должны были бы соответствовать 60-ричной системѣ; между тѣмъ названія эти у вавилонянъ, какъ у всѣхъ народовъ кавказской расы, сообразованы съ десятиричной системой. Къ тому же и начертаніе чиселъ по 60-ричной системѣ встрѣчается въ перемежку съ 10-ричной. Египтяне, которые еще раньше вавилонянъ выдѣлились изъ общей семитской семьи и въ древнѣйшихъ формахъ языка весьма близки къ вавилонянамъ, имѣли десятичное наименованіе чиселъ.


Построеніе углового градуса въ точности не выполняется циркулемъ и линейкой, но оно можетъ быть выполнено такимъ образомъ, что требуется только однократное дѣленіе угла на три равныя части. Въ самомъ дѣлѣ, уголь при вершинѣ опредѣляющаго треугольника въ правильномъ 10-угольникѣ содержитъ 36° ; соответствующій уголь правильного 12-угольника содержитъ 30° ; разность между ними 6 градусовъ; раздѣляемъ ее пополамъ, получаемъ 3° ; наконецъ, дѣленіе на 3 равныя части даетъ намъ 1° .

*) Въ журналѣ *Zeitschrift für Assyriologie* (Bezold) 12, pg. 73 - 95 Кевичъ (С. Kewitsch) указываетъ на то, какъ недостовѣрны еще наши свѣдѣнія по этому вопросу, и пытается обратно свести 60-ричную систему счисления и дѣленіе окружности на 360 частей къ какой-либо искусственной системѣ счета

5. Мы переходим теперь къ одной изъ труднѣйшихъ и знаменитѣйшихъ задачъ элементарной геометріи — къ выпрямленію окружности и квадратурѣ круга. — Многоугольникъ, вершины котораго лежатъ на окружности, называется вписаннымъ; многоугольникъ, стороны котораго касаются окружности, называется описаннымъ; относительно этихъ многоугольниковъ имѣетъ мѣсто слѣдующее предложеніе:

Предложеніе 2. Каждый многоугольникъ, описанный около окружности, имѣетъ большій периметръ, нежели любой многоугольникъ, вписанный въ ту же окружность.

Для доказательства этого важнаго предложенія мы соединимъ центръ O окружности со всѣми вершинами A, B, \dots вписаннаго n -угольника \mathcal{C} и опустимъ изъ точки O перпендикуляры на всѣ его стороны; эти $2n$ прямыхъ раздѣляютъ плоскость на $2n$ областей, каждая изъ которыхъ содержитъ также кусокъ периметра описаннаго многоугольника \mathcal{C} . Этотъ кусокъ представляетъ собою ломаную линію, которая начинается въ нѣкоторой точкѣ U на лучѣ, ограничивающемъ область, и оканчивается въ нѣкоторой точкѣ V на другомъ лучѣ, ограничивающемъ ту же область (фиг. 115). Отрѣзокъ UV въ такомъ случаѣ меньше этой ломаной и, во всякомъ случаѣ, не превышаетъ ее. Пусть OV будетъ лучъ, перпендикулярный къ одной изъ сторонъ AB вписаннаго многоугольника \mathcal{C} ; если мы проведемъ еще $UW \perp OV$, то отрѣзокъ UV , какъ гипотенуза прямоугольнаго треугольника UWV больше, нежели UW , или равенъ UW , если точки U, V, W располагаются на одной прямой; такимъ образомъ, та часть l периферіи многоугольника \mathcal{C} , которая расположена между лучами



Фиг. 115.

OA и OB , во всякомъ случаѣ больше, чѣмъ UW , или равна UW ; съ другой стороны, точка U , принадлежащая периферіи многоугольника \mathcal{C} , во всякомъ случаѣ не лежитъ внутри окружности; поэтому $OU \cong OA$ и $UW \leq AF$, $l > AF$. Равенство отрѣзковъ l и AF исключено, такъ какъ оно могло бы имѣть мѣсто только въ томъ случаѣ, если бы отрѣзокъ l совпадалъ съ UV , а послѣдній совпадалъ бы съ AF ; но это невозможно, потому что точка F лежитъ внутри окружности. Выстъ съ тѣмъ и сумма $2n$ частей l больше, нежели сумма соответствующихъ имъ отрѣзковъ AF , т. е. периферія многоугольника \mathcal{C} больше, нежели периферія многоугольника \mathcal{C} .

6. Предложение 3. Согласно предложению 2, разность между периметрами описанного и вписанного многоугольников есть положительная величина; эта разность может быть подходящим выбором многоугольников сделана меньше сколь угодно малаго отрезка ϵ .

Иными словами, она имеет нижней границей 0. Очевидно, достаточно доказать, что разность $U_n - u_n$ между периметрами правильного вписанного и правильного описанного n -угольников падает ниже всякаго предѣла ϵ , когда число сторон n неограниченно возрастает. Доказательство можно вести так: если мы проведем касательныя къ окружности, параллельныя сторонамъ правильного вписаннаго n -угольника, то получающійся такимъ образомъ правильный описанный n -угольникъ подобенъ вписанному и подобно съ нимъ расположенъ. Если мы еще опустимъ изъ центра O (фиг. 116) перпендикуляры r и ϱ_n , то $(U_n, r) \sim (u_n, \varrho_n)$, или $U_n : r = u_n : \varrho_n$, такъ что $U_n = r u_n / \varrho_n$. Поэтому

$$U_n - u_n = u_n (r - \varrho_n) / \varrho_n.$$

Мы навѣрное увеличимъ правую сторону, если мы справа 1) вмѣсто u_n подставимъ периметръ $8r$ правильнаго описаннаго четырехугольника, котораго u_n ни при какомъ n , конечно, достигъ не можетъ, и 2) въ знаменателѣ вмѣсто ϱ_n подставимъ наименьшее значеніе $r/2$, какое онъ способенъ принять (при $n=3$). Слѣдовательно, $U_n - u_n < 8r(r - \varrho_n)/(r/2)$, или

$$U_n - u_n < 16(r - \varrho_n).$$

Разность $U_n - u_n$ станетъ меньше ϵ , если мы сделаемъ $16(r - \varrho_n) = \epsilon$, т. е. $\varrho_n = r - \epsilon/16$. Съ этою цѣлью достаточно построить хорду, разстояніе которой отъ центра O было бы равно $r - \epsilon/16$, и откладывать ее вдоль по окружности. Если она отложится m разъ и не отложится $m + 1$ разъ, то достаточно выбрать $n > m$, чтобы $U_n - u_n$ было меньше ϵ , какъ это и требовалось.

Если на („полу“-)прямой g , ограниченной одной точкой O , мы будемъ откладывать послѣдовательно отъ точки O периметры вписанныхъ и описанныхъ правильныхъ многоугольниковъ, и если E_1, E_2, E_3, \dots суть конечныя точки периметровъ вписанныхъ многоугольниковъ, а U_1, U_2, U_3, \dots — конечныя точки периметровъ описанныхъ многоугольниковъ, то каждый периметръ OE меньше каждаго периметра OU . Разность же $OU - OE$ можетъ сделаться меньше любого сколько угодно малаго отрезка ϵ . Согласно § 23 тома I, отсюда слѣдуетъ, что существуетъ нѣкоторая точка K , которая одновременно служитъ верхней границей точекъ E и нижней границей точекъ U . Поэтому, если мы хотимъ и окружности приписать опредѣленную длину, то таковой можетъ служить только отрезокъ OK , къ которому неограниченно приближаются какъ

периметры вписанных, такъ и периметры описанныхъ правильныхъ многоугольниковъ при неограниченномъ увеличеніи числа сторонъ. Отсюда слѣдуетъ:

Предложеніе 4. Длина окружности больше периметра любого вписаннаго въ него многоугольника и меньше периметра любого описаннаго около него многоугольника.

7. Теперь каждому вписанному и описанному многоугольнику окружности κ , которую мы до сихъ поръ разсматривали, мы отнесемъ подобный многоугольникъ въ другой окружности κ' и периметры многоугольниковъ, принадлежащихъ окружности κ' , будемъ откладывать на другомъ лучѣ g' , выходящемъ изъ точки O' . Тогда каждой точкѣ E или F прямой g будетъ однозначно отнесена точка E' или F' прямой g' ; вследствие подобія соответствующіе отрезки прямыхъ g и g' относятся, какъ радіусы r и r' окружностей κ и κ' . Въ частности отрезку OK прямой g отвѣчаетъ отрезокъ $O'K'$ прямой g' , измѣряющій периферію окружности κ' , а вмѣстѣ съ тѣмъ $OK : O'K' = r : r'$.

Съ этимъ вполне согласуется та точка зрѣнія, что на самыхъ окружностяхи нужно смотрѣть, какъ на подобныя линіи. Прямая c , соединяющая центры O и O' окружностей κ и κ' , встрѣчаетъ окружность κ , скажемъ, въ точкахъ A и B и окружность κ' въ точкахъ A' и B' . Пусть C будетъ любая третья точка окружности κ ; черезъ точку A' проведемъ прямую, параллельную AC , черезъ B' прямую, параллельную BC ; пусть C' будетъ точка пересѣченія этихъ параллелей. Въ такомъ случаѣ $\sphericalangle A'C'B' = \sphericalangle ACB$, а такъ какъ послѣдній уголъ вписанъ въ полуокружность и, слѣдовательно, представляетъ собой прямой уголъ, то $\sphericalangle A'C'B'$ также есть прямой, и, слѣдовательно, точка C' лежитъ на окружности κ' . Каждой точкѣ C окружности κ отвѣчаетъ, такимъ образомъ, опредѣленная точка окружности κ' , при чемъ всегда $A'C' \parallel AC$, $B'C' \parallel BC$. Изъ теоремы о вписанныхъ углахъ слѣдуетъ, что соответствующія хорды обѣихъ окружностей всегда параллельны. Окружности представляютъ собой, слѣдовательно, подобныя и подобнымъ образомъ расположенныя фигуры.

Окружность круга κ' , имѣющаго радіусъ $r' = 1$, мы обозначимъ черезъ 2π . Тогда $OK = r \cdot O'K' / 1' = 2\pi r$; итакъ:

Предложеніе 5. Длина окружности радіуса r равна $2\pi r$, гдѣ π есть половина длины окружности радіуса 1 или длина цѣлой окружности діаметра 1.

8. Какъ периметры, такъ и площади многоугольниковъ \mathcal{C} , вписанныхъ въ окружность κ , имѣютъ верхнюю границу, которая совпадаетъ съ нижней границей площадей многоугольниковъ \mathcal{C} , описанныхъ около той же окружности. Въ самомъ дѣлѣ, если мы соединимъ вершины этихъ многоугольниковъ съ центромъ O , то они разбиваются на треугольники;

опустивъ изъ точки O перпендикуляры на противоположашя стороны и суммируя площади треугольниковъ, мы найдемъ, что площадь многоугольника Π равняется $\frac{1}{2}r \cdot U$, гдѣ U есть периметръ многоугольника Π . Съ другой стороны, относительно многоугольника \mathcal{E} можно утверждать, что его площадь во всякомъ случаѣ больше, нежели $\frac{1}{2}q \cdot E$, гдѣ E означаетъ периметръ многоугольника \mathcal{E} , а q есть наименьшій изъ перпендикуляровъ, который можно опустить изъ точки O на стороны многоугольника \mathcal{E} . Такъ какъ, съ другой стороны, q имѣетъ верхней границей r , величины же U отдѣляются отъ величинъ E общей границей $2\pi q$, то

$\frac{1}{2}r \cdot 2\pi r = r^2\pi$ представляетъ собой одновременно верхнюю границу площадей многоугольниковъ \mathcal{E} и нижнюю границу площадей многоугольниковъ Π ; этой границы $r^2\pi$ не достигаютъ площади ни тѣхъ, ни другихъ многоугольниковъ; она принимается за площадь самого круга, который раздѣляетъ многоугольники съ большей площадью отъ многоугольниковъ съ меньшей площадью.

9. Для опредѣленія числа π уже Архимедъ пользовался тѣмъ обстоятельствомъ, что разность $U_n - u_n$ периметровъ описаннаго и вписаннаго правильныхъ многоугольниковъ при неограниченномъ возрастаніи числа n падаетъ ниже всякой границы ϵ .

Возрастаніе числа n по Архимеду проще всего достигается путемъ послѣдовательнаго удвоенія числа сторонъ.

По сторонѣ s_n правильнаго вписаннаго n -угольника s_{2n} легко опредѣляется съ помощью теоремы Пифагора. Какъ видно изъ фиг. 116,

$$s_{2n}^2 = (r - \rho_n)^2 + (s_n/2)^2,$$

гдѣ

$$\rho_n^2 = r^2 - (s_n/2)^2 = (4r^2 - s_n^2)/4,$$

такъ что

$$s_{2n}^2 = 2r^2 - 2r\sqrt{r^2 - s_n^2/4},$$


$$s_{2n} = r\sqrt{2 - \sqrt{4 - s_n^2/r^2}}. \quad (1)$$

Въ виду подобія треугольниковъ, фигурирующихъ на фиг. 116,

$$S_n : r = s_n : \rho_n,$$

или

$$S_n = r s_n / \rho_n = 2s_n / \sqrt{4 - s_n^2/r^2}. \quad (2)$$



Фиг. 116.

Съ помощью формулы (1) по какой-либо известной намъ сторонѣ s_n можно вычислить сначала s_{2n} , по ней s_{4n} , затѣмъ s_{8n} и т. д.; помощью же формулы (2) мы соответственно находимъ $S_n, S_{2n}, S_{4n}, \dots$ и, наконецъ, $U_m = m \cdot S_m$ и $u_m = m \cdot s_m$, при $m = 2n, 4n, 8n, \dots$

Вводя еще діаметръ $d = 2r$, мы имѣемъ: $u_m < \pi d < U_m$, при $m = n, 2n, 4n, 8n, \dots$

Исходя отъ случая $n = 6$, гдѣ $s_6 = r$, мы получаемъ приближенно:

$u_6 = 3,00000d$	$U_6 = 3,46410d$
$u_{12} = 3,10583d$	$U_{12} = 3,21539d$
$u_{24} = 3,13263d$	$U_{24} = 3,15966d$
$u_{48} = 3,13935d$	$U_{48} = 3,14609d$
$u_{96} = 3,14103d$	$U_{96} = 3,14271d$
$u_{192} = 3,14145d$	$U_{192} = 3,14187d$
$u_{384} = 3,14156d$	$U_{384} = 3,14166d$
$u_{768} = 3,14158d$	$U_{768} = 3,14161d$
$u_{1536} = 3,14159d$	$U_{1536} = 3,14160d$

Ограничиваясь поэтому 4-мя десятичными знаками, мы имѣемъ $\pi = 3,1416$.

10. Число π имѣть почти четырехтысячелѣтнюю исторію, которую можно раздѣлить на 3 періода.

Первый періодъ. Геометрическое вычисленіе числа π . Самымъ древнимъ приближеннымъ значеніемъ числа π , повидимому, было $\pi = 3$, которое было принято у семитскихъ народовъ еще до ихъ раздѣленія и отъ нихъ, вѣроятно, перешло къ китайцамъ. Значеніе $\pi = 3$ встрѣчается въ Библии два раза: въ первой книгѣ Царей (7, 23) и во второй книгѣ Паралипоменонъ (4, 2) сказано, что большой бассейнтъ, который, какъ „литое море“, украшалъ передній дворъ Соломонова храма (построеннаго около 1000 л. до Р. X.), имѣлъ въ ширину „отъ края до края 10 локтей“, а „шнурокъ въ 30 локтей обнималъ его кругомъ“; слѣдовательно, $\pi = 3$.

О первыхъ шагахъ древнихъ египтянъ въ геометрію мы имѣемъ свѣдѣнія изъ папируса Ринда, принадлежащаго Британскому музею и описаннаго Эйзенлоромъ*). „Сочинена была эта книга“, какъ сообщено въ самомъ ея предисловіи, при царѣ Раусѣ по образцу сочиненій изъ временъ царя Раенмата писаремъ Ахмесомъ**). Здѣсь мы

*) A. Eisenlohr. „Ein mathematisches Handbuch der alten Ägypter“ (Leipzig, 1877).

**) У Эйзенлора эти имена даны въ транскрипціи: Ra-n-us, Ra-en-mat, Ahmes. Но транскрипція Айзенлора, которая удержалась въ литературѣ по исторіи

въ первый разъ (въ №№ 41—43, 48, 50) встрѣчаемся съ квадратурой круга въ истинномъ значеніи слова, т. е. съ задачей о превращеніи круга въ равновеликій квадратъ. Сторона послѣдняго принимается равной диаметру, уменьшенному на $\frac{1}{9}$ его величины; такимъ образомъ,

$$(2r \cdot 8/9)^2 = r^2 \pi, \quad \pi = 3,16 \dots$$

Это значеніе, возникшее, повидимому, вслѣдствіе ожиданія рациональнаго значенія для стороны квадрата $s = r\sqrt{\pi}$, врядъ ли имѣетъ чисто эмпирическое значеніе и представляется по настоящее время загадочнымъ. У Герона Александрійскаго (около 100 л. до Р. X.), много почерпавшаго изъ древне египетскихъ источниковъ, мы этого значенія не находимъ. Послѣ долгихъ и тщетныхъ попытокъ греческихъ математиковъ превратить площадь круга въ равновеликій квадратъ Архимедъ Сиракузскій (287—212 г.г. до Р. X.) въ своемъ знаменитомъ сочиненіи объ измѣреніи окружности (*Κόκλον μέτρον*) далъ приблизительно ту теорію измѣренія окружности, которая и по настоящее время излагается въ школахъ. При помощи правильныхъ 96-угольниковъ, вписаннаго и описаннаго, онъ нашелъ, что $3^{10}/71 < \pi < 3^{17}/7$ или

$$3,1408 \dots < \pi < 3,1428 \dots;$$

этому результату нужно тѣмъ болѣе удивляться, что числовыя вычисленія въ ту пору (безъ десятичныхъ дробей) были сопряжены съ чрезвычайными затрудненіями. Знаменитый авторъ *μεγάλη σύνταξις*) Клавдій Птолемей (приблизительно между 87 и 165 г.г. по Р. X.) на шель съ помощью (вавилонской) 60-ричной дроби $\pi = 3^{\circ}8'30''$, т. е. $\pi = 3 + 8/60 + 30/60^2 = 3,14166 \dots$ — Римляне, какъ извѣстно, въ математикѣ дали мало и въ дѣло измѣренія окружности также не внесли ничего. Можно было бы ожидать, что индусы, располагавшіе прекрасной системой счисленія, разработаютъ дальше идею, указанную Архимедомъ. И дѣйствительно, Ариабатта (латинская транскрипція *Aryabhata*, рол. въ 476 г. п. Р. Xр.), исходя отъ стороны 6-угольника, провель вычисленіе дальше 96-угольника и дошелъ до 384-угольника и значенія $\pi = 31416/10000$. Почти въ ту же пору мы встрѣчаемъ также болѣе грубое приближеніе $\pi = \sqrt{10} = 3,162 \dots$. Переселеніе народовъ вызвало сильный регрессъ въ научной культурѣ. Въ средніе вѣка арабы первые опять подвинули впередъ задачу объ измѣреніи круга путемъ построенія обширныхъ тригонометрическихъ таблицъ. Наиболѣе выдающийся изъ христіанскихъ ученыхъ этой эпохи Леонардъ Пизанскій первый ушелъ дальше Архимеда; именно, въ своемъ сочиненіи „Practica

математики, основывается на такомъ чтеніи нѣкоторыхъ іероглифовъ, принимаемыхъ за гласныя буквы или за гласныя слоги съ придыханіемъ, которос въ настоящее время признано неправильнымъ.

geometriae" (1220), ограничиваясь также, как и Архимедъ, 96-угольникомъ, онъ заключилъ все же число π въ болѣе узкіе предѣлы, именно: между числами $1440/458 \frac{1}{2} = 3,1408 \dots$ и $1440/458 \frac{1}{3} = 3,1428 \dots$ — Слѣдующія два столѣтія не подвинули впередъ рѣшенія этой задачи. Въ промежутокъ времени между 1450 и 1460 г.г. кардиналъ Николай Кузанскій снова обратилъ вниманіе широкихъ круговъ на задачу объ измѣреніи окружности и (по примѣру арабско-индусскихъ ученыхъ?) внесъ въ ея разрѣшеніе новую идею; именно, — онъ предложилъ обратно, исходя отъ даннаго отрѣзка, строить правильные треугольники, шестиугольники, 12-угольники и т. д., периметры которыхъ равны этому отрѣзку, приближаясь, такимъ образомъ, къ окружности (аркуфикация прямой). Его построеніямъ отвѣчаетъ значеніе $\pi = 3,1423 \dots$. Менѣе удачными оказались его прямыя вычисленія; при этомъ, какъ и нѣкоторые изъ ближайшихъ его предшественниковъ, онъ впалъ въ ту ошибку, что принялъ значеніе π , получаемое путемъ включенія его въ опредѣленные предѣлы, за точное. Та же ошибка послѣдствіемъ неоднократно вновь выплываетъ. Великіе люди эпохи Возрожденія не получили здѣсь ничего новаго. Къ концу этой эпохи Адрианъ Мецій (Adrianus Metius) начинаеть періодъ, въ который съ большимъ увлеченіемъ занимались различными вычисленіями, при чемъ дать значеніе π съ возможно большимъ числомъ десятичныхъ знаковъ было дѣломъ особаго честолюбія. Адрианъ далъ значеніе π , которое легко запоминается по схемѣ 133|355, именно $\pi = 355/113 = 3,1415929 \dots$, неправильное только въ седьмомъ десятичномъ знакѣ. Въ томъ же порядкѣ идей работалъ Адрианъ Романусъ (Adrianus Romanus, умеръ въ 1616 году), который дошелъ до многоугольника, имѣющаго 2^{30} сторонъ (!), и, такимъ образомъ, обезпечилъ 15 десятичныхъ знаковъ. Далѣе Лудольфъ ванъ Цейленъ (Ludolf van Ceulen)*) при помощи многоугольника о $60 \cdot 2^{29}$ сторонахъ (!) ушелъ дальше предыдущаго автора на пять десятичныхъ знаковъ. Всѣ трое суть вычислители, не внесшіе никакихъ новыхъ идей. Иначе обстоитъ дѣло съ великимъ французскимъ математикомъ Виета (Vieta, 1540 — 1606); послѣдній впервые далъ точное аналитическое выраженіе числа π (въ формѣ безконечнаго произведенія; къ этому мы еще возвратимся). Онъ принадлежитъ уже къ математикамъ ближайшаго великаго періода, которые стараются опредѣлить число π при помощи аналитическихъ выраженій. Геометрической періодъ исторіи числа π завершили Снелліусъ (Snellius, 1580 — 1626) и Гюйгенсъ (Huygens, 1629 — 1695), которые впервые послѣ Архимеда внесли существенное улучшеніе въ пріемъ вычисленія π при помощи вписанныхъ и описанныхъ многоугольниковъ. Сдѣланный ими шагъ впередъ заключался въ томъ, что они при помощи правильнаго описаннаго и вписаннаго n -угольника суживали предѣлы, въ которыхъ заключается число π , не удваивая

*) Ср. прим. къ § 126 въ I томѣ (стр. 495).

числа сторон; выражаясь современнымъ языкомъ, они вычисляли первые члены ряда для функции $\arcsin x$. Научно болѣе проникательнымъ мыслителемъ здѣсь является Гюйгенсъ; его сочиненіе (*De circuli magnitudine inventa*, 1654) Рудіо (*Rudio*) называетъ одной изъ наиболѣе прекрасныхъ, наиболѣе значительныхъ работъ по элементарной геометріи, которая когда-либо были написаны *). Отъ Гюйгенса ведутъ свое начало многія приближенныя построенія для спрямленія дугъ окружности, которыя послѣ этого были неоднократно вновь открыты и еще по настоящее время находятъ себѣ примѣненіевъ различныхъ отдѣлахъ прикладной математики. Мы къ этому еще вернемся въ концѣ настоящаго параграфа.

11. Второй періодъ: аналитическое выраженіе числа π (ср. гл. XXVI тома I). О формулѣ Виѣта мы уже упоминали выше. Съ развитіемъ анализа безконечныхъ въ методахъ вычисления длины окружности происходитъ большой переворотъ. При помощи безконечныхъ рядовъ, произведеній и непрерывныхъ дробей оказалось возможнымъ тѣ предѣльные процессы, которые по Архимеду приходилось производить надъ геометрическими образами, замѣнить аналитическими формулами; да и весь пріемъ Архимеда можно было выразить формулой. На другихъ основаніяхъ покоится формула Валлиса (*Wallis*, 1516—1703), которая была сообщена въ § 128 тома I. Рядъ, выражающій \arctangens , открытый Грегори (*Gregory*, 1670) и Лейбницемъ (1673), далъ возможность совершенно отдѣлить вычисленіе числа π отъ геометріи. Основываясь на теоремѣ сложенія функции \arctangens , можно при помощи пріема, указанного въ § 125 тома I, получить очень быстро сходящіеся ряды, которыми различные вычислители дѣйствительно воспользовались, чтобы опредѣлить нѣсколько сотенъ десятичныхъ знаковъ числа π (ср. т. I, § 125). Важнѣе еще, нежели эти выраженія числа π при помощи рядовъ, было открытіе, сдѣланное Леонардомъ Эйлеромъ (*Leonhard Euler*, 1707—1783), которому тригонометрія обязана современнымъ своимъ развитіемъ. Въ своемъ сочиненіи „*Introductio in analysin infinitorum*“, I, p. 104, Эйлеръ указалъ связь функций $\sin x$ и $\cos x$ съ показательнымъ рядомъ, выражаемую формулами:

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x, \quad e^{-ix} = \cos x - i \sin x,$$

(т. I, § 118), которыя, совмѣстно съ соотношеніемъ $e^{2\pi i} = 1$, содержатъ въ себѣ всю тригонометрію. На этихъ формулахъ позже было построено доказательство трансцендентности числа π .

*) F. Rudio: „Archimedes, Huygens, Lambert, Legendre. Vier Abhandlungen über die Kreismessung. Deutsch herausgegeben und mit einer Übersicht über die Geschichte des Problems von der Quadratur des Zirkels ... versehen. Leipzig, 1892“. Этой прекрасной книгой мы неоднократно пользовались, кромѣ М. Кантора и Ганкеля, при составленіи настоящаго историческаго очерка.

12. Третій період: дослідження числового характеру числа π . Ми совершенно не в состоянні представити собі громадного впечатління, которое должны были произвести поразительныя открытія анализа на всѣ мыслящіе умы. Въ теченіе столѣтій удавалось отвоєвывать тайны математики лишь путемъ тяжкаго труда, а тутъ она внезапно стала изливаться свои истины въ поразительномъ обилии. При всемъ томъ не удавалось найти квадратуру круга въ узкомъ смыслѣ этого слова. Подъ этимъ разумѣли теоретически, совершенно точное построение квадрата, равновеликаго кругу, съ помощью обычныхъ конструктивныхъ средствъ элементарной геометріи, т. е. при помощи однихъ только циркуля и линейки и при томъ конечнымъ числомъ операцій. Въ то время, какъ наиболѣе серьезныя математики стали приходить къ убѣжденію, что такая квадратура невозможна, что число π трансцендентно, дилетанты все настойчивѣе стали заниматься этимъ предметомъ. Врядъ ли какая-либо задача въ геометріи сдѣлалась столь популярной, какъ эта. Ея смыслъ безъ дальнѣйшихъ поясненій казался понятнымъ каждому дилетанту. Слишкомъ преувеличивая значеніе численнаго вычисленія π для геометріи, специалисты и неспециалисты старались найти „четыреугольникъ круга“ *). Въ 1766 году Ламбертъ (J. H. Lambert, род. въ Мюльгаузенѣ въ Эльзасѣ въ 1728 году, умеръ въ Берлинѣ въ 1777 году) весьма кстати опубликовалъ свое сочиненіе „Предварительныя свѣдѣнія для тѣхъ, которые ищутъ квадратуру и ректификацію круга **). Въ этомъ сочиненіи онъ доказалъ слѣдующее: если x есть рациональное число, отличное отъ нуля, то ни e^x , ни $\lg x$ не могутъ имѣть рациональнаго значенія. Но такъ какъ $\lg \frac{\pi}{4} = 1$, то отсюда вытекаетъ иррациональность числа π . Этимъ, конечно, еще не была доказана невозможность квадратуры круга въ узкомъ смыслѣ этого слова, ибо число π могло бы выражаться, напримѣръ, квадратнымъ корнемъ изъ цѣлага числа, каковой всегда можетъ быть построено конечнымъ числомъ операцій при помощи циркуля и линейки на основаніи теоремы Пифагора. Но этимъ былъ данъ первый толчекъ и первыя основанія къ тому, чтобы исследовать численный характеръ π ; къ тому же Ламбертъ поставилъ задачу о томъ, чтобы доказать, что число π не можетъ служить корнемъ алгебраическаго уравненія съ рациональными коэффициентами. Числа, удовлетворяющія такимъ уравненіямъ, называются алгебраическими. Къ нимъ принадлежатъ и рациональныя числа, какъ рѣшенія уравненія 1-ой степени съ рациональ-


*) Насколько многочисленны были эти попытки, можно судить по тому что Парижская Академія Наукъ уже въ 1755 году была вынуждена заявить, что она не принимаетъ къ разсмотрѣнію никакихъ рѣшеній квадратуры круга.

**) *Vorläufige Kenntnisse für die, so die Quadratur und Rectification des Circuls suchen.*

ними коэффициентами; π должно быть, таким образом, неалгебраическим т. е. трансцендентным числом. В 1840 году Лиувиллю (Liouville) удалось доказать существование трансцендентных чисел. В 1873 году Эрмиту (Hermite) удалось доказать трансцендентность числа e , основания натуральных логарифмов, послѣ того, как Лиувилль обнаружил, что ни e , ни e^2 не могут удовлетворять квадратному уравненію. Наконецъ, Ф. Линдеманиъ (F. Lindemann) въ 1889 году, опираясь на работу Эрмита, доказалъ трансцендентность числа π и тѣмъ привелъ къ концу древнюю задачу о квадратурѣ круга.

13. Изъ трансцендентности числа π вытекаетъ, что построить его циркулемъ и линейкой при помощи конечнаго числа операций теоретически совершенно точно, — невозможно, ибо всѣ отрѣзки, точно строяемые циркулемъ и линейкой, могутъ быть выражены при помощи извлеченія квадратныхъ корней изъ отрѣзковъ, уже найденныхъ (по существу это выполняется на основаніи теоремы Пифагора). Отрѣзокъ, строяемый въ этомъ смыслѣ, можетъ быть поэтому выраженъ при помощи ряда квадратныхъ корней, соединяемыхъ другъ съ другомъ или извлекаемыхъ одинъ изъ другого, а потому всегда удовлетворяетъ алгебраическому уравненію.

Если, такимъ образомъ, точное построение числа π въ указанномъ смыслѣ невозможно, то во многихъ случаяхъ практической геометріи дѣло сводится къ тому, чтобы дать достаточно точные приближен-




Фиг. 117.

ные приемы для выпрямленія окружности и ея частей. Во многихъ случаяхъ значеніе $\pi = 22/7$ даетъ удовлетворительные результаты. На томъ способѣ выпрямленія окружности, который основывается на этомъ значеніи, намъ, конечно, не приходится останавливаться. Однако, этотъ приемъ можно считать простымъ только въ томъ смыслѣ, что онъ легко обосновывается.

Много легче и короче другой приемъ, который Гюйгенсъ приводитъ въ указанномъ выше своемъ сочиненіи въ видѣ предложенія XIII-го, хотя доказать его гораздо труднѣе. Приемъ этотъ заключается въ слѣдующемъ: чтобы выпрямить дугу AB' (фиг. 117), нужно на радіусѣ OA отложить отрѣзокъ OC , равный діаметру, такимъ образомъ, чтобы точка O была расположена между A и C ; затѣмъ отыскать точку пересѣченія B прямой CB' съ касательной въ точкѣ A ; если B есть точка пересѣченія, то приближенно $AB = \text{arc } AB'$. Доказательство мы проведемъ аналитически.

почтенъ приему Архимеда. Этотъ приемъ заслуживалъ бы даже того, чтобы положить его въ основу элементарнаго вычисления длины окружности, и, если мы этого не дѣлаемъ, то только потому, что приемъ Архимеда болѣе приспособленъ къ самому понятію о длинѣ дуги, ибо всегда будетъ казаться наиболѣе естественнымъ опредѣлять длину дуги, какъ предѣлъ вписанной въ нее правильной ломаной линіи при неограниченномъ увеличеніи числа ея сторонъ.

Положимъ, что нужно выпрямить дугу OA окружности C радіуса r , т. е. нужно превратить ее въ прямолинейный отрезокъ той же длины (фиг. 118). Диаметръ OC встрѣчаетъ окружность въ точкѣ C_1 , такъ что $\sphericalangle AC_1O = \sphericalangle ACO/2 = \varphi/2$, гдѣ φ есть абсолютная мѣра угла ACO . Тогда $\text{arc } AO = r\varphi$; если мы опишемъ окружность изъ точки C , какъ изъ центра, радіусомъ C_1O , то диаметръ C_1A встрѣтитъ последнюю въ



Фиг. 118.

точкѣ A_1 такимъ образомъ, что $OA_1 = 2r \cdot \varphi/2 = r\varphi$; такимъ образомъ, $\text{arc } OA = \text{arc } OA_1$. Этотъ приемъ можно повторить неограниченное число разъ: беремъ $C_1C_2 = C_1O$; изъ точки C_2 , какъ изъ центра, радіусомъ C_2O описываемъ окружность и находимъ точку пересѣченія последней A_2 съ радіусомъ C_2A_1 . Тогда $\text{arc } OA_2 = \text{arc } OA_1 = \text{arc } OA \dots$. Окружности постоянно возрастаютъ; $OC_3 = 2OC_2$; $OC_4 = 2OC_3 \dots$; $\text{arc } OA = \text{arc } OA_1 = \text{arc } OA_2 = \text{arc } OA_3 = \text{arc } OA_4 = \dots$; дуги же остаются равными и становятся постоянно болѣе плоскими и неограниченно приближаются къ отрезку OA_n ; чѣмъ больше n , тѣмъ болѣе отрезокъ OA_n приближается къ дугѣ OA . Однако, въ этомъ видѣ построение практически невыполнимо, такъ какъ точки C входятъ за предѣлы того пространства, которымъ мы располагаемъ на чертежѣ. Это неудобство можно устранить слѣдующимъ простымъ соображеніемъ: $A_1A_2 \perp OA_1$, $A_2A_3 \perp OA_2$, $A_3A_4 \perp OA_3 \dots$; кромѣ того лучъ OA_1 дѣлитъ пополамъ $\sphericalangle AOT^*$, лучъ OA_2 дѣлитъ пополамъ,

*) T есть произвольная точка на касательной въ точкѣ O , взятая съ той стороны прямой OC , съ которой расположенъ радіусъ AC .

≠ A_2OT и т. д. Отсюда вытекает построение, которое непосредственно видно на чертежѣ 119; оно у нас прервано на отрезкѣ OA_3 .

Если мы проведемъ еще $AB \perp CO$, то


$$AB = r \sin \varphi, \quad OA = BA : \cos \varphi / 2, \\ OA_1 = OA : \cos \varphi / 4, \quad OA_2 = OA_1 : \cos \varphi / 8, \dots$$

Поэтому

$$OA_n = \frac{r \sin \varphi}{\cos \varphi / 2 \cdot \cos \varphi / 4 \cdot \cos \varphi / 8 \dots \cos \varphi / 2^{n+1}},$$

если φ меньше двухъ прямыхъ, т. е. если $\varphi < \pi$. Что эта формула съ возрастаниемъ r дѣйствительно воспроизводитъ все точки дуги $OA = \varphi$, вытекаетъ изъ известной Эйлеровой формулы

$$\varphi = \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi / 2 \cdot \cos \varphi / 4 \cdot \cos \varphi / 8 \dots \text{ad inf.}}$$



Фиг. 119.

(Opuscula anal. I, pag. 346). При $\varphi = \pi/2$ мы получаемъ отсюда выражение для $\pi/2$, данное Виета и указанное нами выше. Его можно очень наглядно получить по отрезку OA_n .

Наконецъ, укажемъ еще, что въ прямоугольномъ треугольникѣ $OA_n C_{n+1}$ (фиг. 118) гипотенуза $OC_{n+1} = 2^{n+1}r$, катеть $A_n C_{n+1} = \sqrt{(2^{n+1}r)^2 - s_n^2}$, гдѣ $s_n = OA_n$, такъ что

$$A_n A_{n+1} = C_{n+1} A_{n+1} - C_{n+1} A_n = C_{n+1} O - C_{n+1} A_n \\ = 2^{n+1}r - \sqrt{(2^{n+1}r)^2 - s_n^2};$$

а потому въ прямоугольномъ треугольникѣ $OA_n A_{n+1}$

$$s_{n+1}^2 = OA_{n+1}^2 = s_n^2 + A_n A_{n+1}^2 = s_n^2 + (2^{n+1}r - \sqrt{(2^{n+1}r)^2 - s_n^2})^2.$$

Такимъ образомъ, съ помощью одной только теоремы Пифагора и теореме о вписанномъ углѣ мы имѣемъ возможность вычислять отрезки $OA_n = s_n$ по отрезку $OA = s$:


$$s_{n+1}^2 = s_n^2 + (2^{n+1}r - \sqrt{(2^{n+1}r)^2 - s_n^2})^2;$$

эти отрезки съ возрастаниемъ n приближаются къ дугѣ OA . Въ этомъ пространномъ вычисленіи длины дуги можно было бы легко указать верхнюю границу въ видѣ отрезковъ OZ_n , которые ограничиваютъ прямая $C_{n+1} A_n$ на касательной OT . При помощи бинома Ньютона можно также на основаніи послѣдней формулы сдѣлать оцѣнку разности $s_{n+1} - s_n$, которая имѣетъ рѣшающее значеніе въ вопросѣ о сходимости указанного процесса.

§ 24. Предложенія и задачи, относящіяся къ окружности.

1. Въ видѣ примѣненія основныхъ предложеній, а также для установленія связи съ тѣми элементарными соображеніями, которыя были вплетены въ изложенія выше основы геометріи, мы рассмотримъ здѣсь нѣкоторыя задачи, относящіяся къ геометріи круга.

Равнодѣлящія угловъ α, β, γ треугольника ABC и смежныхъ съ ними угловъ пересѣкаются по три въ четырехъ точкахъ I, I_a, I_b, I_c — въ центрахъ четырехъ окружностей, которыя касаются всѣхъ сторонъ треугольника или ихъ продолженій. Пусть I будетъ центръ „внутренней“



Фиг. 120.

вписанной окружности, I_a центръ „внѣписанной“ окружности, касающейся стороны a и продолженія двухъ другихъ сторонъ (фиг. 120). Соответственно этому мы обозначимъ:

точку пересѣченія окружности	I	I_a	I_b	I_c ,
съ прямою a черезъ	X	X_a	X_b	X_c ,
b „	Y	Y_a	Y_b	Y_c ,
c „	Z	Z_a	Z_b	Z_c .

Постараемся опредѣлить отрезки, на которые эти точки дѣлятъ стороны, по даннымъ сторонамъ треугольника. Вслѣдствіе конгруэнтности тре-

угольниковъ AYI и AZI имѣемъ: $AY = AZ$; точно такъ же $BZ = BX$, $CX = CY$.

Если мы два равныхъ отрезка, выходящихъ изъ вершины A , обозначимъ черезъ s_a , отрезки, выходящіе изъ вершины B , черезъ s_b и отрезки, выходящіе изъ вершины C , черезъ s_c , то

$$a = s_b + s_c, \quad b = s_c + s_a, \quad c = s_a + s_b; \quad (1)$$

поэтому

$$s_a = s - a, \quad s_b = s - b, \quad s_c = s - c, \quad \text{гдѣ} \quad a + b + c = 2s. \quad (2)$$

Далѣе имѣемъ:

$$a = CX_c - BX_c, \quad b = CY_c - AY_c, \quad c = AZ_c + BZ_c.$$

И, такъ какъ $CY_c = CX_c$, $AZ_c = AY_c$, $BX_c = BZ_c$, то

$$a = CX_c - BZ_c, \quad b = CX_c - AZ_c, \quad c = AZ_c + BZ_c.$$

Поэтому

$$CX_c = CY_c = s, \quad AY_c = AZ_c = s - b, \quad BZ_c = BX_c = s - a, \quad (3)$$

откуда, между прочимъ, слѣдуетъ, что $AZ = BZ_c$; это значитъ:

Предложеніе 1. Двѣ точки касанія, расположенныя внутри одной и той же стороны треугольника, расположены симметрично относительно концовъ этой стороны.

Такъ какъ $BX_c = BZ_c = s_a$, $CX_b = CY_b = AY = s_a$, то мы имѣемъ аналогично:

Предложеніе 2. Двѣ точки пересѣченія, расположенныя на продолженіи одной и той же стороны, лежатъ симметрично относительно концовъ этой стороны.

При изслѣдованіяхъ метрическаго характера целесообразно присвоить касательной изъ точки P къ окружности κ длину, принимая за такую длину отрезка PQ , гдѣ Q есть точка касанія. Тогда первая изъ формулъ (3) даетъ:

Предложеніе 3. Касательныя изъ вершины треугольника къ вписанной окружности, касающейся противоположной стороны, равны каждая полупериметру s .

Если присмотримся внимательно къ формуламъ (1) и (2), то мы легко выразимъ при помощи этихъ предложеній отрезки на фиг. 122 черезъ стороны a , b , c .

Теперь легко также рѣшить задачи, поставленныя въ предыдущихъ параграфахъ, построить треугольникъ по даннымъ c , $a + b - c = 2s_c$ и по радиусу r описаннаго круга, а также по даннымъ c , s и r ; такъ какъ $s_c = s - c$, то эти двѣ задачи эквивалентны. Если даны r и c , то, по теоремѣ о вписан-

номъ углѣ, уголь γ опредѣляется, какъ уголь, вписанный въ окружность радиуса r и опирающийся на хорду c . На сторонахъ угла γ отложимъ отъ вершины, которую обозначимъ черезъ C , отрѣзки $CY_c = CX_c = s$ (фиг. 120) и построимъ окружность I_c , касающуюся сторонъ въ точкахъ X_c и Y_c ; если теперь на сторонахъ CX_c и CY_c отложимъ отрѣзки CL и CU , равные каждый $s - c$, то перпендикуляры, возставленные изъ точекъ X , Y къ сторонамъ угла, пересѣкутся въ центрѣ I вписаннаго круга. Прямоую AB мы найдемъ, какъ общую касательную къ окружностямъ I и I_c . Чтобы рѣшеніе было возможно, необходимо, чтобы ни одна изъ окружностей не пересѣкала другой и не заключала ее внутри себя, т. е. необходимо, чтобы величина $2s_c$ не превышала опредѣленной границы δ .

2. Изъ подобія треугольниковъ CYI и CY_cI_c на фиг. 120, если мы обозначимъ радиусы окружностей I , I_a , I_b , I_c черезъ q , q_a , q_b , q_c , вытекаетъ:

$$q : s_c = q_c : s;$$

Съ другой стороны, треугольники AZI и I_cZ_cA также подобны, такъ какъ эти треугольники прямоугольные, а прямая I_cA и AI взаимно перпендикулярны; поэтому

$$q : s_a = s_b : q_c.$$

Перемножая эти двѣ формулы, получаемъ: $q^2 : s_a s_c = s_b : s$, или $q^2 = s_a s_b s_c : s$; дѣля же эти пропорціи почленно получимъ: $s_a : s_c = q_c^2 : s s_b$, или $q_c^2 = s s_a s_b : s_c$.

Предложеніе 4. Между радиусами четырехъ описанныхъ окружностей и отрѣзками s , s_a , s_b , s_c , составленными изъ сторонъ a , b , c , имѣютъ мѣсто соотношенія:

$$q = \sqrt{s_a s_b s_c / s}, \quad q_a = \sqrt{s s_b s_c / s_a}, \quad q_b = \sqrt{s s_c s_a / s_b}, \quad q_c = \sqrt{s s_a s_b / s_c}. \quad (4)$$

Такъ какъ треугольникъ ABC состоитъ изъ треугольниковъ AIB , BIC , CIA , то его площадь J равна $cq/2 + aq/2 + bq/2 = sq$. А такъ какъ $ABC = AI_cC + BI_cC - AI_cB$, то $J = bq_c/2 + aq_c/2 - cq_c/2 = s_c q_c$.

Предложеніе 5. По даннымъ предыдущаго предложенія J вычисляется по формуламъ:

$$J = sq = s_a q_a = s_b q_b = s_c q_c. \quad (5)$$

Въ частности изъ предложеній (4) и (5) получается известная формула для площади треугольника

$$J = \sqrt{s s_a s_b s_c}. \quad (6)$$

найденная Герономъ Александрійскимъ.

По опредѣленію мѣры площади


$$J = ab_a/2 = bb_b/2 = cb_c/2, \quad (7)$$

гдѣ h_a, h_b, h_c суть высоты треугольника. При помощи соотношеній (6) ихъ можно вычислить по даннымъ s, s_a, s_b, s_c .


Съ радиусомъ описаннаго круга O стороны треугольника также связаны зависимостью, которую легко указать (фиг. 121). Если D есть вторая конечная точка диаметра OC , то $\angle DAC$ есть прямой уголъ и $\sphericalangle ADC = \sphericalangle ABC$, какъ вписанные углы, опирающіеся на одну и ту же дугу AC . Поэтому треугольники CAD и CH_cB (H_c есть основаніе высоты h_c) подобны; слѣдовательно,

$$2r : b = a : h_a, \quad 2r = ab : h_a = abc : ch_c = abc : 2J, \quad \text{или} \\ 4r = abc/J. \quad (8)$$

3. Полезнымъ преобразованіемъ теоремъ о подобіи являются предложенія о хордахъ и сѣкущихъ. Если двѣ хорды AB' и BA' одной и той же окружности пересѣкаются въ точкѣ V (фиг. 122), то отрѣзки



Фиг. 121.



Фиг. 122

VA и VB' называются отрѣзками хорды AB' ; точно такъ же UA, UA' суть отрѣзки, которые точка U опредѣляетъ на хордѣ AA' , также и въ томъ случаѣ, когда точка U лежитъ внѣ окружности. Вместе съ тѣмъ имѣемъ слѣдующее предложеніе:

Предложеніе 6. Если изъ точки P проходятъ двѣ хорды или сѣкущія къ одной и той же окружности, то произведеніе отрѣзковъ, которые точка P опредѣляетъ на одной изъ этихъ двухъ прямыхъ, равно произведенію отрѣзковъ, которые та же точка опредѣляетъ на другой прямой. Обратное: если равны эти произведенія, то четыре крайнія точки этихъ четырехъ отрѣзковъ, кромѣ точки P , лежатъ на одной окружности.

Доказательство. Если точка U лежитъ внѣ окружности на сѣкущихъ AA' и BB' , то изъ подобія треугольниковъ $AB'U$ и $B'A'U$ (фиг. 122) слѣдуетъ: $UA : UB' = UB : UA'$, или $UA \cdot UA' = UB \cdot UB'$.

Доказательство остается правильным и в том случае, если точки A и A' сливаются в одну точку T , так что касающаяся UA обращается в касательную: $UT^2 = UA \cdot UA'$. Если данная точка I' лежит внутри окружности (фиг. 122), то из подобия треугольников $AI'A'$ и BIV' таким же образом следует: $IA \cdot IB' = IV \cdot IA'$. — Обратное предложение доказывается от противного. На этом предложении основывается все содержание § 9, планиметрическую часть которого было бы уместно поместить здесь; это учение о степени точки относительно окружности, об инверсии и о пучках окружностей.

4. Изъ предложений, относящихся къ инверсии, мы вновь напомним ту теорему, что каждой окружности и всегда отвечает окружность же λ' , которая иногда вырождается в прямую. Касательные, выходящая из центра инверсии O къ окружности λ , должны касаться также окружности λ' . Центр инверсии является, такимъ образомъ, также центромъ подобія двухъ взаимнообратныхъ окружностей.


Обратно: если даны двѣ окружности λ и λ' и мы проведемъ изъ одного изъ центровъ подобія O касательныя a и b къ окружности, которыя касаются окружности λ въ точкахъ A и B и окружности λ' въ точкахъ A' и B' , то $OA \cdot OA' = OB \cdot OB'$ есть степень инверсии, которая имѣетъ центръ въ точкѣ O и превращаетъ окружность λ въ окружность λ' . Итакъ:

Предложение 8. Двѣ окружности λ и λ' опредѣляютъ всегда двѣ инверсии, преобразовывающія эти двѣ окружности другъ въ друга. Центрами инверсии служатъ внутренній и внѣшній центры подобія. Взаимнообратными всегда являются двѣ точки, принадлежащія одному „лучу подобія“ (такъ называется всякая прямая, проходящая черезъ центръ подобія), но не расположенныя на параллельныхъ радиусахъ.

5. Предложение 8. Если двѣ окружности касаются третьей, то точки касанія представляютъ собой двѣ взаимнообратныя точки (въ одной изъ инверсій, опредѣляемыхъ, согласно предыдущему предложению, первыми двумя окружностями).

Пусть λ и λ' будутъ данныя двѣ окружности (фиг. 123 и 124), а λ (или σ) пусть будетъ окружность, касающаяся обѣихъ данныхъ окружностей. Пусть $M, N, L, (S)$ будутъ центры окружностей λ и λ' , λ (и σ). Наконецъ, пусть A и A' будутъ точки, въ которыхъ окружность λ касается окружностей λ и λ' . (Точно такъ же пусть B и B_1 будутъ точки, въ которыхъ окружность σ касается окружностей λ и λ'). Точки касанія всегда лежатъ на центральной прямой; слѣдовательно, точка A на прямой ML , точка A' на прямой NL (точка B на прямой MS ,

точка B_1 на прямой NS). Так как $AL A'$ ($BS B_1$) есть равнобедренный треугольник, то $\sphericalangle LAA' = \sphericalangle LA'A$. Эти углы мы обозначим через α . Положим, что прямая AA' встречает окружность κ в точке \mathfrak{M} . В таком случае имеет место также равенство $M\mathfrak{M} = MA$, и, следовательно, $\sphericalangle M\mathfrak{M}A = \sphericalangle MA\mathfrak{M} = \alpha$; поэтому $M\mathfrak{M} \parallel NA'$, т. е. точки \mathfrak{M} , A' отвечают друг другу в подобном соответствии, которое относит друг другу точки M и N ; прямая AA' проходит, следовательно, через один из центров подобия окружностей κ и κ' ;



Фиг. 123.

а так как \mathfrak{M} и A' суть соответствующие точки и A есть вторая точка, в которой прямая $\mathfrak{M}A'$ встречает окружность κ , то точки A и A' взаимно обратны (точно так же точки B и B_1). На фиг. 123 изображено подобие с внешним центром, на фиг. 124 — с внутренним центром.

Отсюда следует, что общая точка двух соприкасающихся окружностей κ и κ' обратна самой себе в каждой из двух инверсий, превращающих эти окружности друг в друга.

6. Как мы видели при доказательстве предложения 8, прямая, соединяющая две точки, в которых две окружности κ_1 и κ_2 касаются третьей окружности λ , всегда проходит через внутренний или внешний центр подобия κ_1 и κ_2 ; согласно же предложению 7, точки касания взаимно обратны в инверсии, имеющей центром O упомянутый центр подобия, но все окружности, относительно которых точка O имеет характерную для этой инверсии степень, принадлежат связке, определяющей собой и самую инверсию. Эту связку мы будем называть „связкой центра подобия O “, или, короче, „связкой подобия O “. Мы можем теперь сказать:

Предложение 9. Окружности, касающиеся двух окружностей κ_1 , κ_2 , принадлежат одной из двух связок подобия окружностей κ_1 , κ_2 .


Предложение 10. Каждая окружность λ , принадлежащая одной из связок подобия двух окружностей κ_1 , κ_2 и пересекающая одну из них, пересекает также вторую и при том под тем же углом.

В самом деле, так как окружность λ (в связке) обратна самой себе, окружности же κ_1 и κ_2 переходят одна в другую, то и углы (κ_1, λ) и (κ_2, λ) взаимно обратны, а потому и равны.

Предложение 10 допускает обращение и содержит в себе предложение 9, как частный случай.

Предложение 11. Каждая окружность λ , пересекающая окружности κ_1 и κ_2 под равными углами, принадлежит одной из связок подобия κ_1 и κ_2 .

Эту теорему можно доказать прямо при помощи фигуры, частными случаями которой при $\varphi = 0$ являются фигуры 123 и 124. Можно вести



Фиг. 121.

доказательство также и следующим образом. Каждая инверсия J , центр которой C лежит на окружности λ , обращает λ в прямую λ' , которая пересекает обратные окружности κ_1' и κ_2 под теми же углами, что и окружности κ_1 и κ_2 ; прямая λ' проходит поэтому через один из центров подобия S' окружностей κ_1' и κ_2' . Связка инверсии, превращающей окружности κ_1' и κ_2' друг в друга, а прямую λ' в самое себя, преобразовывается инверсией J в связку такой инверсии, которая превращает окружности κ_1 и κ_2 друг в друга, а окружность λ в себя самое; это есть одна из инверсий, которая отвечает связкам подобия окружностей κ_1 и κ_2 , а потому окружность λ принадлежит одной из этих связок.

7. Изъ сказаннаго слѣдуетъ:

Предложеніе 12. Всѣ окружности, которыя пересѣкають три окружности $\kappa_1, \kappa_2, \kappa_3$, не принадлежащія одному пучку, подѣ одинаковыми углами, образуютъ въ совокупности четыре пучка.

Всѣ окружности, пересѣкающія подѣ одинаковыми углами какъ окружности κ_1 и κ_2 , такъ и окружности κ_2 и κ_3 , пересѣкають также окружности κ_3 и κ_1 подѣ равными углами. Отсюда слѣдуетъ, что всякая окружность, которая принадлежитъ какой-либо связкѣ подобія S_{12} окружностей κ_1 и κ_2 , а также какой-либо связкѣ подобія S_{23} окружностей κ_2 и κ_3 и въ то же время пересѣкаетъ одну изъ этихъ окружностей, необходимо принадлежитъ также одной изъ связзокъ подобія S_{31} окружностей κ_3 и κ_1 . Но общія окружности двухъ связзокъ S_{12} и S_{23} образуютъ пучекъ, который долженъ принадлежать также связкѣ S_{31} . Такъ какъ центры S_1, S_2, S_3 связзокъ S_{23}, S_{31}, S_{12} имѣють одну и ту же степень относительно всѣхъ окружностей пучка, то эти три точки лежатъ на радикальной оси пучка. Итакъ, шесть центровъ подобія трехъ окружностей расположены по три на одной прямой — на „оси подобія“. Теперь ясно, что каждая окружность, принадлежащая связкамъ S_{12} и S_{23} , необходимо принадлежитъ также связкѣ S_{31} , даже и въ томъ случаѣ, если она не пересѣкаетъ ни одну изъ трехъ окружностей $\kappa_1, \kappa_2, \kappa_3$; въ самомъ дѣлѣ, она принадлежитъ нашему пучку, всѣ окружности котораго принадлежатъ также связкѣ S_{31} . Но, такъ какъ имѣются двѣ связки S_{12} и двѣ связки S_{23} , то имѣются четыре пучка, окружности которыхъ пересѣкають подѣ равными углами три окружности $\kappa_1, \kappa_2, \kappa_3$. — Четыремъ пучкамъ отвѣчаютъ четыре оси подобія — радикальныя оси этихъ пучковъ. Если K_1, K_2, K_3 суть центры окружностей $\kappa_1, \kappa_2, \kappa_3$, то можно проще всего найти центры подобія, проведя параллельные радіусы $K_1A_1 \parallel K_2A_2 \parallel K_3A_3$ и разыскавъ точки пересѣченія съ центральною осью прямыхъ, соединяющихъ соответственныя пары точекъ. Если отрѣзки K_1A_1 и K_2A_2 имѣють противоположное направленіе, если противоположное направленіе имѣють также отрѣзки K_2A_2 и K_3A_3 , то отрѣзки K_1A_1 и K_3A_3 имѣють одинаковое направленіе, т. е. двумъ внутреннимъ центрамъ подобія въ качествѣ третьяго всегда отвѣчаетъ внѣшній центръ подобія, лежащій на одной съ ними прямой; это не что иное, какъ предложеніе Дезарга въ примѣненіи къ треугольникамъ $K_1K_2K_3$ и $A_1A_2A_3$ *). Если, такимъ обра-

*) Сонаправленность отрѣзковъ на одной и той же прямой можетъ быть опредѣлена, какъ указано въ § 15; сонаправленность же параллельныхъ прямыхъ опредѣляется ортогональной проекціей одной прямой на другую.

кальная ось $p_{\alpha k}$ окружностей α и k встрѣчает радикальную ось h пучка въ некоторой точкѣ S , имѣющей одинаковую степень какъ относительно всѣхъ окружностей пучка, такъ и относительно окружностей α и k ; слѣдовательно, эта точка имѣетъ ту же степень относительно окружностей β и k , γ и k , и т. д. Поэтому радикальныя оси $p_{\beta k}$, $p_{\gamma k}$, \dots , $p_{\epsilon k}$ всѣ проходятъ черезъ точку S . Съ другой стороны, радикальная ось $p_{\epsilon k}$ есть общая касательная окружностей ϵ и k въ точкѣ ихъ соприкосновенія. Она проходитъ черезъ точку S , и такъ какъ эту послѣднюю точку легко построить, то задача по существу разрѣшена. На практикѣ же наиболѣе простое рѣшеніе заключается въ слѣдующемъ (фиг. 125). Находимъ радикальную ось p пучка, выбираемъ произвольно некоторую окружность пучка γ , пересѣкающую окружность k ; проводимъ общую хорду послѣднихъ двухъ окружностей γ и k , которая будетъ въ то же время ихъ общей радикальной осью $p_{\gamma k}$. Точка пересѣченія прямыхъ $p_{\gamma k}$ и p и есть точка S ; мы проводимъ изъ нея касательную къ одной изъ окружностей пучка *) (или къ окружности k), для чего, въ случаѣ гиперболическаго пучка, можетъ также служить просто отрѣзокъ, идущій изъ точки S къ предѣльной точкѣ пучка. Наконецъ, изъ точки S , какъ изъ центра, радиусомъ, равнымъ ея разстоянію отъ точки касанія, проводимъ окружность, которая пересѣкаетъ окружность k въ искомымъ точкахъ соприкосновенія V' и V'' . Если K есть центръ окружности k , то прямая KV' и KV'' пересѣкаютъ центральную ось пучка въ точкахъ E' , E'' , которыя служатъ центрами двухъ искомымъ окружностей e' , e'' **). — Чтобы существовала точка S , радикальная ось $p_{\gamma k}$ не должна совпадать съ p ; окружность k не должна принадлежать пучку.

9. Послѣ этихъ предварительныхъ соображеній рѣшеніе Аполлоновой задачи уже не представляетъ затрудненія ***). Пусть K_1 , K_2 , K_3 будутъ центры трехъ данныхъ окружностей k_1 , k_2 , k_3 (фиг. 126). При помощи трехъ параллельныхъ радиусовъ K_1I_1 , K_2I_2 , K_3I_3 мы построимъ четыре оси подобія. Пусть p будетъ одна изъ нихъ, S_{12} , S_{23} , S_{31} пусть будутъ лежащія на ней центры подобія. Намъ нужно найти соответствующій пучокъ. Положимъ, что произвольный лучъ, проходящій черезъ точку S_{12} , встрѣчаетъ окружности k_1 , k_2 въ точкахъ C_1 , C_2 ; лучъ же $S_{23}C_2$ встрѣчаетъ окружность k_3 въ точкѣ C_3 ; въ такомъ случаѣ точки C_1 и C_2 суть взаимнообратныя точки въ связкѣ подобія (S_{12}), соответствующей центру S_{12} ; точно такъ же C_2 , C_3 суть взаимнообратныя точки


*) При этой модификаціи рѣшеніе пригодно даже въ томъ частномъ случаѣ, когда k есть прямая

**) Фиг. 125 соответствуетъ гиперболическому пучку, когда построеніе сложнѣе; въ случаѣ эллиптическаго пучка мы непосредственно имѣемъ радикальную ось h .

***) По Масфеллеру (Massfeller, Archiv d. Math. u. Phys. (3) 3, 189).

въ связкѣ (S_{22}). Слѣдовательно, окружность γ , проходящая черезъ точки C_1, C_2, C_3 , принадлежитъ связкамъ S_{12} и S_{23} , а, слѣдовательно, и пучку, соответствующему радикальной оси p ; p есть радикальная ось этого пучка, и намъ нужно отыскать окружности ϵ' и ϵ'' пучка, касающіяся, скажемъ, окружности k_1 , а вмѣстѣ съ тѣмъ и окружностей k_2, k_3 . Съ этою цѣлью слѣдуетъ отождествить, скажемъ, окружность k_1 съ окружностью k на фиг. 125, радикальную ось p съ прямой, имѣющей то же наименованіе на этой фигурѣ и, наконецъ, окружность γ съ окружностью γ на той же фигурѣ; тогда мы легко найдемъ касательныя окружности ϵ', ϵ'' .

Четыремъ осямъ подобія отвѣчаютъ четыре пары касательныхъ окружностей. Предѣльные случаи, когда одна или нѣсколько изъ данныхъ окружностей переходятъ въ точки или въ прямая, приводятъ къ много-



Фиг. 126.


численнымъ частнымъ случаямъ, въ которыхъ, однако, приведенное построеніе по существу остается въ силѣ. Если данныя окружности принадлежатъ одному пучку, то это построеніе, какъ было указано выше въ концѣ п. 8, становится непригоднымъ. Но въ такомъ случаѣ касательнаго круга ϵ и не существуетъ вовсе, ибо одна и та же окружность ϵ можетъ касаться не болѣе двухъ окружностей пучка.

10. Рѣшеніе Аполлоніевой задачи поразительно освѣщается, если мы построимъ соответствующую окружностямъ k_1, k_2, k_3 ортогональную или диаметральную окружность O и къ полученной связкѣ O примѣнимъ данную въ § 10 интерпретацію двухъ взаимнообратныхъ точекъ, какъ псевдоточекъ, и окружностей пучка, какъ псевдопрямыхъ. Окружности

k_1, k_2, k_3 становятся въ такомъ случаѣ псевдопрямыми гиперболической или эллиптической геометріи, смотря по тому, имѣть ли связка O ортогональную или диаметральную окружность. Но въ этой псевдогеометріи каждая псевдоокружность состоитъ изъ двухъ дѣйствительныхъ окружностей, взаимнообратныхъ въ связкѣ O . Аполлоніева задача теперь гласитъ: построить четыре псевдоокружности, касающіяся трехъ псевдопрямыхъ k_1, k_2, k_3 . Это—задача, разсмотрѣнная въ п. 1 о построении окружности, вписанной въ треугольникъ, и трехъ вѣнѣсанныхъ окружностей. Мы должны только имѣть въ виду что въ случаѣ гиперболической связки стороны k_1, k_2, k_3 могутъ и не пересѣкаться въ дѣйствительныхъ точкахъ. Въ такомъ случаѣ вершинами треугольника служатъ идеальныя точки, но построение, данное въ п. 1, остается примѣнимымъ и въ этомъ случаѣ, если мы говоримъ не о равнодѣлящихъ угловъ, а объ осяхъ симметріи трехъ паръ сторонъ треугольника. Предложеніе 8 настоящаго параграфа, согласно которому двумъ окружностямъ всегда отвѣчаютъ двѣ инверсіи, превращающія эти окружности другъ въ друга, обращается въ нашей псевдогеометріи въ предложеніе, что двѣ псевдопрямыя всегда могутъ быть преобразованы одна въ другую при помощи двухъ псевдосимметрій совершенно такъ же, какъ это имѣетъ мѣсто въ Евклидовой геометріи. Если мы ограничимся наиболее нагляднымъ случаемъ, когда три связки подобія S_{12}, S_{23}, S_{31} имѣютъ каждая дѣйствительную ортогональную окружность $\omega_{12}, \omega_{23}, \omega_{31}$, то въ нашей псевдогеометріи $\omega_{12}, \omega_{23}, \omega_{31}$ являются псевдоосями симметріи или равнодѣлящими угловъ, образуемыхъ прямыми k_1, k_2, k_3 . Онѣ пересѣкаются въ псевдоцентръ псевдоокружности ϵ , касающейся псевдопрямыхъ k_1, k_2, k_3 и состоящей изъ двухъ дѣйствительныхъ окружностей ϵ' и ϵ'' . Относительно „отрѣзковъ“, которые псевдоточки касанія опредѣляютъ на „сторонахъ“ псевдотреугольника k_1, k_2, k_3 , остаются въ силѣ тѣ же предложенія, которыя были приведены въ п. 1. Переводя ихъ обратно на языкъ обыкновенной геометріи, мы получимъ рядъ прекрасныхъ тригонометрическихъ формулъ, выводъ которыхъ завелъ бы насъ, однако, слишкомъ далеко. Всѣ приемы построения, указаннаго въ п. 9, получаютъ очень простую интерпретацію. Здѣсь вновь сказывается большое значеніе геометріи, построенной на понятіяхъ въ смыслѣ экономіи мышленія. Кто умѣетъ построить четыре касательныхъ круга въ треугольникъ и владѣетъ тѣми немногими предложеніями, которыя необходимы, чтобы интерпретировать геометрію связки окружностей, какъ неевклидову геометрію, тотъ можетъ разрѣшить Аполлоніеву задачу, не затрачивая новой работы мысли, и при томъ самымъ простымъ образомъ. Даже гораздо болѣе общая задача о построении окружности, пересѣкающей три данныя окружности k_1, k_2, k_3 подъ данными углами $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, претворяется въ простую задачу, относящуюся къ треугольнику, и получаетъ простое рѣшеніе.


§ 25. Элементарная теория конических сечений.

1. Аполлониева задача о касательной окружности является одной из плодотворнейших задач элементарной геометрии. Сь одной стороны, ее рѣшеніе опирается на теорію радикальных осей и центров подобія окружностей, пучковъ и связокъ окружностей; сь другой стороны, она находится въ связи сь двумя неевклидовыми геометріями, такъ какъ оказывается возможнымъ привести ее къ болѣе простой задачѣ о построении



Фиг. 127.

вписанной и вѣписанной окружностей въ треугольникъ. Мы хотимъ еще показать, что эта задача вводитъ насъ также въ ученіе о коническихъ сѣченіяхъ. Въ самомъ дѣлѣ, сама собой напрашивается мысль придти къ рѣшенію Аполлоніевой задачи такимъ образомъ, чтобы найти предварительно геометрическое мѣсто центровъ окружностей x , которыя касаются двухъ данныхъ окружностей ψ_1 и ψ_2 . Это геометрическое мѣсто можно опредѣлить нѣсколько проще; если F_1 , F_2 суть центры, r_1 и r_2 —радіусы данныхъ окружностей, P —центр, r —радіусъ окружности x , то точка P будетъ также служить центромъ окружности x' , проходящей черезъ точку




Фиг. 128.


F_1 и касающейся нѣкоторой окружности ψ_2 , концентричной сь окружностью ψ_2 и имѣющей радіусомъ $r_1 + r_2$ или $r_1 - r_2$, смотря по роду касанія (фиг. 127 и 128). Если окружность ψ_2 вырождается въ прямую, то окружность ψ_2 обращается въ параллельную ей прямую, отстоящую отъ нея на разстояніи r_1 и расположенную по ту или иную сторону ея, смотря по роду касанія (фиг. 129 и 130). Дѣло сводится, такимъ образомъ къ тому, чтобы изслѣдовать геометрическое мѣсто центровъ всѣхъ окружностей x' , проходящихъ черезъ неподвиж-

ую отъ нея на разстояніи r_1 и расположенную по ту или иную сторону ея, смотря по роду касанія (фиг. 129 и 130). Дѣло сводится, такимъ образомъ къ тому, чтобы изслѣдовать геометрическое мѣсто центровъ всѣхъ окружностей x' , проходящихъ черезъ неподвиж-

ную точку F_1 и касающихся неподвижной окружности φ_2 , которая может иногда вырождаться и въ прямую. Это геометрическое мѣсто мы опредѣлимъ, какъ коническое сѣченіе; именно, мы будемъ его называть эллипсомъ или гиперболой, смотря по тому, расположена ли точка F_1 внутри или внѣ окружности φ_2 , и параболой, если φ_2 есть прямая. Если точка F_1 лежитъ на окружности φ_2 , то коническое




Фиг. 129.




Фиг. 130.

сѣченіе вырождается въ прямую, ортогональную къ φ_2 въ точкѣ F_1 . Намъ нужно будетъ потомъ доказать, что опредѣленные такимъ образомъ коническія сѣченія дѣйствительно представляютъ собой сѣченія круговаго конуса плоскостью.

2. Исходя изъ нашего опредѣленія, можно легко построить сколько угодно точекъ коническаго сѣченія, если даны F_1 и φ_2 ; если φ_2 есть окружность, то мы будемъ обозначать ея радіусъ черезъ $2a$, ея центръ




Фиг. 131.




Фиг. 132.

— черезъ F_2 . Если зададимъ на φ_2 точку касанія Q окружности κ , проходящей черезъ точку F_1 и касающейся φ_2 , то ея центръ P лежитъ, съ одной стороны, на перпендикулярѣ, возставленномъ изъ середины отрезка F_1Q ; съ другой стороны, онъ лежитъ на радіусѣ F_2Q , если φ_2 есть окружность (фиг. 131 и 132), или, если φ_2 вырождается въ прямую,—на

прямой, перпендикулярной къ φ_2 въ точкѣ Q (фиг. 133). Если, въ случаѣ эллипса или гиперболы, мы изъ точки P , какъ изъ центра, проведемъ окружность λ , проходящую черезъ точку F_2 (фиг. 134 и 135), то прямая F_1P всегда встрѣчаетъ эту окружность въ одной такой точкѣ R , что $RF_1 = QF_2$ равно радиусу $2a$ окружности φ_2 . Окружность λ проходитъ, такимъ образомъ, черезъ точку F_2 и касается нѣкоторой неподвижной окружности φ_1 , имѣющей




Фиг. 133.



Фиг. 134.

центр въ точкѣ F_1 и радиусъ $2a$. Эллипсъ и гипербола являются, слѣдовательно, геометрическимъ мѣстомъ центровъ какъ тѣхъ окружностей, которыя проходятъ черезъ точку F_2 и касаются окружности φ_1 , такъ и тѣхъ окружностей, которыя проходятъ




Фиг. 135.

черезъ точку F_1 и касаются окружности φ_2 . Такъ какъ определяющіе элементы F_1 и φ_2 конического сѣченія путемъ отраженія отъ перпендикуляра, составленнаго изъ середины отрезка F_1F_2 , переходятъ въ определяющіе элементы F_2 и φ_1 , то всѣ его точки расположены

симметрично относительно этого перпендикуляра; такъ какъ, съ другой стороны, при отраженіи относительно прямой F_1F_2 эти элементы преобразуются сами въ себя, то и прямая F_1F_2 дѣлитъ коническое сѣченіе на двѣ симметрично равныя части. Эллипсъ и гипербола имѣютъ, такимъ образомъ, двѣ взаимноперпендикулярныя оси симметріи;


на одной из них лежат точки F_1, F_2 — так называемые „фокусы“ конического сечения, из которых ни один, согласно вышеизложенному, не имеет никакого предпочтения перед другим, как это могло бы казаться по определению. Теперь не трудно также указать и другое определение этих двух типов конических сечений, пользующихся одинаково, обоими фокусами; именно в случае эллипса, как видно на фиг. 131, $PF_1 + PF_2 = F_2Q = 2a$; в случае же гиперболы, как видно на фиг. 132, либо $PF_1 - PF_2$, либо $PF_2 - PF_1 = 2a$. Итак: эллипс и, соответственно, гипербола, есть геометрическое место точек, расстояния которых от двух неподвижных точек F_1 и F_2 — „фокусов“ — имеют постоянную сумму или, соответственно, постоянную разность. Аналогично этому, парабола есть геометрическое место всех точек, равноотстоящих от некоторой неподвижной точки F_1 — „фокуса“ — и неподвижной прямой — „директриссы“, — как это можно непосредственно видеть из построения точек параболы на фиг. 133. Совершенно ясно, что эти свойства расстояний могли бы служить для определения конических сечений, при чем линию φ_2 , о которой идет речь в первоначальном определении, было бы всякий раз нетрудно указать. На основании этого нового определения можно было бы без труда доказать, как мы и сделаем в начертательной геометрии, пользуясь так называемыми Данделеновыми сферами, что определяемыми таким образом конические сечения могут быть получены, как сечения круговых конусов, а, следовательно, как проекции окружностей или же как образование проективных пучков.

3. Возвращаясь теперь к первоначальному определению, данному в п. 1, мы займемся теперь задачей о разыскании точек пересечения конического сечения, заданного фокусом F_1 и направляющей φ_2 , с прямой u (фиг. 136, 137, 138). В силу нашего определения это значит, что нам нужно найти на прямой u центры окружностей x , проходящих через точку F_1 и касающихся φ_2 ; но все окружности, имеющие центры на прямой u и проходящая через точку F_1 , проходят еще через одну постоянную точку G_1 , симметричную с F_1 относительно прямой u . Эти окружности образуют поэтому пучок, и мы возвращаемся, таким образом, к задаче, разрешенной уже раньше, о построении окружностей пучка, касающихся данной окружности φ_2 . Это дает следующее решение нашей




Фиг. 136.

задачи для случая эллипса или гиперболы. Через точки F_1 и G_1 проведем вспомогательную окружность η , пересекающую окружность φ_2 в двух точках A и B ; из точки пересечения S прямых F_1G_1 и AB проведем касательная къ окружности φ_2 ; радиусы F_2T_1 и F_2T_2 окружности φ_2 , проходящей через точки касания T_1 и T_2 , встречаютъ прямую u в искомымъ точкамъ P_1 и P_2 *). Такимъ образомъ, прямая u можетъ имѣть съ эллипсомъ или гиперболой не болѣе двухъ общихъ точекъ. Чтобы эти двѣ точки P_1 и P_2 слились въ одну и прямая u сдѣлалась касательной конического сѣченія, точки T_1 и T_2 должны совпадать, что возможно только въ томъ случаѣ, когда въ ту же точку падаетъ также точка S , т. е., когда точка G_1 лежитъ на окружности φ_2 . Прямая u представляетъ собой касательную къ эллипсу или гиперболѣ, если точка Q , симметричная съ однимъ изъ фокусовъ относительно прямой u , лежитъ на окружности φ_2 . На фиг. 131 и 132 прямая MP является касательной, а P есть точка касанія. Если O есть середина отрезка F_1F_2 (фиг. 131 и 132), а M —середина отрезка F_1Q , то $OM \parallel F_2Q$, такъ что $OM = \frac{1}{2}F_2Q = a$. Основанія M перпендикуларовъ, опущенныхъ изъ фокусовъ эллипса или гиперболы на касательная послѣдней, лежатъ, слѣдовательно, на окружности, имѣющей своимъ центромъ „центр“ эллипса O и ра-



Фиг. 137.

*) Если прямая u проходитъ через точку F_2 , то точки T_1 и T_2 просто определяются, какъ пересѣченіе прямой u съ окружностью φ_2 , ибо въ этомъ случаѣ $AB \perp F_1G_1$.



Фиг. 138.

диусомъ a . Касательная къ эллипсу въ нѣкоторой точкѣ P дѣлитъ пополамъ уголъ F_1PF_2 , составленный лучами PF_1 и PF_2 , или соотвѣтственно смежный уголъ.

4. Съ незначительными измѣненіями всѣ эти предложенія справедливы также и относительно параболы. Если мы измѣнимъ построеніе, указанное на фиг. 136 и 137, такимъ образомъ, что проведемъ изъ точки S касательную не къ φ_2 , а къ вспомогательной окружности η , и если C есть одна изъ точекъ касанія, то послѣдняя вмѣстѣ съ точками T_1 и T_2 лежитъ на окружности, имѣющей центръ въ точкѣ S . Въ этой модификаціи построеніе, указанное на фиг. 136 и 137, применимо и къ параболѣ (фиг. 138), когда φ_2 вырождается въ прямую. Чтобы найти точку пересѣченія прямой u съ параболой, опредѣляемой фокусомъ F_1 и направляющей φ_2 , мы опускаемъ перпендикуляръ изъ точки F_1 на прямую u и находимъ точку его пересѣченія S съ директриссой; изъ произвольной точки прямой u , какъ изъ центра, проводимъ окружность η^* , проходящую черезъ точку F_1 , и къ ней проводимъ касательную SC изъ точки S . Окружность, имѣющая центръ въ точкѣ S и проходящая черезъ точку C , пересѣкаетъ прямую φ_2 въ двухъ точкахъ T_1 и T_2 , перпендикуляры же, возставленные изъ точекъ T_1, T_2 къ прямой φ_2 , пересѣкаютъ прямую u въ точкахъ P_1 и P_2 , которая прямая u имѣетъ общими съ параболой.

Прямая u становится касательной къ параболѣ, когда точки P_1 и P_2 совпадаютъ, когда совпадаютъ, слѣдовательно, точки T_1 и T_2 на прямой φ_2 (фиг. 133). Геометрическое мѣсто оснований M перпендикуляровъ, опущенныхъ изъ фокуса F_1 на касательныя къ параболѣ, есть прямая, параллельная директриссѣ φ_2 и дѣлящая пополамъ разстояніе послѣдней отъ фокуса.


Эта параллель сама также представляетъ собой касательную въ такъ называемой вершинѣ параболы, т. е. въ точкѣ ея пересѣченія съ осью симметріи.

5. Подобно тому, какъ коническое сѣченіе можетъ имѣть съ прямой не болѣе двухъ общихъ точекъ, такъ изъ любой точки A могутъ проходить не болѣе, чѣмъ двѣ касательныя коническаго сѣченія, какъ мы это сейчасъ обнаружимъ. Въ самомъ дѣлѣ, пусть Q будетъ точка (фиг. 139), симметричная съ F_1 относительно прямой u ; если u есть касательная, то точка Q находится на φ_2 , при чемъ $AQ = AF_1$. Отсюда слѣдуетъ, что точка Q лежитъ на окружности α , имѣющей центръ въ точкѣ A и проходящей черезъ точку F_1 . Съ другой стороны, точка Q лежитъ на окружности φ_2 ; слѣдовательно, существуютъ двѣ точки Q_1 и Q_2 , расположенныя такимъ образомъ, что перпендикуляры, возста-


*) Окружность η можетъ и не встрѣчать прямой φ_2 .

вланные изъ середины отрезков F_1Q_1 и F_1Q_2 , служатъ касательными и, какъ радиусы круга α , проходятъ черезъ точку A . Построение остается въ силѣ и въ случаѣ параболы (фиг. 140).

Если точки F_1 и F_2 совпадаютъ, а φ_2 есть окружность радиуса $2a$, то коническое сѣченіе представляетъ собой окружность съ радиусомъ a . Приведенное выше построение касательной переходитъ при этомъ въ




Фиг. 139.




Фиг. 140.

старое, указанное Евклидомъ, построение окружности, которое остается въ силѣ и въ обѣихъ неевклидовыхъ геометріяхъ. И второе построение касательной къ окружности, которое основано на томъ, что радиусъ, проведенный въ точку касанія, перпендикуляренъ къ касательной, можетъ быть распространено на коническія сѣченія (фиг. 141 и 142). Основаніе M перпендикуляра, который мы можемъ опустить изъ точки F_1 на касательную



Фиг. 141



Фиг. 142.

тельную u къ коническому сѣченію, лежитъ, какъ мы видѣли, въ случаѣ эллипса и гиперболы, на окружности σ , имѣющей центръ въ центрѣ коническаго сѣченія и радиусъ a . Въ случаѣ параболы эта окружность переходитъ въ касательную въ вершинѣ. Другимъ геометрическимъ мѣстомъ точки F является окружность, имѣющая отрезокъ AF_1 своимъ діаметромъ.

Объ эти окружности опредѣляютъ два положенія точки M , чѣмъ наша задача разрѣшена.

Если точки F_1 и F_2 вновь сливаются въ одну точку O , такъ что коническое сѣченіе обращается въ окружность, то первое геометрическое мѣсто совпадаетъ съ этой самой окружностью, а второе — съ окружностью, имѣющей діаметръ AO .

Этими метрическими предложеніями и построеніями мы ограничимся. Дальнѣйшія детали можно найти въ спеціальныхъ учебникахъ, изъ которыхъ мы укажемъ книгу Цейтена*), которую тѣмъ охотнѣе рекомендуемъ, что авторъ положилъ въ основу то же опредѣленіе, которымъ пользовались мы.

) Zeuthen., Grundriss einer elementargeometrischen Kegelschnittslehre.



ДОПОЛНЕНІЯ.



1. О бесконечно удаленных элементах.

Вряд ли есть в области геометрии вопрос, относительно которого царить такая путаница и который вызывает столько недоумения, как вопрос о бесконечно удаленных элементах. Оно и понятно почему. Для того, чтобы эти понятия не вызвали сомнений, было бы необходимо указать, каковы те логические положения, которыми эти элементы вводятся в геометрию, т. е. каковы те формальные свойства этих образов, которыми мы пользуемся, когда ведем то или иное о них разсужденіе. Но этого мало. Для того, чтобы была уверенность, что введение в геометрию бесконечно удаленных образов не может привести къ противорѣчію съ основными положеніями геометріи, нужно знать эти послѣднія, т. е. нужна логическая формулировка тѣхъ основныхъ положеній, изъ которыхъ чисто формально можетъ быть развита геометрія. Но, какъ извѣстно, есть еще очень мало сочиненій, въ которыхъ геометрія выводится чисто логически изъ строго сформулированныхъ посылокъ. Коль скоро же этого нѣтъ, то нѣтъ и тѣхъ средствъ, помощьюъ которыхъ можно было бы доказать, что введеніе бесконечно удаленныхъ элементовъ не можетъ привести къ противорѣчію; болѣе того, не имѣетъ опредѣленнаго содержанія и самый вопросъ, ибо неизвѣстно, съ чѣмъ, собственно, не должно быть противорѣчія. Такого рода сомнѣнія возникаютъ, конечно, и во всѣхъ остальныхъ частяхъ геометріи у всякаго, кто хочетъ найти въ ней строго логическую дисциплину; но тому, кто интересуется фактической стороной при изученіи другихъ частей геометріи приходится на помощь интуиція, непосредственное воззрѣніе, наглядныя представленія, которыя онъ связываетъ съ геометрическими образами. Но всѣ эти средства отказываются служить, когда дѣло касается бесконечно удаленныхъ элементовъ. Какъ представить себѣ, что параллельныя линіи, которыя, по опредѣленію своему, не имѣютъ общихъ точекъ, все же пересѣкаются въ нѣкоторой бесконечно удаленной точкѣ? Какъ представить себѣ, что на прямой имѣется только одна бесконечно удаленная точка, а на плоскости только одна бесконечно удаленная прямая? Какъ представить себѣ, что въ пространствѣ имѣется только одна бесконечно удаленная плоскость? Гдѣ, съ какой стороны

пространства она расположена? Представить же себя, что плоскость окружает все пространство, мы также не можем. Итак, когда речь идет о бесконечно удаленных элементах, то мы не имеем ни тех логических основ, исходя из которых мы могли бы делать о них формальные выводы, ни наглядных представлений, которые руководят нами при изучении других вопросов геометрии в тех случаях, когда мы не имеем достаточной логической почвы.

Между тем введение бесконечно удаленных элементов несомненно приносит часто значительную пользу. В одних случаях, это приводит к обобщению предложений; так, например, с введением бесконечно удаленных точек теорема Дезарга обобщается и на тот случай, когда прямая, соединяющая соответствующие вершины двух треугольников, параллельна; в других случаях мы быстрее приходим к результату, пользуясь бесконечно удаленными элементами. Для проективной же геометрии введение бесконечно удаленных элементов совершенно необходимо, так как проективное преобразование пространства было бы совершенно невозможно, если бы не учитывать бесконечно удаленных элементов¹⁾. С другой стороны, если мы будем всегда трактовать бесконечно удаленные точки так же, как и обыкновенные точки, то мы легко можем прийти к абсурду. Было бы, например, несправедливо сказать, что из любой бесконечно удаленной точки можно, как и из любой конечной точки, опустить перпендикуляр на любую прямую или на любую плоскость; а в тех случаях, когда из бесконечно удаленной точки можно провести перпендикуляр на прямую или на плоскость, таковых может быть не один, а бесчисленное множество. При таких условиях естественно возникает вопрос: в каких же пределах можно пользоваться бесконечно удаленными элементами, не рискуя прийти к абсурду.

Все эти вопросы в настоящее время можно считать совершенно разрешенными в том смысле, что никаких принципиальных затруднений они уже не вызывают. Но сочинений, в которых этот вопрос был бы достаточно выяснен, очень мало, и они не принадлежат к числу элементарных²⁾.

¹⁾ Врѣще: не вводя бесконечно удаленных элементов, можно было бы сохранить только те проективные соответствия, которые сводятся к движениям и к подобным преобразованиям; аналитически это сводится к тому, что можно было бы рассматривать только те проективные соответствия, которые выражаются алгебраически целыми линейными преобразованиями.

²⁾ Е. Буницкій. „Бесконечно удаленные элементы в геометрии положений“. Записки Императорскаго Новороссійскаго университета. Т. 92. 1903.

F. Schur. „Ueber die Einführung der sogenannten idealen Elemente in die projective Geometrie“. Mathem. Annalen. XXXIX. 1891.

Нужно сказать, что и въ настоящемъ сочиненіи авторъ относится къ этому вопросу очень легко, и врядъ ли указанія на стр. 115, 119, 149 и др. могутъ удовлетворить читателя. Мы не имѣемъ возможности въ предѣлахъ настоящей статьи исчерпать вопросъ до конца, но полагаемъ, что нижеслѣдующія строки прольютъ нѣкоторый свѣтъ на этотъ вопросъ.

Въ настоящемъ сочиненіи авторъ неоднократно выясняетъ ту мысль, что одна и та же формально построенная логическая система можетъ находить себѣ примѣненіе къ различнымъ многообразіямъ, т. е. къ различнымъ комплексамъ объектовъ или образовъ. Такія два многообразія, которыя равно подходятъ подъ одну и ту же логическую систему, между которыми можно, слѣдовательно, установить однозначное соотвѣтствіе такимъ образомъ, чтобы соотвѣтственные элементы, какъ объекты, примѣненія этой логической системы, играли въ ней одну и ту же роль, мы будемъ называть подобными относительно этой логической системы. Такимъ образомъ, на примѣръ, совокупность всѣхъ комплексныхъ чиселъ представляетъ собой многообразіе, подобное многообразію всѣхъ точекъ на плоскости относительно ариѳметики комплексныхъ чиселъ; ибо, какъ извѣстно, между этими многообразіями можетъ быть установлено соотвѣтствіе такимъ образомъ, чтобы каждой точкѣ отвѣчало одно и только одно комплексное число (его аффиксъ) и обратно; вмѣстѣ съ тѣмъ ариѳметическія дѣйствія надъ точками могутъ быть установлены такъ, чтобы они вполне соотвѣтствовали дѣйствіямъ надъ ихъ аффиксами; обѣ системы представляютъ собой комплексы объектовъ, къ которымъ примѣняется ариѳметика комплексныхъ чиселъ.

Такимъ же образомъ совокупность комплексныхъ чиселъ по отношенію къ той же логической системѣ представляетъ собой многообразіе, подобное многообразію всѣхъ векторовъ на плоскости, выходящихъ изъ одной точки.

Чтобы это важное понятіе, на которомъ основаны всѣ нижеслѣдующія соображенія, вполне отчетливо выяснить, укажемъ еще нѣкоторые геометрическіе примѣры. Во-первыхъ, въ примѣчаніи на стр. 38—42 было приведено многообразіе, подобное многообразію точекъ относительно Евклидовой геометріи. Оставляя цѣлый рядъ другихъ примѣровъ, которые авторъ разсматриваетъ въ текстѣ настоящаго сочиненія въ примѣненіи къ различнымъ геометрическимъ системамъ, разсмотримъ еще слѣдующій примѣръ.

F. Amodeo. „Sulla introduzione dei elementi infiniti alla geometria projectiva“. *Giornale di Matematiche*. XXXIV. 1896.

Dr. M. Pasch. „Vorlesungen über neuere Geometrie. Leipzig. 1882.

Возьмемъ многообразіе всѣхъ лучей, выходящихъ въ (Евклидовомъ) пространствѣ изъ одной точки O , т. е. такъ называемую связку лучей. При этомъ подъ лучемъ мы разумѣемъ полупрямую, т. е. каждую изъ двухъ частей, на которыя точка O дѣлитъ прямую. Представимъ себѣ далѣе сферу произвольнаго радіуса, имѣющую центръ въ точкѣ O . Каждый изъ нашихъ лучей встрѣчаетъ сферу въ одной точкѣ, которую мы будемъ считать точкой сферы, соответствующей этому лучу. Такимъ образомъ, между связкой лучей и многообразіемъ точекъ нашей сферы установлено однозначное соответствіе. Каждому образу (совокупности точекъ) на сферѣ отвѣчаетъ образъ (совокупность лучей въ связкѣ). Такъ, напримѣръ, дугъ большого круга на сферѣ будетъ соответствовать въ связкѣ плоскій уголъ, т. е. точкамъ, заполняющимъ на сферѣ дугу большого круга, будутъ соответствовать лучи, заполняющіе плоскій уголъ. Цѣлому большому кругу будетъ соответствовать совокупность лучей, заполняющихъ цѣлую плоскость. Сферическому треугольнику будетъ соответствовать въ этомъ смыслѣ трехгранный уголъ. Каждое движеніе на сферѣ опредѣленнымъ образомъ замѣщаетъ точки сферы другими точками той же связки. Вместѣ съ тѣмъ каждое предположеніе, выражающее свойство сферическихъ фигуръ, выражаетъ также свойство соответствующихъ образовъ въ связкѣ, если подъ терминами, фигурирующими въ предположеніи, разумѣть тѣ образы, которые имъ соответствуютъ въ связкѣ. Такимъ образомъ, напримѣръ, условія равенства сферическихъ треугольниковъ выразятъ условія равенства трехгранныхъ угловъ и т. д. Многообразіе лучей, представляемое связкой, и многообразіе точекъ на сферѣ подобны относительно той логической системы, которую мы называемъ сферической геометрией.

Выяснивши это понятіе, мы постараемся теперь показать, что совокупность точекъ, прямыхъ и плоскостей Евклидова пространства представляетъ собой многообразіе, подобное совокупности всѣхъ возможныхъ связокъ, прямыхъ и плоскостей въ пространствѣ относительно той логической системы, которую составляетъ совокупность аксіомъ сопряженія.

Какъ было выяснено въ текстѣ настоящаго сочиненія. Гильбертъ въ своей системѣ геометріи подраздѣляетъ аксіомы на пять группъ, изъ которыхъ первая состоитъ изъ слѣдующихъ восьми аксіомъ, называемыхъ аксіомами сопряженія.

- 1₁. Двѣ различныя точки A и B всегда опредѣляютъ прямую.
- 1₂. Прямая опредѣляется также любыми двумя различными своими точками.
- 1₃. На каждой прямой всегда имѣются, по меньшей мѣрѣ, двѣ точки, на каждой плоскости, по меньшей мѣрѣ, три точки, не расположенныя на одной прямой.

- I_6 . Три точки, не лежащая на одной прямой, всегда определяют плоскость.
- I_7 . Плоскость определяется также любыми тремя своими точками, не расположенными на одной прямой.
- I_8 . Если две точки прямой лежат на плоскости, то все точки этой прямой лежат на этой плоскости.
- I_9 . Если две плоскости имеют общую точку, то они имеют по крайней мере еще одну общую точку.
- I_{10} . Существуют по крайней мере четыре точки, не расположенные в одной плоскости.

Подъ связкой прямых мы будем разуметь совокупность прямых (не лучей), проходящихъ через одну точку.

Условимся теперь называть каждую связку прямых точкой. Мы будем всегда писать это слово въ разрядку, когда будем употреблять его въ этомъ новомъ для него значеніи. Ясно, что каждой обыкновенной точкѣ пространства отвѣчаетъ связка, т. е. точка въ новомъ значеніи этого термина. Въ этомъ новомъ многообразіи точекъ, т. е. многообразіи всѣхъ связокъ Евклидова пространства, мы будемъ подъ прямой и плоскостью разуметь то же, что и обыкновенно въ геометріи; мы будемъ часто писать и эти термины въ разрядку только съ тою цѣлью, чтобы подчеркнуть, что мы рассматриваемъ ихъ теперь въ иной концепціи (въ многообразіи точекъ). Мы будемъ говорить, что прямая проходитъ черезъ точку, если она входитъ въ составъ соответствующей связки. Мы будемъ говорить, что плоскость проходитъ черезъ точку, если она содержитъ, хотя бы одну прямую соответствующей связки (ясно, что она уже въ такомъ случаѣ необходимо содержитъ безчисленное множество прямыхъ этой связки); подъ терминомъ же точка лежитъ на прямой или на плоскости мы будемъ разуметь, какъ обыкновенно, что прямая или плоскость соответственно содержитъ точку.

Теперь покажемъ, что совокупность точекъ, прямыхъ и плоскостей представляетъ собой многообразіе, подобное совокупности точекъ, прямыхъ и плоскостей въ обыкновенномъ смыслѣ этихъ словъ относительно аксіомъ сопряженія. Такъ какъ термины прямая и плоскость сохраняютъ свое значеніе, то дѣло сводится къ тому, чтобы обнаружить, что аксіомы сопряженія остаются¹⁾ въ силѣ, если подъ словомъ точка разуметь не обыкновенную точку, а связку, а подъ терминами плоскость и прямая проходить черезъ точку или содержать точку разуметь то, что установлено выше.

Дѣйствительно, двѣ различныя точки, т. е. двѣ не совпадающія связки, всегда определяютъ прямую, черезъ нихъ проходящую: это есть единственная общая прямая обѣихъ связокъ; она содержитъ обѣ точки, ибо принадлежитъ обѣимъ связкамъ (аксіома I_1). Ясно также, что та же

прямая определяется и любыми другими двумя различными своими точками, т. е. любыми двумя различными связками, которым она принадлежит (аксіома I_2). Далѣе, на каждой прямой имѣются по меньшей мѣрѣ двѣ точки, т. е. каждая прямая принадлежит, по крайней мѣрѣ, двумъ различнымъ связкамъ; на каждой плоскости имѣются по меньшей мѣрѣ три точки, не расположенныя на одной прямой, т. е. каждая плоскость содержитъ, по крайней мѣрѣ, три прямыхъ, принадлежащихъ тремъ различнымъ связкамъ (аксіома I_3). Три точки, не лежащія на одной прямой, всегда определяютъ плоскость, черезъ нихъ проходящую, ибо три различныя связки, не имѣющія общей прямой, определяютъ три прямыхъ, принадлежащихъ каждая двумъ изъ этихъ связокъ. Черезъ эти три прямыя проходитъ плоскость, и при томъ единственная, удовлетворяющая требованію (аксіома I_4). Ясно, что эта плоскость определяется также любыми тремя другими своими точками, не расположенными на одной прямой (аксіома I_5). Если двѣ точки прямой лежатъ на плоскости, т. е. если эта плоскость содержитъ по одной прямой отъ двухъ различныхъ связокъ, то она содержитъ также общую прямую этихъ связокъ, а, слѣдовательно, проходитъ черезъ каждую точку этой прямой, ибо каждая связка, содержащая эту прямую, имѣетъ, такимъ образомъ, прямую, лежащую въ этой плоскости (аксіома I_6). Если двѣ плоскости имѣютъ одну общую точку, т. е. если двѣ различныя плоскости содержатъ каждая по прямой связки, то онѣ всегда имѣютъ общую прямую, принадлежащую связкѣ, а, слѣдовательно, имѣютъ прямую, принадлежащую еще и другимъ связкамъ, т. е. имѣютъ и другія точки (аксіома I_7). Наконецъ, если мы возьмемъ три точки, не лежащія на одной прямой, то онѣ, какъ мы видѣли, всегда определяютъ плоскость; а такъ какъ всегда существуютъ еще связки, не имѣющія съ этой плоскостью ни одной общей прямой, то существуютъ, по крайней мѣрѣ, четыре точки, не расположенныя въ одной плоскости (аксіома I_8).

Такимъ образомъ, мы видимъ, что многообразіе точекъ, прямыхъ и плоскостей подобно многообразію обыкновенныхъ точекъ, прямыхъ и плоскостей относительно аксіомъ расположенія.

Теперь, сверхъ тѣхъ связокъ, которыя мы разсматривали до сихъ поръ, мы введемъ еще другого рода связки, именно мы условимся называть также связкой совокупность всѣхъ прямыхъ, параллельныхъ какой-либо опредѣленной прямой. Этимъ вводится въ разсмотрѣніе безчисленное множество новыхъ связокъ. Сообразно же введенной нами выше новой терминологіи мы будемъ эти связки также называть точками, но, въ отличіе отъ прежде введенныхъ точекъ, мы будемъ называть ихъ безконечно удаленными точками. Въ этомъ новомъ своемъ значеніи безконечно удаленная точка представляетъ собою уже вполнѣ опредѣленное понятіе: это есть связка параллелей. Въ дальнѣйшемъ мы

сохраним терминологию, принятую раньше, т. е. мы будем говорить, что прямая содержит бесконечно удаленную точку (или что бесконечно удаленная точка лежит на прямой), если эта прямая входит в состав соответствующей связки. В таком случае мы можем сказать, что на каждой прямой лежит одна и только одна бесконечно удаленная точка, ибо каждая прямая входит в состав одной и только одной связки параллелей. Вместе с тем параллельны между собой прямые все проходят через одну и ту же бесконечно удаленную точку, так как они принадлежат одной связке параллелей.

Далее, как и прежде, мы будем говорить, что плоскость проходит через бесконечно удаленную точку (или что бесконечно удаленная точка лежит на плоскости), если плоскость содержит хотя бы одну прямую, принадлежащую соответствующей связке. Ясно, таким образом, что, согласно этой терминологии, плоскость содержит те бесконечно удаленные точки, которые представляют собой связки прямых, параллельных этой плоскости; и так как таких связок имеется бесчисленное множество, то можно сказать, что каждая плоскость содержит бесчисленное множество бесконечно удаленных точек. Совокупность бесконечно удаленных точек, принадлежащих одной плоскости, мы будем называть бесконечно удаленной прямой этой плоскости. Согласно этой терминологии, на каждой плоскости имеется одна и только одна бесконечно удаленная прямая. Вместе с тем две параллельные плоскости имеют одну и ту же бесконечно удаленную прямую, ибо бесконечно удаленные прямые как одной, так и другой плоскости состоят из тех же бесконечно удаленных точек, т. е. из тех связок, которые параллельны этим плоскостям. Напротив, бесконечно удаленные прямые, принадлежащие двум непараллельным плоскостям, не совпадают, а имеют только одну общую бесконечно удаленную точку. В самом деле, общая бесконечно удаленная точка двух таких бесконечно удаленных прямых должна лежать в обеих плоскостях, т. е. это должна быть связка параллелей, из которых некоторые лежат в одной из этих плоскостей и некоторые в другой и которые все, следовательно, параллельны обеим плоскостям. Ясно, что такая связка есть только одна; это есть связка прямых, параллельных прямой пересечения наших двух плоскостей.

Наконец, совокупность всех бесконечно удаленных точек мы будем называть бесконечно удаленной плоскостью. При такой терминологии в пространстве есть, следовательно, одна бесконечно удаленная плоскость, составленная из всех бесконечно удаленных точек.

Къ рассмотрѣнному нами выше многообразію точекъ (которыя въ отличіе отъ вновь введенныхъ бесконечно удаленныхъ точекъ мы

будем называть конечными точками), прямых и плоскостей мы присоединим теперь наши новые точки прямым и плоскостям — бесконечно удаленными. Мы расширим, таким образом, многообразие, обогатив его новыми элементами. Теперь мы покажем, что это расширенное таким образом многообразие удовлетворяет всем аксиомам сопряжения.

Действительно, покажем, прежде всего, что любые две различные точки определяют одну и только одну прямую, через них проходящую. Нам нет, конечно, надобности возвращаться к тому случаю, когда обе точки конечны. Нам нужно, следовательно, рассмотреть, во-первых, случай, когда одна точка A конечная, а другая B — бесконечно удаленная, и, во-вторых, случай, когда обе точки бесконечно удаленны.

Положим, что A есть конечная точка, а B — бесконечно удаленная; иначе говоря, A есть обыкновенная связка, а B — связка параллелей. Прямая, проходящая через обе точки, должна принадлежать обоим связкам. Это есть та прямая связки A , которая параллельна прямой связки B . Ясно, что в связке B есть одна и только одна такая прямая.

Заметим, что через каждую бесконечно удаленную точку B проходит бесчисленное множество бесконечно удаленных прямых. В самом деле, каждая плоскость, параллельная прямой связки B , содержит некоторые прямые этой связки, т. е. содержит точку B ; последняя принадлежит, следовательно, бесконечно удаленным прямым всех этих плоскостей; а, так как между этими плоскостями имеется бесчисленное множество таких, которые попарно друг другу не параллельны, то через точку B проходит, таким образом, бесчисленное множество бесконечно удаленных прямых. Но ни одна из этих прямых не проходит через конечную точку A , ибо бесконечно удаленная прямая по самому своему определению есть совокупность бесконечно удаленных точек, а конечных точек не содержит.

Обратимся теперь к тому случаю, когда A и B суть различные бесконечно удаленные точки. Ясно, что через них не может проходить конечная прямая, ибо таковая, как мы видели выше, всегда содержит только одну бесконечно удаленную точку. Через наши две точки может поэтому проходить только бесконечно удаленная прямая; и, действительно, плоскость, параллельная обоим связкам, содержит обе точки, и, следовательно, бесконечно удаленная прямая такой плоскости проходит через точки A и B . Обратное, всякая плоскость, содержащая бесконечно удаленные точки A и B , должна быть параллельна обоим связкам; а так как все такие плоскости параллельны между собой, то они имеют, как мы видели выше, одну и ту же прямую, которая, таким образом, вполне определяется точками A и B .

Такимъ образомъ, наше многообразіе, обогащенное бесконечно удаленными точками, прямыми и плоскостями, удовлетворяетъ аксіомѣ I_1 . Что касается аксіомы I_2 , то она лишь при особой точкѣ зрѣнія Гильберта на идею инцидентности, представляетъ собою нѣчто отличное отъ аксіомы I_1 . Изъ сказаннаго выше, во всякомъ случаѣ, вытекаетъ, что всякая прямая опредѣляется любыми двумя своими точками.

Обращаясь къ аксіомѣ I_3 , замѣтимъ, что намъ нужно только доказать, что она справедлива въ примѣненіи къ бесконечно удаленной прямой и къ бесконечно удаленной плоскости. Мы уже имѣли случай, однако, выше показать, что въ каждой плоскости имѣется безчисленное множество бесконечно удаленныхъ точекъ, и что единственная бесконечно удаленная плоскость содержитъ всѣ бесконечно удаленныя точки. Вопросъ объ аксіомѣ I_3 , такимъ образомъ, совершенно исчерпанъ.

Обращаясь теперь къ аксіомѣ I_4 , мы должны, собственно, рассмотреть тѣ случаи, когда въ числѣ трехъ точекъ, не лежащихъ на одной прямой, имѣется одна, двѣ или три бесконечно удаленныя точки. Положимъ, что A и B суть конечныя точки, а C — бесконечно удаленная. Въ такомъ случаѣ бесконечно удаленная плоскость не можетъ проходить черезъ эти три точки, ибо таковая, по опредѣленію, состоитъ только изъ бесконечно удаленныхъ точекъ. Что же касается конечныхъ плоскостей, проходящихъ черезъ точки A и B , то онѣ необходимо должны содержать также прямую AB . Чтобы такого рода плоскость проходила также черезъ бесконечно удаленную точку C , нужно, чтобы она была параллельна связкѣ C . Такая плоскость (проходящая черезъ данную прямую и параллельная данной связкѣ параллелей) есть одна и только одна, если только прямая AB сама не входитъ въ составъ связки, т. е. не содержитъ точки C . Положимъ теперь, что B и C суть бесконечно удаленныя точки, а A — конечная. Плоскость, проходящая черезъ эти три точки, должна содержать прямую связки A (слѣдовательно, должна проходить черезъ центръ этой связки) а также прямую связку B и C (слѣдовательно, должна быть параллельна связкамъ B и C). Такая плоскость есть одна и только одна (именно та, которая опредѣляется двумя прямыми связки A , принадлежащими соответственно связкамъ B и C). Наконецъ, если всѣ три точки бесконечно удаленныя, то черезъ нихъ проходитъ бесконечно удаленная плоскость и никакая другая не проходитъ, ибо всѣ бесконечно удаленныя точки, лежащія въ одной конечной плоскости, образуютъ одну бесконечно удаленную прямую этой плоскости.

Аксиома I_4 , такимъ образомъ, исчерпана; что касается аксіомы I_5 , то о ней приходится сказать то же, что и объ аксіомѣ I_2 .

Переходимъ теперь къ аксіомѣ I_6 . Здѣсь мы опять должны доказать, что она справедлива въ тѣхъ случаяхъ, когда одна изъ двухъ точекъ

бесконечно удаленная, или когда обѣ бесконечно удаленныя. Въ послѣднемъ случаѣ, если обѣ точки бесконечно удаленныя, то прямая, ими опредѣляемая, также бесконечно удаленная. Такія двѣ точки всегда принадлежатъ бесконечно удаленной плоскости, но послѣдней принадлежитъ также и опредѣляемая ими прямая, такъ какъ она состоитъ исключительно изъ бесконечно удаленныхъ точекъ. Если же нѣкоторая конечная плоскость содержитъ двѣ бесконечно удаленныя точки A и B , то ея бесконечно удаленная прямая содержитъ эти точки, а, такъ какъ черезъ точки A и B , какъ мы видѣли выше, проходитъ только одна прямая, то послѣдняя совпадаетъ съ бесконечно удаленной прямой этой плоскости и, слѣдовательно, лежитъ цѣликомъ въ этой плоскости.

Еще нагляднѣе то же самое можно показать такимъ образомъ. Всякая конечная плоскость, содержащая двѣ различныя бесконечно удаленныя точки A и B , параллельна связкамъ A и B . Всѣ такія плоскости параллельны между собой, а потому, какъ было доказано, имѣютъ одну общую бесконечно удаленную прямую. Это и есть прямая, проходящая черезъ данныя двѣ точки, и лежащая такимъ образомъ, цѣликомъ въ каждой плоскости, проходящей черезъ точки A и B .

Если теперь изъ двухъ данныхъ точекъ одна, скажемъ A , конечная, а другая B —бесконечно удаленная, то AB есть та прямая связки A , которая принадлежитъ также связкѣ B (т. е. которая параллельна остальнымъ прямымъ этой связки). Всякая плоскость, проходящая черезъ точку B , параллельна прямымъ связки B ; поэтому, если она проходитъ также черезъ точку A , то она необходимо содержитъ ту прямую этой связки, которая параллельна связкѣ B , т. е. она содержитъ прямую AB . Въ примѣненіи къ нашему многообразію, такимъ образомъ, справедлива аксіома I_6 .

Обращаясь къ предложенію I_7 , мы опять должны рассмотреть, собственно, тотъ случай, когда двѣ плоскости имѣютъ общую бесконечно удаленную точку, ибо, если онѣ имѣютъ общую конечную точку, то онѣ сами конечныя плоскости, а этотъ случай уже исчерпанъ выше. Если же двѣ плоскости имѣютъ общую бесконечно удаленную точку и одна изъ плоскостей бесконечно удаленная, то она имѣетъ со второй плоскостью общую бесконечно удаленную прямую, именно бесконечно удаленную прямую второй плоскости, которая, какъ составленная изъ бесконечно удаленныхъ точекъ, принадлежитъ также бесконечно удаленной плоскости. Если же двѣ конечныя плоскости имѣютъ общую бесконечно удаленную точку B , то обѣ онѣ параллельны связкѣ B . При такихъ условіяхъ эти двѣ плоскости либо параллельны, и тогда онѣ имѣютъ общую бесконечно удаленную прямую, содержащую также бесконечно удаленную точку B , либо онѣ пере-

сѣкаются по прямой, принадлежащей связкѣ B и содержащей, слѣдовательно, бесконечно удаленную точку B .

Нужно сказать и то, что справедливость аксіомы I_7 вытекаетъ изъ того, что въ нашемъ расширенномъ многообразіи любая двѣ плоскости, какъ мы видѣли выше, имѣютъ общую прямую — конечную, если эти плоскости не параллельны, и бесконечно удаленную, если онѣ параллельны.

Что касается аксіомы I_8 , то доказывать ея справедливость не приходится.

Итакъ, многообразіе точекъ, прямыхъ и плоскостей, обогащенное бесконечно удаленными точками, прямыми и плоскостями, представляетъ собой такой комплексъ образовъ, къ которымъ примѣняются всѣ аксіомы сопряженія. Въ этомъ многообразіи двѣ параллельныя прямая всегда пересѣкаются въ бесконечно удаленной точкѣ, двѣ параллельныя плоскости всегда пересѣкаются по бесконечно удаленной прямой; т. е. въ этомъ многообразіи бесконечно удаленные элементы обладаютъ тѣми формальными свойствами, которыя имъ присваиваются при введеніи ихъ въ элементарную геометрію; и такъ какъ мы имѣемъ, такимъ образомъ, многообразіе, въ примѣненіи къ которому элементарная геометрія, обогащенная бесконечно удаленными элементами, оказывается справедливой, то и логическаго противорѣчія здѣсь, очевидно, быть не можетъ. Всѣ тѣ выводы, которые изъ этихъ формальныхъ посылокъ вытекаютъ, не могутъ привести къ противорѣчію; и, если пользуясь бесконечно удаленными точками, мы придемъ къ выводамъ, касающимся конечныхъ точекъ, то эти выводы будутъ справедливы, какъ и всякіе выводы, сдѣланные относительно нѣкоторыхъ образовъ въ многообразіи, для котораго справедливы послылки, служащая точкой отправленія. Что касается многообразія обыкновенныхъ точекъ, прямыхъ и плоскостей, то оно подобно многообразію введенныхъ нами новыхъ конечныхъ точекъ, прямыхъ и плоскостей относительно аксіомъ сопряженія. Поэтому всякій выводъ, сдѣланный изъ этихъ аксіомъ, будетъ справедливъ въ примѣненіи къ обыкновеннымъ конечнымъ элементамъ и въ томъ случаѣ, когда мы пользовались при доказательствѣ бесконечно удаленными элементами. Дѣло будетъ здѣсь обстоитъ совершенно такъ же, какъ въ вопросѣ о комплексныхъ числахъ. Совокупность комплексныхъ чиселъ представляетъ собой многообразіе, для котораго справедливы всѣ преобразованія арифметики вещественныхъ чиселъ, а потому всякій выводъ, при помощи этихъ преобразованій сдѣланный, будетъ правиленъ и въ томъ случаѣ, когда онъ въ конечномъ счетѣ относится къ числамъ вещественнымъ (къ части всего многообразія комплексныхъ чиселъ).

Многообразіе, на которомъ мы обнаружили, что введеніе бесконечно удаленныхъ точекъ, какъ точекъ пересѣченія параллельныхъ прямыхъ, бесконечно удаленныхъ прямыхъ, какъ пересѣченій параллель-

ных плоскостей, и бесконечно удаленной плоскости, как совокупности бесконечно удаленных прямых, не может привести к противорѣчю съ аксіомами сопряженія, было нами составлено путемъ соединенія обыкновенныхъ связокъ, названныхъ нами точками, и связокъ параллелей, названныхъ нами бесконечно удаленными точками. Любопытно, что Пашъ въ указанномъ выше сочиненіи даетъ такое опредѣленіе связки, которое объединяетъ обѣ категоріи; именно, онъ опредѣляетъ связку, какъ комплексъ прямыхъ, обладающихъ тѣмъ свойствомъ, что любыя двѣ прямыя этого комплекса расположены въ одной плоскости. Если поэтому мы возьмемъ двѣ прямыя на плоскости и черезъ каждую точку пространства, этой плоскости не принадлежащую, мы проведемъ плоскости, опредѣляемая этой точкой и основными двумя прямыми, то ихъ пересѣченіе опредѣлитъ прямую связки, проходящую черезъ выбранную точку пространства. Чтобы опредѣлить прямую связки, проходящую черезъ точку, лежащую въ плоскости первыхъ двухъ прямыхъ, надо воспользоваться двумя другими прямыми связки, одна изъ которыхъ не лежитъ въ этой плоскости. Смотря по тому, были ли исходныя двѣ прямыя сходящимися или параллельными, мы получимъ сходящуюся связку (конечную точку) или связку параллелей (бесконечно удаленную точку). Если связки взяты не въ Евклидовомъ пространствѣ, а въ гиперболическомъ, то, кромѣ сходящихся связокъ и связокъ параллелей, будутъ существовать связки третьяго типа — такъ называемыя расходящіяся связки. Расходящуюся связку образуютъ прямыя, перпендикулярныя къ одной и той же плоскости. Въ Евклидовомъ пространствѣ эти послѣднія связки совпадаютъ со связками параллелей, въ гиперболическомъ же пространствѣ онѣ образуютъ особую третью категорію. Если мы въ гиперболическомъ пространствѣ назовемъ конечными точками сходящіяся связки, а бесконечно удаленными точками — связки параллелей, то каждая прямая будетъ входить въ составъ двухъ связокъ параллелей (соответственно двумъ направленіямъ прямой), т. е. будетъ имѣть двѣ бесконечно удаленныя точки. Однако, при этомъ двѣ прямыя въ плоскости еще не всегда будутъ имѣть общую точку: двѣ расходящіяся прямыя не будутъ имѣть общей точки — ни конечной, ни бесконечно удаленной. Чтобы любыя двѣ прямыя, расположенныя въ одной плоскости, въ гиперболическомъ пространствѣ имѣли общую точку, необходимо еще болѣе усилить многообразіе точекъ, необходимо включить въ него еще точки третьей категоріи, т. е. назвать точками также расходящіяся связки. Эти точки Клейнъ назвалъ идеальными точками. Въ гиперболической плоскости двѣ прямыя всегда встрѣчаются либо въ конечной, либо въ бесконечно удаленной, либо въ идеальной точкѣ.

Мы показали, что введеніе бесконечно удаленныхъ элементовъ не можетъ привести къ противорѣчю съ аксіомами сопряженія. Но, кромѣ

аксіомъ сопряженія Гильбертъ различаетъ еще четыре группы аксіомъ и, прежде всего, аксіомы расположенія. Однако, присвоить расширенному многообразію точекъ такое расположеніе на прямой, которое удовлетворяло бы требованіямъ, выраженнымъ въ аксіомахъ расположенія, не удастся. Причина этого коренится въ томъ, что изъ трехъ прямыхъ сходящейся связки, расположенныхъ въ одной плоскости, каждая можетъ съ одинаковымъ правомъ считаться лежащей между двумя другими прямыми. Вслѣдствіе этого тѣ предложенія, выводъ которыхъ основанъ на аксіомахъ расположенія, не могутъ быть распространены на обогащенное нами многообразіе точекъ. Они могутъ выражать такія свойства конечныхъ точекъ, которыя не принадлежатъ бесконечно удаленнымъ точкамъ. Аксіомы конгруэнтности не распространяются уже на бесконечно удаленныя точки потому, что въ нашемъ многообразіи не всякая точка можетъ быть совмѣщена съ любой другой точкой. При помощи движенія можно, правда, совмѣстить каждую сходящую связку съ любой другой сходящейся связкой (т. е. можно привести каждую конечную точку въ любую другую конечную точку), но нельзя совмѣстить сходящуюся связку со связкой параллелей (т. е. нельзя привести конечную точку въ бесконечно удаленную).

Все изложенное выясняетъ, какія свойства конечныхъ точекъ могутъ быть распространены на бесконечно удаленныя точки, а какія не могутъ. На бесконечно удаленные образы распространяются тѣ свойства, которыя вытекаютъ только изъ аксіомъ сопряженія.

Проективная геометрія аксіомами конгруэнтности вовсе не пользуется. Она пользуется только тремя группами аксіомъ; именно, кромѣ аксіомъ сопряженія, она пользуется еще аксіомами расположенія и аксіомой проективной непрерывности (см. аксіомы II и III въ §§ 15 и 16). Аксіомы сопряженія проективной геометріи отличаются отъ аксіомъ соответствующей группы въ Евклидовой геометріи тѣмъ, что здѣсь всякія двѣ прямыя, расположенныя въ одной плоскости, имѣютъ общую точку, и всякія двѣ плоскости имѣютъ общую прямую. Но мы видѣли, что пространство, обогащенное бесконечно удаленными точками, удовлетворяетъ этимъ требованіямъ. Съ другой стороны, аксіомы расположенія, которыми пользуется проективная геометрія, также отличаются отъ аксіомъ расположенія Евклидовой геометріи. Проективная геометрія не вводитъ понятія „между“; она рассматриваетъ всегда двѣ пары точекъ на прямой и требуетъ, чтобы четыре пары точекъ на прямой всегда однимъ и только однимъ способомъ распались на двѣ пары, раздѣляющія другъ друга. Этимъ свойствомъ всегда обладаютъ четыре прямыхъ сходящейся связки, расположенныя въ одной плоскости. Этимъ обстоятельствомъ можно воспользоваться, чтобы распространить аксіомы расположенія проективной геометріи на наше пространство, обогащенное без-

конечно удаленными точками. Действительно, пусть A, B, C, D будут четыре точки на одной прямой. Возьмем произвольную сходящуюся связку O , в состав которой эта прямая не входит, и проведем прямые OA, OB, OC, OD . Это будут вполне определенные прямые, независимо от того, все ли точки A, B, C, D конечные, или между ними имеются также бесконечно удаленные. Если же прямые OA и OC разделяются прямыми OB и OD , то мы будем говорить, что точки A и C разделяются точками B и D . Можно легко показать, что эта дизъюнкция не зависит от выбора связки O , и что это определение согласуется со всеми аксиомами расположения проективной геометрии. Наконец, существенная особенность бесконечно удаленных точек, как мы видели, заключается в том, что конечные точки не могут быть приведены в соответствие с бесконечно удаленными. Однако, в проективной геометрии комплекс рассматриваемых преобразований значительно шире; именно, в состав проективных преобразований входят, помимо тех, которые мы называем движениями, еще другие преобразования, при помощи которых всякая связка может быть превращена в любую другую связку, и в частности сходящаяся связка может быть превращена в связку параллелей. Вследствие этого в проективной геометрии бесконечно удаленные точки играют ту же роль, что и конечные.

Изложенным вопросом о законности введения в геометрию положения бесконечно удаленных элементов достаточно выяснено. В метрической геометрии возникает еще вопрос о расстоянии бесконечно удаленной точки от конечной точки, каковое принимается бесконечно большим. Выяснение того, в какой мере это законно, представляется более сложным, потому что здесь мы сталкиваемся уже с другим вопросом, именно вопросом о том, каким образом бесконечность вводится в арифметику. Мы не можем войти здесь в подробное обсуждение этого вопроса; заметим только, что, присваивая бесконечно большое расстояние бесконечно удаленным точкам, мы делаем совершенно то же (и в том же смысле), что и в алгебре, когда присваиваем бесконечное решение уравнению $0 \cdot x = a$, где $a \neq 0$.

II. Объ измѣреніи площадей.

Въ текстѣ сочиненія авторомъ изложена теорія площадей прямолинейныхъ фигуръ въ томъ видѣ, какъ она дана Гильбертомъ въ его „Основаніяхъ“ ¹⁾). Вмѣстѣ съ тѣмъ приведены соображенія, въ силу которыхъ этой теоріи отдается предпочтеніе предъ обычной Евклидовой теоріей этого вопроса. Получается, прежде всего, такое впечатлѣніе, что обыкновенная теорія площадей вовсе не нужна. Далѣе на стр. 299, указывается, что совокупность площадей была бы только тогда претворена въ величину, если бы были также указаны правила умноженія площадей и дѣленія площадей, — точка зрѣнія, которую мы считаемъ рѣшительно неправильной. Въ общемъ, тѣ причины, которыя привели Гильберта къ его теоріи площадей, остаются, какъ намъ кажется, недостаточно выясненными, и мы считаемъ полезнымъ остановиться здѣсь на этомъ вопросѣ.

Ученіе о площадяхъ имѣетъ цѣлью, какъ говорятъ, выразить площадь числомъ, т. е. каждой площади мы относимъ нѣкоторое арифметическое число; при томъ это должно быть сдѣлано такъ, чтобы, во-первыхъ, конгруэнтнымъ фигурамъ соответствовали одинаковыя числа, и, во-вторыхъ, чтобы фигурѣ, составленной изъ нѣсколькихъ фигуръ, соответствовало число, равное суммѣ тѣхъ чиселъ, которыя отнесены составляющимъ фигурамъ. Въ этомъ заключается вся задача объ измѣреніи площадей. Теорія площадей прямолинейныхъ фигуръ заключается въ рѣшеніи этой задачи по отношенію къ послѣднимъ. Нужно, слѣдовательно, рѣшить, можно ли отнести каждой прямолинейной фигурѣ число такимъ образомъ, чтобы удовлетворить поставленнымъ двумъ требованіямъ, и, если, можно, то какъ это должно быть произведено. А priori мы не имѣемъ основанія отвѣтить утвердительно даже и на первый изъ этихъ вопросовъ. Въ самомъ дѣлѣ, представимъ себѣ, что въ пространствѣ существовало бы такое движеніе S , которое совмѣщаетъ прямолинейную фигуру A съ прямолинейной фигурой B , и въ то же время существовало бы другое движеніе S' , которое помѣщаетъ фигуру A внутри

¹⁾ Та же теорія площадей была значительно раньше предложена С. О. Шатуновскимъ и сообщена имъ Новороссійскому Обществу Естествоиспытателей въ 1895 году и IX Съѣзду Русскихъ Естествоиспытателей и Врачей въ 1898 году.

фигуры B , подобно тому, какъ прямолинейный уголъ можно помѣстить внутри конгруэнтнаго ему угла. Тогда поставленнымъ требованіямъ удовлетворить было бы невозможно, ибо въ виду существованія движенія S , въ силу перваго требованія, обѣимъ фигурамъ должно было бы быть отнесено одно и то же число, а въ виду существованія движенія S' , въ силу втораго требованія, второй фигурѣ должно было бы быть отнесено большее число. Слѣдовательно, мы должны либо доказать, что поставленнымъ требованіямъ удовлетворить можно, либо постулировать это. Обычная теорія площадей постулируетъ это, хотя неявнымъ образомъ. Допустивъ, что каждой прямолинейной фигурѣ можно отнести число такъ, чтобы удовлетворить поставленнымъ требованіямъ, обыкновенная теорія площадей даетъ полное рѣшеніе втораго вопроса о томъ, какъ это должно быть выполнено; именно доказывается, что каждому треугольнику должно быть отнесено число, пропорціональное произведенію изъ основанія на высоту, что это число должно быть равно половинѣ указаннаго произведенія, если мы желаемъ квадрату, сторона котораго равна единицѣ длины, отнести число 1 (т. е. принять его за единицу мѣры площади); многоугольнику же необходимо отнести сумму чиселъ, отнесенныхъ треугольникамъ, на которые онъ разбивается. Чтобы выяснитъ, что въ обычной теоріи дѣйствительно скрывается допущеніе, о которомъ мы говорили, мы обратимся къ первому предложенію ученія о площадяхъ. Оно формулируется обыкновенно такъ: „площади двухъ прямоугольниковъ, имѣющихъ равныя основанія, относятся, какъ ихъ высоты“. Чтобы это предложеніе имѣло опредѣленное содержаніе, нужно знать, что такое площадь. Не входя въ анализъ того, что можно подъ этимъ терминомъ вообще разумѣть, одно ясно, что подъ площадью разумѣютъ такую величину, каждое значеніе которой имѣетъ отношеніе къ любому другому ея значенію, выражающееся ариметическимъ числомъ и обладающее тѣми свойствами, которыми обладаетъ отношеніе двухъ значеній любой величины (напримѣръ, длины); сюда относится, въ частности, то свойство, что отношеніе площади, составленной изъ двухъ площадей, къ третьей, должно быть равно суммѣ отношеній каждой изъ составляющихъ площадей къ третьей. Если поэтому мы фиксируемъ одну площадь и возьмемъ отношеніе каждой площади къ этой послѣдней (отношеніе, существованіе котораго, какъ сказано, явно принимается всей теоріей), то оно и будетъ числомъ, отнесеннымъ каждой площади.

Итакъ, то обстоятельство, что, отнеся каждому треугольнику произведеніе изъ основанія на высоту, а каждому многоугольнику число, равное суммѣ чиселъ, отнесенныхъ такимъ образомъ составляющимъ треугольникамъ, мы удовлетворимъ требованіямъ, поставленнымъ въ задачѣ объ измѣреніи, это обыкновенной теоріей не доказывается; она доказываетъ только, что если такое соотвѣтствіе между прямолинейными

фигурами и арифметическими числами установить возможно — таковое вполне определяется выбором единицы мѣры. Еще иначе: обыкновенная теорія площадей доказываетъ, что для установленія системы измѣренія площадей прямолинейныхъ фигуръ при обычной единицѣ мѣры необходимо отнести каждому треугольнику полупроизведеніе изъ основанія на высоту и т. д. Но достаточно ли это? Будетъ ли при этомъ, дѣйствительно, число, отнесенное каждой прямолинейной фигурѣ, равно суммѣ чиселъ, отнесенныхъ составляющимъ фигурамъ, какимъ бы образомъ мы ни производили разложеніе, этотъ вопросъ остается открытымъ. На этотъ именно вопросъ теорія Шатуновскаго-Гильберта и даетъ отвѣтъ. Теорія эта даетъ строгое доказательство того, что достаточно отнести каждой прямолинейной фигурѣ число, обычно именуемое мѣрой ея площади, чтобы число, отнесенное любой фигурѣ, было равно суммѣ чиселъ, отнесенныхъ составляющимъ фигурамъ, какъ бы мы ни дѣлали разложенія на составляющія фигуры. Обычная теорія площадей и теорія Шатуновскаго-Гильберта, такимъ образомъ, дополняютъ другъ друга.

Самое доказательство этого предложенія изложено въ текстѣ хотя и съ исчерпывающей полнотой, но, на нашъ взглядъ, недостаточно ясно. Мы не будемъ излагать здѣсь вновь этого доказательства, но выяснимъ лишь планъ его.

Каждому треугольнику мы относимъ число, равное полупроизведенію изъ основанія на соответствующую высоту (какое произведеніе не зависитъ отъ того, какое изъ трехъ основаній мы выберемъ); это число называется „мѣрой площади“ треугольника. Затѣмъ мы доказываемъ, въ первую очередь, что, какъ бы мы ни разлагали треугольникъ вновь на треугольники, мѣра площади этого треугольника всегда равняется суммѣ мѣръ площадей составляющихъ треугольниковъ. Теорема эта доказывается сначала для такъ называемаго трансверсальнаго разложенія (которое производится трансверсальями изъ одной вершины), затѣмъ для поперечнаго разложенія (при которомъ вершины составляющихъ треугольниковъ лежатъ только на сторонахъ даннаго треугольника); наконецъ доказывается, что всякое разложеніе треугольника на составляющіе треугольники можетъ быть путемъ трансверсальныхъ и поперечныхъ разложеній составляющихъ треугольниковъ приведено къ тому, что данный треугольникъ будетъ разложенъ трансверсально на рядъ треугольниковъ, которые, въ свою очередь, будутъ разложены поперечно.

Доказавъ, что мѣра площади треугольника всегда равняется суммѣ мѣръ площадей составляющихъ треугольниковъ, какъ бы ни производилось разложеніе, мы обращаемся затѣмъ къ многоугольнику; мы доказываемъ, что, какъ бы многоугольникъ ни былъ разложенъ на треугольники, сумма мѣръ площадей составляющихъ треугольниковъ будетъ одна и та же;

эта постоянная сумма и принимается за мѣру площади многоугольника. Наконецъ, послѣ этого доказывается, что мѣра площади всякаго многоугольника равняется суммѣ мѣръ площадей составляющихъ его многоугольниковъ, какимъ бы образомъ ни было произведено разложеніе.

Къ этому мы присоединимъ еще слѣдующее замѣчаніе. Точка зрѣнія, на которой мы здѣсь стоимъ, носить названіе арифметической, такъ какъ она относитъ каждой площади число. Возможна точка зрѣнія чисто геометрическая, которая относитъ каждой площади отрѣзокъ и, такимъ образомъ, совершенно освобождаетъ геометрію отъ числа. Такая теорія должна быть построена на исчисленіи отрѣзковъ; за мѣру площади треугольника въ такой теоріи принимается отрѣзокъ, представляющій собой половину произведенія изъ основанія на высоту.

Вышли въ свѣтъ слѣдующія изданія:

ЛАНУРЪ, П. и АПШЕЛЬ, Я. Историческая физика. Пер. съ нѣм. подъ ред. „*Вѣстн. Опытн. Физики и Элементарн. Матем.*“ Въ 2-хъ том. большого формата, 875 стр. Съ 799 рис. и 6 отдѣльными табл. 1908. Ц. Р. 7. 50 к.

Изъ отзывовъ объ „Исторической физикѣ“.

„Нельзя не привѣтствовать этого интереснаго изданія... Книга читается легко; содержитъ весьма удачно подобранный матеріалъ и обильно снабжена хорошо выполненными рисунками. Переводъ никакихъ замѣчаній не вызываетъ...“

Проф. О. Хвольсонъ. *Ж. М. Н. Пр.*

„Въ изложеніи историческія свѣдѣнія по какому-либо вопросу очень удачно переплетаются съ новѣйшими: мѣстами даются примѣры и вопросы для упражненія. Русский переводъ книги производитъ хорошее впечатлѣніе... мѣсто книги—во всякой благоустроенной учительской и ученической библиотекѣ. Свообразная прелесть историческаго изложенія, думается мнѣ, можетъ способствовать возбужденію интереса къ физикѣ въ тѣхъ учащихъся, у которыхъ преобладаетъ склонность ко всему „историческому“ и которымъ нерѣдко физика представляется предметомъ чуждымъ и труднымъ. Кроме того, „Историческая физика“ можетъ доставить очень пригодное чтеніе взрослымъ, которые полагали бы возобновить и освѣтить забытыя или плохо усвоенныя свѣдѣнія по физикѣ. Нечего и говорить, что для преподаванія физики она доставляетъ превосходный матеріалъ, и что она можетъ быть даваема для чтенія, при содѣйствіи преподавателя, въ руки учащихъся.“

Педагогическій сборникъ.

Н. Дрентельнъ

„Разказы изъ жизни главнѣйшихъ двигателей наукъ подводятъ начинающаго читателя къ пониманію величины научной работы и помогаютъ приблизиться къ истинному смыслу ея результатовъ, такъ какъ заставляютъ слѣдить за ихъ возникновеніемъ. Книга издается тщательно и украшена многочисленными иллюстраціями.“ В. К. Л.

Вопросы Физики.

АРЕНІУСЪ, СВ. проф. **Физика неба.** Перев. съ нѣм. подъ ред. прив.-доц. А. Р. Орбинскаго. VIII—250 стр. 8°. 66 черн. и 2 цвѣтн. рис. въ текстѣ. Черная и спектральная таблицы. 1905. Ц. Р. 2—

Научность содержанія, ясность и простота изложенія и превосходный переводъ соперничаютъ другъ съ другомъ. *Русская Мысль.*

АБРАГАМЪ, Г. проф. **Сборникъ элементарныхъ опытовъ по физикѣ.** Перев. съ франц. подъ ред. прив.-доц. Б. П. Вейнберга.

Часть I: Работы въ мастерской — Геометрія и механика — Теплота — XVI—272 стр. 8°. Свыше 300 рис. 2-е изд. 1909. Ц. 1 р. 50 к.

Систематически составленный сводъ наиболѣе удачныхъ, типичныхъ и поучительныхъ опытовъ. *Вѣстникъ и Библиотека Самообразования.*

Часть II: Звукъ — Свѣтъ — Электричество — Магнетизмъ — 434 + LXXV стр. 8°. Свыше 400 рисунковъ. 1906. Ц. Р. 2. 75 к.

Мы надѣемся, что разбираемый трудъ станетъ настольной книгой каждой физической лабораторіи въ Россіи. *Русская Мысль.*

УСПѢХИ ФИЗИКИ. Сборникъ статей, подъ ред. „*Вѣстн. Опытной Физики и Элементарной Математики*“ 2-е изданіе. VI—157 стр. 8°. 41 рис. и 2 таблицы. 1907. Ц. 75 к.

Нужно надѣяться, что послѣднее...послужитъ къ широкому распространенію этой чрезвычайно интересной книги. *Русская Мысль.*

АУЗРБАХЪ, Ф. проф. Царица мира и ея тѣнь. Общедоступное изложенеіе основній ученія объ энергіи и затропи. Пер. съ нѣм. 3-е издание VII+56 стр. 8°. 1908. Ц. 40 к.

Слѣдуетъ признать брошюру Ауэрбаха чрезвычайно интересной.
Журн. М. Н. Пр. Проф. О. Хвольсонъ.

НЬЮКОМЪ, С. проф. *Астрономія для всѣхъ.* Перев. съ англ. подъ редакц. прив.-доц. *А. Р. Орбинскаго.* XXIV+286 стр. 8°. Съ портр. автора, 64 рис. и 1 табл. 1905. Ц. Р. 1. 50 к.

И вполне научно, и совершенно доступно, и изящно написанная книга.. переведена и издана очень хорошо. *Вѣстникъ Воспитанія.*

ВЕВЕРЪ, Г. и ВЕЛЬШТЕЙНЪ, І. проф. *Энциклопедія элементарной алгебры.* Т. I. Перев. съ нѣм. подъ ред. и съ примѣч. прив.-доц. *В. Ф. Кагана.* XIV+623 стр. 8°. Съ 38 чертеж. 1907. Ц. Р. 3. 50 к.

Вы все время видите передъ собой мастера своего дѣла, который съ любовью показываетъ великія творенія человѣческой мысли, извѣстныя ему до тончайшихъ подробностей. *Педагогической Сборникъ.*

ВЕВЕРЪ Г. и ВЕЛЬШТЕЙНЪ І., проф. *Энциклопедія элементарной геометріи.* Томъ II, книга I. *Основанія геометріи.* Пер. съ нѣм. подъ ред. и съ примѣч. прив.-доц. *В. Ф. Кагана.* XII+366 стр. 8°. Съ 144 черт. и 6 рис. 1909. Ц. Р. 3.

ДЕДЕКИНДЪ, Р. проф. *Непрерывность и ирраціональныя числа.* Перев. съ нѣм. съ примѣч. прив.-доц. *С. О. Шатуновскаго;* съ присоединеніемъ его статьи: *Доказательство существованія трансцендентныхъ чиселъ.* 2-е изд. 40 стр. 8°. 1909. Ц. 40 к.

Небольшой по объему, но, такъ сказать, законодательный по содержанию трудъ... *Русская Школа.*

ПЕРРИ, ДЖ. проф. *Вращающаяся волчекъ.* Публичная лекція. Пер. съ англ. VII+95 стр. 8°. Съ 63 рис. 2-е изд. 1908. Ц. 60 к.
Книжка, вполнѣ показывающая, какъ люди истиннаго знанія, не цѣлковой только науки, умѣютъ распоряжаться научнымъ матеріаломъ при его популяризаціи. *Русская Школа.* *С. Шохоръ-Трошичъ.*

ШЕЙДЪ, К. *Химическіе опыты для юношества.* Перев. съ нѣмецк. подъ ред. лаборант. *Е. С. Ельмачинова.* II+192 стран. 8°. Съ 79 рисунками. 1907. Ц. Р. 1. 20 к.

Превосходная книга, какой намъ давно не хватало. Всюду въ книгѣ сохранены блagотворное чувство, что находишься въ совершенно надежныхъ рукахъ.. серьезной наукѣ въ болѣе легкой формѣ.

Zeitschrift für Lehrmittelwesen und pädagogische Literatur.

ВИХЕРТЬ, Э. проф. *Введеніе въ геодезію.* Перев. съ нѣмецк. 80 стр. 16°. Съ 14 рисунок. 1907. Ц. 35 к.

Излагаютъ основы низшей геодезіи, имѣя въ виду пользованіе ею въ школѣ въ качествѣ практическаго пособия... Изложенеіе очень сжато, но полно и послѣдовательно. *Вопросы Физики.*

ШМИДЪ, Б. проф. *Философская хрестоматія.* Пер. съ нѣм. *Ю. А. Говсина* подъ ред. и съ пред. проф. *Н. Н. Ланге.* VI+171 стр. 8°. 1907. Ц. Р. 1. — ... для человѣка, занятаго самообразованіемъ и немного знакомаго съ философій и наукой, она (книга) дастъ разнообразн. и интересн. матеріалъ. *Вопросы философіи и психологіи.*

ПРОМГОЛЬТЪ, С. *Игры со спичками.* Задачи и развлечения. Пер. съ нѣм. 146 стр. 16°. Свыше 250 рис. и черт. 1907. Ц. 50 к.

ВЕТЗГЪ, В. проф. *Современныя развитіе физики.* Пер. съ англ. подъ ред. прив.-доц. *Б. П. Вейнберга* и *А. Р. Орбинскаго.* Съ приложеніемъ рѣчи *А. Бальфура: Нѣсколько мыслей о новой теоріи вещества.* VII+319 стран. 8°. Съ 5 портрет., 6 таблиц. и 33 рисунок. Ц. Р. 2. —

Старается представить въ стройной и глубокой системѣ всѣ явленія физическаго опыта и рисуетъ читателю дѣйствительно захватывающую картину грандіозныхъ завоеваній человѣческаго гениа. *Современный міръ.*

УШИНСКИЙ, Н. проф. Лекції по бактеріології. VIII+135 стр. 8°. Съ 34 черными и швітными рисунками. 1908. Ц. Р. 1, 50 к.

РИГИ, А. проф. Современная теорія физических явлений (іоны, электрон, радиоактивность). Пер. съ III (1907) итальянск. изданія. XII+166 стр. 8°. Съ 21 рис. 1908. Ц. Р. 1 —

Книгу Риги можно смѣло рекомендовать образованному человеку, какъ лучшее имѣющееся у насъ изложеніе новѣйшихъ взглядовъ на обширную область физических явлений. Педагогической Сборникъ

КЛОССОВСКИЙ, А. проф. Физическая жизнь нашей планеты на основаніи современныхъ воззрѣній. 46 стран. 8°. 2-е изданіе, испр. и дополн. 1908. Ц. 40 к.

Рѣдко можно встрѣтить изложеніе, въ которомъ въ такой степени соединилась бы высокая научная эрудиція съ картинностью и увлекательностью рѣчи. Педагогической Сборникъ.

АРЕНУСЪ, СВ. проф. Образование міровъ. Пер. съ нѣм. подъ ред. проф. К. Д. Покровскаго. 208 стр. 8°. Съ 60 рис. 1908. Ц. Р. 1 75 к.

Книга чрезвычайно интересна и богата содержаниемъ. Педагогической Сборникъ.

КАГАНЪ, В. прив.-доц. Задача обоснованія геометріи въ современной постановкѣ. Рѣчь, произнесенная при защитѣ диссертации на степень магистра чистой математики. 35 стр. 8°. Съ 11 чертеж. 1908. Ц. 35 к.

ЦИММЕРМАНЪ, В. проф. Объемъ шара, шарового сегмента и шарового слоя. 34 стр. 16°. Съ 6 черт. 1908. Ц. 25 к.

РИГИ, А. проф. Электрическая природа матеріи. Вступительная лекція. Пер. съ итальянскаго. 28 стр. 8°. 1908. Ц. 30 к.

ЛЕМАНЪ, О. проф. Жидкіе кристаллы и теорія жизни. Пер. съ нѣмецк. П. В. Казанецкаго. IV+43 стр. 8°. Съ 30 рис. 1908. Ц. 40 к.

ГЕЙБЕРГЪ, I. проф. Новое сочиненіе Архимеда. Посланіе Архимеда къ Эратосвѣну о нѣкоторыхъ вопросахъ механики. Пер. съ нѣм. подъ ред. и съ предисл. прив.-доц. П. Ю. Тимченко. XV+27 стр. 8°. Съ 15 рис. 1909. Ц. 40 к.

ВЕЙНБЕРГЪ, В. П. прив.-доц. Снѣгъ, иней, градъ, ледъ и ледники. IV+127 стр. 8°. Съ 138 рис. и 2 фототип. табл. 1909. Ц. 1 р.

КОВАЛЕВСКИЙ, Г. проф. Введеніе въ исчисленіе безконечно-малыхъ. Перев. съ нѣмецкаго подъ редакц. и съ прим. прив.-доц. С. О. Шапуновскаго. VIII+140 стр. 8°. Съ 18 черт. 1909. Ц. Р. 1. —

ТРОПСОНЪ, СИЛЬВАНУСЪ, проф. Добываніе свѣта. Общедоступная лекція для рабочихъ, прочит. на собраніи Британск. Ассоціаціи. 1906. Перев. съ англ. VIII+88 стр. 16°. Съ 28 рис. 1909. Ц. 50 к.

СЛАВИ, А. проф. Резонансъ и затуханіе электрическихъ волнъ. Пер. съ нѣм. подъ ред. „Вѣсти Опт. Физ. и Элем. Матем.“. 42 стр. 8°. Съ 36 рис. Ц. 40 к.

СНАЙДЕРЪ, проф. Картина міра въ свѣтѣ современнаго естествознанія. Перев. съ нѣм. подъ ред. проф. В. В. Завьялова. VIII+193 стр. 8°. Съ 16 отд. портретами. 1909. Ц. Р. 1 50 к.

РАМЗАЙ, В. проф. Благородные и радиоактивные газы. Пер. подъ ред. „Вѣсти Оп. Физ. и Эл. Мат.“ 37 стр. 16°. Съ 16 рис. 1909. Ц. 25 к.

БРУНИ, К. проф. Твердые растворы. Пер. съ итал. подъ ред. „Вѣсти Оп. Физ. и Эл. Мат.“ 37 стр. 16°. 1909. Ц. 25 к.

БОЛЛЪ, Р. С. проф. Вѣна и приливы. Пер. съ англ. подъ ред. прив.-доц. А. Р. Орбинскаго. 104 стр. 8°. Съ 4 рис. и 1 табл. 1909. Ц. 75 к.

СЛАВИ, А. проф. Беспроволочный телеграфъ. Пер. съ нѣм. подъ ред. „Вѣсти Оп. Физ. и Эл. Мат.“ 28 стр. 8°. Съ 23 рис. 1909. Ц. 30 к.

ЛИНДЕМАНЪ, Ф. проф. *Форма и спектръ атомовъ.* Рѣчь ректора Мюнхенскаго университета. 25 стр. 16°. Изд. 2-ое 1909. Ц. 20 к.

КУТЮРА, Л. Алгебра логики. Перев. съ франц. под редакціей и съ примѣчаниями проф. *И. В. Селинского.* 128 стр. 8°. 1909. Ц. 90 к.

Имѣются на складѣ:

МУЛЬТОНЪ, Ф. проф. *Эволюція солнечной системы.* Перев. съ англійск. IV+82 стр. 16°. Съ 12 рис. 1908. Ц. 50 к.
Изложене гипотезы образованія солнечной системы изъ спиральной туманности съ попутной критикой космогонической теоріи Лапласа.

БРЕМОВЪ, Д. кандидат. матем. наукъ. *Новая геометрія треугольника.* 334+XIII стр. 8°. 1902. Ц. Р. 2. —

Печатаются и готовятся къ печати:

РОУ, СУНДАРА. Геометрическія упражнен. съ кускомъ бумаги. Переводъ съ англійскаго.

КЭДЖОРИ, Ф. проф. *Исторія элементарной математики* съ нѣкоторыми указаніями для преподав. Перев. съ англійскаго подъ ред. и съ примѣч. прив.-доц. *И. Ю. Тимченко.*

ТРОМСОНЪ, ДЖ. ДЖ. проф. *Корпускулярная теорія вещества.* Перев. съ англ. подъ ред. „В. Оп. Ф. и Эл. Мат.“

КЛОССОВСКИЙ, А. проф. *Основы метеорологіи* (учебникъ). Около 35 печатныхъ листовъ (см. ниже).

ТРЕЛЬСЪ-ЛУНДЪ, Небо и міровоззрѣніе въ круговоротѣ времени. Пер. съ нѣмецкаго.

АДЛЕРЪ, А. *Тесрія геометрическихъ построеній.* Перев. съ нѣмецкаго подъ ред. прив.-доц. *С. О. Шапуновскаго.*

ЛОРЕВИЦЪ, проф. *Учебникъ физики.* Переводъ съ нѣмецкаго. Два тома. Около 55 печатныхъ листовъ. См. ниже.

ПУАНКАРЕ, Г. проф. *Наука и Методъ.* Пер. съ французск. подъ редакц. прив.-доц. *В. Кагана.*

КЛЕЙНЪ, Ф. проф. *Лекціи по элементарной математикѣ для учителей.* Пер. съ нѣм. подъ ред. прив.-доц. *В. Кагана.*

КОВАЛЕВСКИЙ, Г. проф. *Курсъ дифференціального и интегральнаго исчисленій.* Пер. съ нѣм. подъ ред. прив.-доц. *С. Шапуновскаго.*

ЛОВЕЛЛЬ, П. *Обитаемость Марса.* Пер. съ англ. Со мног. рис.

РАМЗАЙ, В. *Введеніе въ физическую химію.* Перев. съ англ. подъ ред. проф. *П. Г. Меликова.*

ОСТВАЛЬДЪ, В. проф. *Натурфилософія.* Съ двумя дополнительными статьями. Пер. съ нѣм. подъ редакц. прив.-доц. Страсбургскаго Университета. *Л. Мандельштама.*

ШУБЕРТЬ, Г. проф. *Математическія развлеченія.* Пер. съ нѣм. подъ ред. „В. Оп. Ф. и Эл. Мат.“

БОРЕЛЬ, Е. проф. *Курсъ математики для среднихъ учебныхъ заведеній.* Въ обработкѣ проф. *П. Штѣкеля.* Пер. съ франц. и нѣм. подъ ред. приватъ-доцента *В. Кагана.*

СОДИ, Ф. проф. *Что такое радій?* Переводъ съ англійскаго.

МАРКОВЪ, А. акад. *Исчисленіе конечныхъ разностей.* Изд. 2-ое.

ПЕЧАТАЕТСЯ

Проф. Г. А. ЛОРЕНЦЪ

УЧЕБНИКЪ ФИЗИКИ

Разршиенный авторомъ переводъ съ нѣмецкаго

подъ редакціей Проф. Н. П. Кастерина.

Два большихъ тома, около 55 печатныхъ листовъ, большого формата.
Съ 493 рисунками.

Изъ предисловія автора къ нѣмецкому изданію: „Эта книга составила изъ моихъ лекцій въ зѣльшемъ (Лейденскомъ) университетѣ... Я предполагалъ, что читатель слушаетъ лекцій, сопровождаемая опытами, и по возможности, принимаетъ участіе въ практическихъ занятіяхъ. Этимъ и объясняется, что описанію приборовъ и методовъ наблюденія отведено лишь немного мѣста. Почти вовсе не касаясь я также историческаго развитія физики и ея практическихъ приложений; я опустил все это, думая, что каждый можетъ найти эти свѣдѣнія въ какой-нибудь болѣе значительной по объему книгѣ, служащей справочникомъ“.

„Конечно, настоящая книга едва ли дастъ что-нибудь новое. Но въ нѣкоторыхъ отдѣлахъ изложеніе достаточно отличается отъ того, какого придерживаются другіе учебники этого рода, чтобы оправдать появленіе въ переводѣ, хотя въ Германіи есть много превосходныхъ руководствъ“.

Содержаніе перваго тома: Математическое введеніе.—I. Движеніе и силы — II. Работа и энергія. — III Твердая тѣла неизмѣнныя формы. — IV. Равновѣсіе и движеніе жидкостей и газовъ. — V. Свойства газовъ.— VI. Термодинамика — VII Свойства твердыхъ тѣлъ. — VIII. Свойства жидкостей и газовъ. — Предметный и именной указатели.

Содержаніе втораго тома: IX. Колебательное движеніе тѣлъ. — X. Распространеніе колебаній. — XI. Отраженіе и преломленіе свѣта. — XII. Природа свѣта. — XIII. Поляризованный свѣтъ. — XIV. Электростатика. — XV. Электрическіе токи. — XVI. Дѣйствія магнитнаго поля. — XVII. Электрическаго колебанія. — Распространеніе электромагнитныхъ возмущеній. — XVIII. Явленія, могущія быть объясненными на основаніи теоріи электроновъ. — Задачи — Таблицы — Предметный и именной указатель.

Изъ отзывовъ: „Переводъ этой книги... несмотря на чрезвычайную конкуренцію, не представляется излишнимъ не только потому, что книга принадлежитъ перу такого выдающагося физика, какъ Лоренцъ, но прежде всего потому, что она существенно отличается отъ другихъ учебниковъ и цѣлью и выполненіемъ. Изложеніе необычайно ясно и просто и заставляетъ усиленно рекомендовать книгу всѣмъ, кто требуетъ отъ опытной физики болѣе, чѣмъ только описанія опытовъ“.

Beiblätter zu den Annalen der Physik.

„Книга чрезвычайно интересна и поучительна для преподавателей этого предмета или его частей и для студентовъ“.

Journal of Physical Chemistry.

Первый томъ (выше 20 печатныхъ листовъ) выйдетъ въ свѣтъ въ среднѣ 1909 года.

Печатается и выйдетъ въ свѣтъ въ половинѣ 1909 г.:

Заслуж. проф. А. В. КЛОССОВСКІЙ

ОСНОВЫ МЕТЕОРОЛОГІИ

Около 35 печатныхъ листовъ. Со многими рисунками.

СОДЕРЖАНІЕ.

I. Статическая метеорологія. Введеніе — Распространеніе и составъ атмосферы. — Физическія свойства атмосферы. — Вода въ атмосферѣ. — Непрерывная водная оболочка (океаны), ея распространеніе и свойства. — Солнечное лучеиспусканіе. — Расходъ тепла. — Тепловое состояніе земной коры въ самыхъ верхнихъ ея слояхъ. — Тепловое состояніе земного ядра. — Тепловыя условія океановъ. — Тепловое состояніе низшихъ слоевъ земной атмосферы. — Давленіе воздуха. — Образование гидрометеоровъ. — Температура и давленіе въ болѣе высокихъ слояхъ атмосферы. — Аномальныя отклоненія.

II. Динамическая метеорологія. Основы динамики атмосферы. — Анемометрія. — Воздушныя теченія на земной поверхности. Общая циркуляція атмосферы. — Циклоны и антициклоны. — Основы предсказанія погоды. — *Динамика океановъ.* Морскія теченія. Волны. Приливы и отливы. *Метеорологическая оптика.*

III. Земной магнетизмъ и Атмосферное электричество. Земные токи. Полярныя сіянія. — Методы и успѣхи метеорологіи. Задачи метеорологіи въ ближайшемъ будущемъ. — Литературныя указанія.

Выписывающіе
изъ склада изданій
„МАТЕЗИСЪ“
(Одесса, Новосель-
ская, 66)



на сумму 5 руб. и
больше, за пере-
сылку не платятъ.
Каталогъ по требо-
ванію бесплатно.

ОТДѢЛЕНІЕ СКЛАДА ДЛЯ МОСКВЫ:

книжный магазинъ „Образованіе“

Москва, Кузнецкій мостъ, 11.